

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

PLANTES ANNUELLES ET VIVACES DE PLEIN AIR,

D'ARBRES D'ORNEMENT, INDIGÈNES ET EXOTIQUES,

DE PLANTES DE SERRES, PALMIERS, FOUGÈRES,

de plantes aquatiques, bulbeuses, etc.,

DE PLANTES POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES,

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES,

POMMES DE TERRE.

TUBERCULES ET RHIZOMES

DE

GESNÉRIACÉES:

ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA,

Gesneria, Gloxinia, Kollikeria, Ligeria (*Gloxinia*), Nægelia, Plectopoma,

Rosanowia (*Biglandularia*), Scheeria, Stenogastrea, Tydæa, etc.,

AMARYLLIS, BÉGONIAS TUBÉREUX, CALADIUM, DAHLIA, GLORIOSA,


CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,


Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,


à GAND (BELGIQUE).

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auront pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N.B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL, et non à des INTERMÉDIAIRES.



 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.


Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.


Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.


La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.


Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.


 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

 Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en-dessous de 5 francs.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

 L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c<sup>s</sup>.

 I Signori committenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Committenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

## Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N<sup>o</sup> 187, comprenant les Plantes de serres, Amaryllidées, Bégonias, Broméliacées, Cactées, Caladium, Cycadées, Fougères, Orchidées, Palmiers, Canna, Coleus, Croton, Dahlia, Dracæna, Erythrina, Fuchsia, Lantana, Pelargonium, Salvia, etc.

N<sup>o</sup> 188, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Orchidées de pleine terre, Oxalis, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., graines à semer en automne.

N<sup>o</sup> 189, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère, etc.

N<sup>o</sup> 190, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc.



CULTURES  
DE  
**LOUIS VAN HOUTTE,**  
FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

GRAINES  
DE  
PLANTES D'ORNEMENT,  
POTAGÈRES, FOURRAGÈRES, ETC.

Les graines commandées par paquets sont expédiées comme échantillons, FRANCO par la poste, en un ou plusieurs paquets, mais non les graines au poids; le coût de l'affranchissement est porté en compte.

UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispense l'acheteur de toute autre énonciation; l'exécution des commandes sera, de cette manière, plus facile et plus prompte.

Prière de rappeler, à chaque commande, le NUMÉRO du Catalogue dont on a fait usage.

Les paquets que nous offrons étant faits à l'avance, nous ne pouvons les diviser ni en fournir de plus petits, à des prix moindres que ceux indiqués. Les demandes de *demi-paquets* ou de *demi-collections* seront donc considérées comme non avenues.

### Avis important.

*C'est principalement au printemps qu'on doit semer les plantes annuelles; on peut, cependant, en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes très-vigoureuses, dont la floraison est très-riche et précède celle des rares fleurs printanières.*

### Abréviations.

- b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
- c. Signifie que la plante réussit mieux quand on la sème sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
- gr. Désigne les plantes grimpantes.
- + Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.
- +c. Indique le semis d'automne, avec hivernage sous châssis froid.

Bei Bestellungen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per Prise bestellten Samen werden per Post expedirt, dieses ist aber nicht der Fall mit den Samen nach Gewicht. — Weder halbe Preisen noch halbe Sortimente werden abgegeben.

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit zum Säen der Blumensamen, doch werden einige frühblühende Sorten bis Juni mehrmals gesäet. Die Herbstsämmlinge (in August und September) liefern stärkere Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und zeitig blühen.

### Abkürzungen:

- b. Bezeichnet dass die Pflanze zu Einfassungen geeignet ist.  
 c. — dass die Pflanze in Februar oder März unter Glas gesäet wird, um in Mai ausgepflanzt zu werden.  
 gr. — die Schlingpflanzen.  
 + — die im Herbste zu säenden Pflanzen, welche unter einer leichten Bedeckung überwintern.  
 +c. — Herbstsämmlinge die in kaltem Mitsbeete überwintert werden.

In ordering, it is sufficient to indicate the leading N° of the sorts desired without specifying the names in full. — No half Packets and no half Assortments can be given.

*Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August and September produce strong plants, which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develop their flowers.*

### Abbreviations:

- b. Indicates that the plant is suitable for edging.  
 c. — that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.  
 gr. — that the plant is a climber.  
 + — the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.  
 +c. — autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.

## AMARANTOÏDES.

### Bachelor's Button (*Kugel-Amarant*).

#### c. Amarantoïdes (*Gomphrena globosa*).

Plantes très-recherchées pour la décoration des corbeilles et des plates-bandes; les fleurs coupées gardent leur couleur et servent à la confection des bouquets d'hiver. La floraison commence dès le mois de juillet et se prolonge jusqu'en septembre.

- |   |                         |          |
|---|-------------------------|----------|
| 1. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . | la collection . . . . . | fr. 1 25 |
| 2. Variétés en mélange . . . . .                  | le paquet . . . . .     | " " 25   |
| 3. — — — — —                                      | 25 grammes . . . . .    | " " 1 50 |

#### Variétés.

a. Blanc.  
 b. — strié de violet.

c. Couleur de chair.  
 d. Orange.

e. Rouge violacé.



## BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

*c. Balsamines Camellia (Impatiens Balsamina camelliaeflora)* (FLORE, XII, 35).

4. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 50
5. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 40
6. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

## Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>e.</i> Cramoisi.	<i>i.</i> Rouge clair.
<i>b.</i> — strié de carmin.	<i>f.</i> Lilas.	<i>j.</i> Violet.
<i>c.</i> Carmin.	<i>g.</i> Pourpre.	
<i>d.</i> Couleur de chair.	<i>h.</i> Rose.	

*c. Balsamines Camellia à fleurs ponctuées (Impatiens Balsamina camelliaeflora punctata).*

7. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 50
8. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 50
9. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 5 "

## Variétés.

<i>a.</i> Bleu foncé.	<i>d.</i> Lilas rosé.	<i>g.</i> Rouge sang.
<i>b.</i> Carmin rosé.	<i>e.</i> Pourpre.	<i>h.</i> Violet.
<i>c.</i> Lilas.	<i>f.</i> Rose.	

*c. Balsamines à forme de Rose (Impatiens Balsamina roseaeflora).*

10. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
11. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
12. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

## Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>d.</i> Cramoisi.	<i>g.</i> Rose.
<i>b.</i> Carmin.	<i>e.</i> Lilas.	<i>h.</i> Violet.
<i>c.</i> Couleur de chair.	<i>f.</i> Pourpre.	

*c. Balsamines naines (Impatiens Balsamina nana).*

13. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
14. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
15. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

## Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>c.</i> Cramoisi.	<i>e.</i> Pourpre.
<i>b.</i> Couleur de chair.	<i>d.</i> Écarlate.	<i>f.</i> Violet.

*c. Balsamines naines à fleurs de Camellia (Impatiens Balsamina nana camelliaeflora).*

16. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 "
17. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 40
18. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 4 "

## Variétés.

<i>a.</i> Bleu pâle.	<i>c.</i> Carmin.	<i>e.</i> Rouge brique.
<i>b.</i> Brun clair.	<i>d.</i> Couleur de chair.	<i>f.</i> — grenade.

BALISIERS (*CANNA*).Indian Shot (*Blumenrohr*).c. Balisiers d'Inde (*Canna indica*).

Les *Balisiers* sont des plantes ornementales de premier mérite; pendant l'été et une partie de l'automne, on en forme des massifs grandioses dans les jardins paysagers, etc.

Des semis faits sur couche, en février, peuvent atteindre d'assez grandes dimensions et fleurissent parfois dès la première année.

19. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 50
20. Variétés en mélange . . . . .	5 grammes . . . . .	" " 30
21. — — . . . . .	100 " . . . . .	" 4 "

## Variétés.

a. Annei.	e. Coccinea.	i. Van Houttei.
b. Atropurpurea.	f. Gigantea.	j. Warscewiczii.
c. Bonneti.	g. Glauca.	k. — nobilis.
d. Chalcedoniensis.	h. Musaeifolia.	l. Zebrina.

BELLES-DE-JOUR (*LISERONS*).*Convolvulus* (*Trichterwinden*).

gr. Belles-de-jour grimpantes (*Pharbitis hispida*, *Ipomœa*) (FLORE, XI, 7).

22. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
23. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
24. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

a. Blanc pur.	d. Carmin strié de blanc.	g. Rouge vif.
b. — strié de violet.	e. Couleur de chair.	h. Violet foncé.
c. Bleu foncé.	f. Lilas.	

gr. Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc (*Pharbitis hederacea foliis variegatis*).

25. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
26. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
27. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

a. Blanc panaché de carmin.	c. Carmin.	e. Lilas bordé de bleu.
b. — rosé.	d. — et blanc.	f. Violet bordé de blanc.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

28. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
29. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
30. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

a. Ardoisé.	c. Bleu d'azur.	e. Lilas.
b. Blanc.	d. — foncé.	f. Violet foncé.

## BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

31. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
32. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
33. — — . . . . .	100 grammes . . . . .	" 2 "

## Variétés.

a. Blanc.	d. Jaune.	g. Rouge et jaune.
b. — et jaune.	e. Lilas.	h. Tricolore.
c. Carmin.	f. Rose et blanc.	



**Belles-de-nuit à feuilles panachées** (*Mirabilis Jalapa foliis variegatis*).

Variétés s'élevant moins que les précédentes, à feuillage jaune maculé de vert. Elles conviennent surtout pour former le rang extérieur des massifs des *Belles-de-nuit* ordinaires et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

34. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
35. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 30
36. — — . . . . .	100 grammes . . . . .	" 3 "

**Variétés.**

a. Blanc pur.	c. Cramoisi.	e. Rouge et blanc.
b. — et rouge.	d. Jaune et blanc.	f. Tricolore.

**CAMPANULES CARILLON A GROSSES FLEURS.****+ Campanules Carillon** (*Campanula Medium*).

Ces *Campanules* sont de belles plantes bisannuelles, très-ornementales et d'un bel effet dans les jardins où on les emploie à la décoration des plates-bandes et des corbeilles.

37. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
38. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
39. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

**Variétés.**

a. Blanc.	c. Bleu.	e. Rose.
b. — double.	d. — double.	f. — double.

**+b. Campanules Miroir de Vénus** (*Campanula Speculum*).

40. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
41. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
42. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 25

**Variétés.**

a. Blanc.	c. Bleu.	e. Lilas.
b. — à grandes fleurs.	d. — à grandes fleurs.	

**CAPUCINES (MASTOUCHES).****Nasturtiums** (*Capucinerkresse*).**gr. Capucines grimpantes** (*Tropaeolum majus*).

43. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
44. Variétés en mélange . . . . .	10 grammes . . . . .	" " 25
45. — — . . . . .	100 " . . . . .	" 2 "

**Variétés.**

a. Cramoisi foncé.	c. Jaune citron.	e. Pourpre.
b. Écarlate.	d. — maculé de ponceau.	f. Rouge cinabre.

**gr. Capucines grimpantes hybrides de Lobb** (*Tropaeolum Lobbianum hybridum*).

Ces variétés donnent des tiges de 4 à 5 mètres de longueur; elles sont très-florifères et très-élégantes.

46. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
47. Variétés en mélange . . . . .	10 grammes . . . . .	" " 40
48. — — . . . . .	100 " . . . . .	" 3 50

**Variétés.**

a. Caroline Smith.	c. Lilli Smith.	e. Triomphe de Gand.
b. Géant des batailles.	d. Roi des noirs.	f. — d'Hyères.

**b. Capucines naines** (*Tropæolum majus nanum*).

On forme, avec ces magnifiques variétés naines, de belles bordures, des corbeilles et des massifs; elles sont aussi très-propres à garnir les plates-bandes où l'on en fait des touffes compactes qui produisent un charmant effet.

49. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection	fr. 2	"
50. Variétés en mélange.	10 grammes	"	" 30
51. — — — — —	100	"	" 2 50

**Variétés.**

a. Blanc crème.  
b. Brun acajou.  
c. Écarlate.

d. Jaune.  
e. — d'or maculé de brun.  
f. Pourpre.

g. Rose lilacé.  
h. Vermillon.

**CHOUX NON POMMÉS FRISÉS D'ORNEMENT.****Borecole** (*Blätterkohl*).**+ Choux non pommés frisés d'ornement** (*Brassica oleracea variegata*).

Les *Choux frisés* sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps; ce sont aussi des plantes d'ornement, dont les feuilles panachées, frisées, découpées, déchiquetées, dentelées et lacérées servent de garniture de table.

52. Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection	fr. 1	25
53. Variétés en mélange	le paquet	"	" 25
54. — — — — —	25 grammes	"	" 1 25

**Variétés.**

a. Rouge grand.  
b. — nain.

c. Vert panaché de blanc.  
d. — — de rouge.

e. Vert grand.  
f. — nain.

**COURGES D'ORNEMENT.****Ornamental Gourds** (*Zier-Kürbisse*).*c,gr.* **Courges ordinaires** (*Cucurbita Pepo*).

55. Collection de 12 variétés à gros fruits, sans noms (12 paquets)	la collection	fr. 2	"
56. Variétés en mélange.	le paquet	"	" 25
57. Collection de 12 variétés à petits fruits, sans noms (12 paquets)	la collection	"	" 2
58. Variétés en mélange.	le paquet	"	" 25

*c,gr.* **Courges à fleurs blanches** (*Cucurbita Lagenaria*).

59. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection	"	" 1 50
60. Variétés en mélange	le paquet	"	" 25
61. — — — — —	25 grammes	"	" 1 50

**Variétés.**

a. Boulet de canon.  
b. Bouteille de Jérusalem.  
c. Géante.

d. Gourde de pèlerin.  
e. Massue.  
f. Plate de Corse.

g. Poire à poudre.  
h. Siphon.

**COURGES DIVERSES.**

*c,gr.* Espèces très-intéressantes par la grande variété et l'extrême singularité de leurs fruits.

62. Collection de 12 espèces (12 paquets)	la collection	fr. 2	"
---	---------------	-------	---

**Variétés.**

a. Benincasa cerifera.  
b. — sinensis.  
c. Coccinea indica.  
d. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).

e. Cucumis grossularioides.  
f. Cyclanthera explodens.  
g. — pedata.  
h. Luffa cylindrica.  
i. Melothria scabra.

j. Momordica Balsamina.  
k. — Charantia.  
l. Thrichosanthes colubrina.



## CRÊTES DE COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).*c. Crêtes-de-Coq (Celosia cristata).*

63. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection	fr. 1 50
64. Variétés en mélange.	le paquet	n n 25
65. — —	25 grammes	n 3 n

## Variétés.

<i>a.</i> Chamois.	<i>d.</i> Jaune cuivre.	<i>g.</i> Rouge feu.
<i>b.</i> Cramoisi.	<i>e.</i> Orange.	<i>h.</i> Violet.
<i>c.</i> Écarlate.	<i>f.</i> Pourpre.	

*c. Crêtes-de-Coq naines (Celosia cristata nana).*

66. Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection	fr. 2 n
67. Variétés en mélange.	le paquet	n n 30
68. — —	25 grammes	n 4 n

## Variétés.

<i>a.</i> Cramoisi.	<i>c.</i> Orange.	<i>e.</i> Rose.
<i>b.</i> Jaune.	<i>d.</i> Pourpre.	<i>f.</i> Violet.

*c. Crêtes-de-Coq pyramidales (Celosia cristata pyramidalis).*

69. Collection de 7 variétés (7 paquets)	la collection	fr. 1 50
70. Variétés en mélange	le paquet	n n 25
71. — —	25 grammes	n 3 n

## Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>d.</i> Orange.	<i>g.</i> Violet foncé.
<i>b.</i> Écarlate.	<i>e.</i> Pourpre.	
<i>c.</i> Lilas.	<i>f.</i> Rouge sang.	

*c. Crêtes-de-Coq pyramidales à panache (Celosia cristata pyramidalis plumosa).*

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une extrême légèreté. Elles conviennent aussi bien pour la pleine terre que pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

72. Collection de 6 variétés (6 paquets)	la collection	fr. 2 n
73. Variétés en mélange	le paquet	n n 40
74. — —	25 grammes	n 5 n

## Variétés.

<i>a.</i> Carmin.	<i>c.</i> Orange.	<i>e.</i> Rose.
<i>b.</i> Cramoisi.	<i>d.</i> Pourpre.	<i>f.</i> Violet.

## GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Leukoyen*).*+c. Giroflées d'été quarantaines (Cheiranthus annuus).*

75. Collection de 20 variétés (20 paquets)	la collection	fr. 4 n
76. Variétés en mélange.	le paquet	n n 50
77. — —	25 grammes	n 10 n

## Variétés.

<i>a.</i> Blanc.	<i>h.</i> Chamois foncé.	<i>o.</i> Rose.
<i>b.</i> Bleu clair.	<i>i.</i> — rosé.	<i>p.</i> Rouge brique.
<i>c.</i> — d'azur.	<i>j.</i> Couleur de chair.	<i>q.</i> — cuivre.
<i>d.</i> Brun cannelle.	<i>k.</i> Cramoisi.	<i>r.</i> — sang.
<i>e.</i> — noirâtre.	<i>l.</i> — foncé.	<i>s.</i> Violet.
<i>f.</i> Carmin.	<i>m.</i> Jaune soufre.	<i>t.</i> — foncé.
<i>g.</i> — foncé.	<i>n.</i> Lilas.	

+c. **Giroflées d'été quarantaines hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

78. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 79. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 80. — — . . . . . 25 grammes . . . n 10 n

## Variétés.

- |                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| a. Blanc.      | c. Carmin. | e. Rose.   |
| b. Bleu clair. | d. Lilas.  | f. Violet. |

+c. **Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

81. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 82. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50

## Variétés.

- |                |                     |                  |
|----------------|---------------------|------------------|
| a. Blanc.      | c. Carmin.          | e. Rouge brique. |
| b. Bleu clair. | d. Fleur de pêcher. | f. Violet foncé. |

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

83. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 84. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 85. — — . . . . . 25 grammes . . . n 10 n

## Variétés.

- |                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| a. Blanc.      | e. Chamois.      | i. Lilas.        |
| b. Bleu clair. | f. Cramoisi.     | j. Rose.         |
| c. Brun foncé. | g. — foncé.      | k. Rouge cuivre. |
| d. Carmin.     | h. Jaune canari. | l. Violet.       |

+c. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

86. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 n  
 87. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50

## Variétés.

- |                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| a. Blanc.         | d. Couleur de chair. | g. Rose.   |
| b. Bleu clair.    | e. Cramoisi.         | h. Violet. |
| c. Chamois foncé. | f. Jaune paille.     |            |

+c. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens*).  
 Port arborescent, bouquets serrés, fleurs très-doubles.

88. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 n  
 89. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50

## Variétés.

- |                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| a. Bleu clair.    | c. Cramoisi.    | e. Incarnat. |
| b. Brun noirâtre. | d. Gris cendré. | f. Violet.   |

+c. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets perfection** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens perfectus*).

Nouvelles variétés formant de belles pyramides de 75 centimètres de hauteur, à fleurs très-grandes et très-doubles.

90. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 91. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 75

## Variétés.

- |                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| a. Blanc.      | d. Brun mordoré. | g. Rouge cuivre. |
| b. Bleu clair. | e. Carmin.       | h. Violet.       |
| c. — foncé.    | f. Rose.         |                  |

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

Semées en même temps que les *Giroflées d'été*, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les premières.

92. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 93. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50

## Variétés.

- |             |                 |                  |
|-------------|-----------------|------------------|
| a. Blanc.   | d. Cramoisi.    | g. Rouge brique. |
| b. Carmin.  | e. Lilas clair. | h. Violet.       |
| c. Châtain. | f. Rose.        |                  |



+c. Giroflées d'hiver ou en arbre (*Cheiranthus incanus*).

94. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . la collection . . . fr. 2 " "  
 95. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 50

## Variétés.

a. Blanc.	d. Carmin.	g. Rouge sang.
b. Bleu clair.	e. Mordoré foncé.	h. Violet.
c. Brun noirâtre.	f. Rose.	

## +c. Giroflées d'hiver Cocardeau.

D'un port pyramidal, de 30 à 40 centimètres de hauteur, elles sont surtout remarquables par le rameau central qui est allongé et très-fourni; on les cultive, le plus souvent, en pots où elles fleurissent richement au printemps.

96. Collection de 5 variétés (5 paquets). . . . . la collection . . . fr. 2 " "  
 97. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 75

## Variétés.

a. Blanc.	c. Carmin.	e. Violet.
b. Bleu de roi.	d. Rouge foncé.	

+c. Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

Les *Giroflées impériales* fleurissent deux fois l'an; les rameaux de fleurs sont nombreux, assez courts, compactes, bien fournis et généralement égaux; cette race est arborescente et se conserve pendant plusieurs années.

98. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . la collection . . . fr. 3 " "  
 99. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 75

## Variétés.

a. Blanc.	d. Pourpre.	g. Rouge foncé.
b. Bleu clair.	e. Rose.	h. Violet.
c. Carmin.	f. — cuivré.	

+c. Giroflées Ravenelles (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers, Goldlack, Giroflées des mu-  
railles.

100. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 101. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 50

## Variétés.

a. Bleuâtre, naine.	c. Bronze, naine.	e. Brun noirâtre, naine.
b. — en arbre.	d. Brun noirâtre, en arbre.	f. Jaune soufre, en arbre.

## HÉLIOTROPE DU PÉROU.

+c. Hélotrope du Pérou (*Heliotropium peruvianum*).

En en semant les graines au printemps sur couche, comme bon nombre de plantes annuelles, on peut en obtenir la floraison dès la première année. Le semis est préférable, parce que les plantes qui en proviennent sont plus vigoureuses et plus florifères que celles obtenues de boutures.

102. Collections de 8 variétés (8 paquets). . . . . la collection . . . fr. 3 " "  
 103. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 40  
 104. — — . . . . . 25 grammes . . . " 6 "

## Variétés.

a. Anna Turrel.	d. Reine des violettes.	g. Triomphe de Liège.
b. Docteur Livingstone.	e. Souvenir de Champigny.	h. Voltaire.
c. Gloire des massifs.	f. — de Léopold.	

## IMMORTELLLES A GRANDES FLEURS DOUBLES.

Everlasting Flower (*Strohblume*).+ Immortelles à grandes fleurs doubles (*Helichrysum monstrosum flore pleno*).

105. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
106. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
107. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 50

## Variétés.

a. Blanc.	c. Jaune.	e. Rose.
b. Brun.	d. Pourpre.	f. Rouge saumon.

+ Immortelles naines à grandes fleurs doubles (*Helichrysum monstrosum nanum flore pleno*).

108. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
109. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
110. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 50

## Variétés.

a. Blanc.	c. Brun.	e. Rose.
b. -- creme.	d. Jaune.	f. Rouge sang.

MUFLIERS A GRANDES FLEURS (*GUEULES DE LION*).Snapdragon (*Löwenmaul*).+ Muflers à grandes fleurs (*Antirrhinum majus*).

111. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
112. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
113. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 50

## Variétés.

a. Album.	d. Dalila.	g. Nigricans.
b. Brillant.	e. Firefly.	h. Striatum.
c. Crescia.	f. Papilionaceum.	

+ b. Muflers nains à grandes fleurs (*Antirrhinum majus nanum*).

114. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
115. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
116. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

## Variétés.

a. Album.	c. Firefly.	e. Papilionaceum.
b. Brillant.	d. Kermesinum.	f. Striatum.

+ b. Muflers nains Tom Pouce à grandes fleurs (*Antirrhinum majus nanum minimum*).

117. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 "
118. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 30
119. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 50

## Variétés.

a. Album.	d. Dalila.	g. Luteum.
b. — rubro-striatum.	e. Firefly.	h. — rubro-striatum.
c. Brillant.	f. Henri IV.	



## MYOSOTIS DES ALPES.

Forget-me-not (*Vergissmeinnicht*).+ *b. Myosotis des Alpes* (*Myosotis alpestris*).

Les « *Ne m'oubliez pas* » des Alpes sont de belles plantes bisannuelles, propres à la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; on les cultive aussi en pots, en serre froide, où elles produisent un agréable effet.

120. Collection de 3 variétés (3 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
121. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
122. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 4 "

## Variétés.

*a. Blanc.*| *b. Bleu.*| *c. Rose.*PALMA-CHRISTI (*RICINS*).Castor-Oil Plant (*Wunderbaum*).*c Palma-Christi* (*Ricinus major et minor*).

Les *Ricins*, par leurs grandes feuilles palmées, découpées, ornementales, produisent un bel effet dans les jardins.

132. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 3 "
133. Variétés en mélange . . . . .	10 grammes . . . . .	" " 40
134. — — . . . . .	100 " . . . . .	" 3 "

## Variétés.

*a. Africanus.**e. Compactus.**i. Purpureus cinerascens.**b. Americanus.**f. Giganteus.**j. — major.**c. Belot-Defougères.**g. Macrocarpus.**k. Sanguineus.**d. Borbonicus arboreus.**h. Macrophyllus atropurpur.**l. Tricolor.*

## PAVOTS DOUBLES.

Poppies (*Päonien-und Federmohn*).+ Pavots à fleurs de Pivoine (*Papaver somniferum pœoniaeflorum flore pleno*).

123. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
124. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
125. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

*a. Blanc.**d. Gris.**g. Rose.**b. Carmin.**e. Lilas et écarlate.**h. Violet foncé.**c. Écarlate et blanc.**f. Brun mordoré foncé.*+ Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum flore pleno*).

126. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
127. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
128. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

*a. Blanc.**d. Gris cendré.**g. Rose.**b. — et pourpre.**e. Lilas foncé.**h. Violet foncé.]**c. Brun noirâtre.**f. Pourpre.*+ Pavots Coquelicots nains doubles (*Papaver Rhœas nanum flore pleno*).

129. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 25
130. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
131. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 50

## Variétés.

*a. Écarlate.**c. Pourpre.**e. Rose et blanc.**b. — liseré de blanc.**d. Rose.*

## PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).+c. Pensées de choix (*Viola tricolor*).

135. Collection de 6 variétés (6 paquets).	la collection	fr. 2	n
136. Variétés en mélange	le paquet	n	50
137. — — — — —	25 grammes	n	5

## Variétés.

a. Blanc pur.  
b. Bleu d'azur.


c. Brun acajou.  
d. Jaune d'or.

e. Roi des noirs.  
f. Violet bordé de blanc.

138. +c. Pensées anglaises ( <i>Viola tricolor maxima</i> ).	le paquet	fr. n	50
139. — — — — —	25 grammes	n	5
140. +c. — — — — — fantaisies (— — <i>striata</i> ).	le paquet	n	1
141. — — — — —	25 grammes	n	10

Mélange de variétés striées.

142. +c. — — — — — var. Odier (— — <i>maxima maculata</i> )	le paquet	n	1 50
143. — — — — —	25 grammes.	n	30

Magnifiques *Pensées* à grandes fleurs maculées ; graines récoltées sur des plantes hors ligne.

PENSÉES ANGLAISES var. Odier, le paquet : fr. 1-50.  
25 grammes : 30 francs.

## PHLOX DE DRUMMOND.

+c. Phlox de Drummond (*Phlox Drummondii*).

144. Collection de 8 variétés (8 paquets)	la collection	fr. 2	50
145. Variétés en mélange	le paquet	n	40
146. — — — — —	25 grammes	n	4

## Variétés.

a. Blanc.  
b. — à œil lilas.  
c. Écarlate.

d. Pourpre.  
e. Rose.  
f. — tendre strié de blanc.

g. Rouge vif.  
h. Violet.



+c. **Phlox de Drummond à grandes fleurs** (*Phlox Drummondii grandiflora*).

Magnifiques variétés remarquables par la richesse des coloris et la grandeur des fleurs, qui ont, ainsi que les bouquets, des dimensions doubles de celles des anciennes variétés.

147. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 3 "
148. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 50
149. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 6 "

## Variétés.

a. Blanc.	c. Écarlate.	e. Pourpre foncé.
b. Cramoisi.	d. — à oeil blanc.	f. Violet.

## PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).+ **Pieds-d'alonette élevés** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

150. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 "
151. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
152. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 25

## Variétés.

a. Blanc.	c. Fleur de pommier.	e. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	d. Gris cendré.	f. Violet foncé.

+b. **Pieds-d'alonette nains à fleurs de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

153. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
154. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 25
155. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 1 25

## Variétés.

a. Blanc.	d. Chamois.	g. Rose.
b. Bleu foncé.	e. Fleur de pommier.	h. Violet.
c. Couleur de chair.	f. Gris cendré.	

+b. **Pieds-d'alonette nains à fleurs de Renoncule** (*D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno*).

156. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
157. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 30
158. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 "

## Variétés.

a. Blanc.	c. Gris cendré.	e. Rouge brique.
b. Couleur de chair.	d. Rose.	f. Violet.

+b. **Pieds-d'alonette Candelabre** (*Delphinium Consolida Candelabrum flore pleno*).

Variétés naines à nombreuses ramifications partant de la base, formant une sorte de candelabre pyramidal dont les branches se terminent par de beaux épis de grandes fleurs doubles.

159. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 50
160. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 40
161. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 3 "

## Variétés.

a. Blanc.	c. Bleu foncé.	e. Tricolore.
b. Bleu clair.	d. Rose.	f. Violet.

+ **Pieds-d'alonette Candelabre impérial** (*Delphinium Consolida Candelabrum imperiale flore pleno*).

Race d'un port compacte, fastigié, très-ramifié, se couvrant de nombreux épis de fleurs doubles.

162. Collection de 3 variétés (3 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
163. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 30
164. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 50

## Variétés.

a. Bleu noirâtre.	b. Rouge strié de blanc.	c. Tricolore.
-------------------	--------------------------	---------------

## PIMENT A FRUITS D'ORNEMENT.

Pepper (*Spanischer Pfeffer*).+c. Piment à fruits d'ornement (*Capsicum annum*).

Généralement considérées comme plantes potagères, la plupart des variétés de *Piment* peuvent être employées comme plantes d'ornement; les plants, levés et mis en pots, couverts de leurs fruits, et mêlés à d'autres plantes, produisent un bel effet en serre pendant l'hiver.

165. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . la collection . . . fr. 1 50

## Variétés.

a. Cerise jaune.	d. Jaune long.	g. Tomate rouge.
b. — rouge.	e. Monstrueux jaune.	h. Violet.
c. Gros carré doux.	f. — rouge.	

## POIRÉE A CARDE A FEUILLES ORNEMENTALES.

Silver Beet (*Silberbeete*).c. Poirée à cardes à feuilles ornementales (*Beta Cycia*).

Plantes dont les pétioles et les feuilles prennent un grand développement et sont colorés de blanc, de jaune, de pourpre ou de rouge.

166. Collection de 4 variétés (4 paquets). . . . . la collection . . . fr. 1 "

167. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 25

168. — — . . . . . 25 grammes . . . " 1 25

## Variétés.

a. Blanc.	b. Jaune.	c. Pourpre.	d. Rouge.
-----------	-----------	-------------	-----------

## POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlrückende Wicken*).gr. Pois de senteur (*Lathyrus odoratus*).

169. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . la collection . . . fr. 1 50

170. Variétés en mélange . . . . . 25 grammes . . . " " 40

171. — — . . . . . 100 grammes . . . " 1 50

## Variétés.

a. Blanc.	d. Couleur de chair.	g. Rouge strié de blanc.
b. — strié de rose.	e. Pourpre.	h. — vif.
c. Bleu foncé.	f. — noirâtre.	

## POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).c. Pourpier à grandes fleurs (*Portulaca grandiflora*).

172. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . la collection . . . fr. 1 50

173. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 30

174. — — . . . . . 25 grammes . . . " 3 "

## Variétés.

a. Alba striata.	c. Caryophylloides.	e. Thellusoni.
b. Aurea striata.	d. Rosea.	f. Thorburni.



**c. Pourpier à grandes fleurs doubles** (*Portulaca grandiflora flore pleno*) (FLORE, XV, 119).

Le semis de Pourpier à fleurs doubles donne toujours une certaine quantité de plantes à fleurs simples.

175. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 176. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50

**Variétés.**

a. Alba.	c. Caryophylloides.	e. Thellusoni.
b. Aurea striata.	d. Rosea.	f. Thorburni.

**REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.****China Asters** (*Astern*).**c. Reines-Marguerites pyramidales Truffant** (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*) (FLORE, VII, 132).

177. Collection de 15 variétés (15 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 4 n  
 178. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 179. — — . . . . . 25 grammes . . . n 7 50

**Variétés.**

a. Blanc.	f. Couleur de chair.	k. Rose vif.
b. — de neige.	g. Cramoisi.	l. — et blanc.
c. Bleu clair.	h. Lilas.	m. Rouge foncé.
d. — — et blanc.	i. Pourpre.	n. Violet foncé.
e. Carmin.	j. Rose.	o. — — et blanc.

**c. Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées** (FLORE, XV, 9).

180. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 181. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 182. — — . . . . . 25 grammes . . . n 6 n

**Variétés.***Fleurs blanches bordées de :*

a. Bleu.	b. Carmin.	c. Rose.	d. Violet.
----------	------------	----------	------------

**c. Reines-Marguerites pompons imbriquées.**

Race précieuse pour bouquets et pour culture en pots.

183. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 184. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 185. — — . . . . . 25 grammes . . . n 5 n

**Variétés.**

a. Blanc.	d. Cramoisi.	g. Rouge sang.
b. Bleu clair.	e. Pourpre.	h. Violet.
c. Carmin.	f. Rose.	

**c. Reines-Marguerites Victoria.**

Excellente race d'un port ferme, de hauteur moyenne, sans contredit l'une des plus belles de la collection; les fleurs en sont très-grandes, parfaitement imbriquées, de charmants coloris, et sont portées sur de solides pédoncules.

186. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 3 n  
 187. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . n n 50  
 188. — — . . . . . 25 grammes . . . n 7 50

**Variétés.**

a. Blanc.	e. Carmin et blanc.	i. Rouge sang.
b. Bleu clair.	f. Lilas.	j. Violet.
c. — d'azur.	g. Rose.	
d. Carmin.	h. — hortensia.	

**c. Reines-Marguerites demi-naines à fleurs en globe.**

Belle race d'un port parfait, bien ramifiée, robuste, à branches retombantes, très-propre à la formation des massifs; ses fleurs, grandes et pleines, sont portées sur de solides pédoncules.

189. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . .	<i>la collection</i> . . . . .	fr. 2	n
190. Variétés en mélange . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . .	n	n 50
191. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	n	5 n

**Variétés.**

a. Blanc.	e. Cramoisi.	i. Rose et blanc.
u. Bleu clair.	f. — foncé et blanc.	j. Violet.
c. — — et blanc.	g. Lilas foncé.	
d. Carmin.	h. Rose.	

**b,c. Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.**

Race tardive, naine, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs, dont l'ensemble simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite; excellente pour bordures et pour culture en pots, ses branches inférieures retombant et cachant le vase.

192. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . .	<i>la collection</i> . . . . .	fr. 2	50
193. Variétés en mélange . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . .	n	n 50
194. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	n	7 50

**Variétés.**

a. Blanc.	e. Cramoisi.	i. Rouge sang.
b. Bleu clair.	f. — et blanc.	j. Violet.
c. — — et blanc.	g. Rose.	
d. — foncé.	h. — et blanc.	

**b,c. Reines-Marguerites naines de Boltze.**

Race hâtive à fleurs d'Anémone, finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal, très-propre pour bordures et pour culture en pots.

195. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	<i>la collection</i> . . . . .	fr. 1	50
196. Variétés en mélange . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . .	n	n 50
197. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	n	5 n

**Variétés.**

a. Blanc.	d. Carmin.	g. Rose et blanc.
b. — à cœur rose.	e. — et blanc.	h. Violet foncé.
c. — — — violet.	f. Rose.	

**b,c. Reines-Marguerites naines de Shakspeare.**

Buisson compacte, riche bouquet de fleurs de longue durée, bien pleines et parfaitement imbriquées. La taille naine de cette race la rend très-propre pour bordures, petits massifs et culture en pots.

198. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	<i>la collection</i> . . . . .	fr. 2	n
199. Variétés en mélange . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . .	n	n 50
200. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	n	5 n

**Variétés.**

a. Blanc.	d. Cramoisi.	g. Rouge sang.
b. — liseré de cramoi.	e. — et blanc.	h. Violet.
c. Bleu foncé.	f. Rose.	

**b,c. Reines-Marguerites naines Empereur.**

Race très-robuste s'élevant à 25 centimètres, se ramifiant parfaitement; très-grandes fleurs pœniformes extrêmement bien faites, produisant beaucoup d'effet en massifs aussi bien qu'en pots.

201. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	<i>la collection</i> . . . . .	fr. 2	50
202. Variétés en mélange . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . .	n	n 50
203. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	n	7 50

**Variétés.**

a. Blanc.	d. Couleur de chair.	g. Rouge violacé.
b. Bleu foncé.	e. Pourpre violacé.	h. Violet foncé et blanc.
c. Carmin.	f. Rose.	



## ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).+ Roses-trémières anglaises, variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

204. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 5 "  
 205. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " 1 "

## Variétés.

a. Aurore.	e. Écarlate.	i. Rouge brunâtre.
b. Blanc.	f. Jaune soufre.	j. — cerise.
c. Brun noirâtre.	g. Lilas rosé.	k. — cuivre.
d. Carmin.	h. Rose saumoné.	l. Violet foncé.

+ Roses-trémières, variétés écossaises (*Althæa rosea flore pleno*).

206. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 3 "  
 207. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " 75 "

## Variétés.

a. Blanc.	e. Cramoisi.	i. Rose.
b. — à fond lilas.	f. Écarlate.	j. — fleur de pêcher.
c. — à fond violet.	g. Jaune.	k. Rouge cerise.
d. Carmin.	h. — soufre.	l. Violet.

## SALPIGLOSSIS A GRANDES FLEURS.

+ *Salpiglossis à grandes fleurs (Salpiglossis Barclayana)*.

208. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 25  
 209. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " 25  
 210. — — — — — 25 grammes . . . " 2 "

## Variétés.

a. Blanc jaunâtre.	c. Écarlate.	e. Rose.
b. Bleu d'azur.	d. Jaune soufre.	f. Rouge sang.

+ *Salpiglossis nains à grandes fleurs (Salpiglossis Barclayana nana)*.

211. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 212. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " 30  
 213. — — — — — 25 grammes . . . " 2 50

## Variétés.

a. Bleu d'azur.	c. Jaune soufre.	e. Pourpre.
b. Écarlate.	d. Orange panaché.	f. Rose.

## SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).+ *Scabienses élevées (Scabiosa atropurpurea major)*.

214. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 "  
 215. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " 25  
 216. — — — — — 25 grammes . . . " 1 25

## Variétés.

a. Blanc.	c. Lilas.	e. Pourpre noirâtre et blanc.
b. Cerise et blanc.	d. Pourpre foncé.	f. Rouge brique.

- +*b.* Scabieuses naines à fleurs doubles (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*) (FL., XII, 41).  
 217. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 218. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 30  
 219. — — . . . . . 25 grammes . . . " 1 50

## Variétés.

- |                        |  |                    |  |                         |
|------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
| <i>a.</i> Blanc.       |  | <i>c.</i> Lilas.   |  | <i>e.</i> Rose.         |
| <i>b.</i> Bleu d'azur. |  | <i>d.</i> Pourpre. |  | <i>f.</i> Rouge brique. |

## SENEÇONS DOUBLES.

*Jacobæa* (*Senecio*).+ Seneçons à fleurs doubles (*Senecio elegans flore pleno*).

220. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 221. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 25  
 222. — — . . . . . 25 grammes . . . " 2 50

## Variétés.

- |                     |  |                         |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <i>a.</i> Blanc.    |  | <i>c.</i> Gris ardoisé. |  | <i>e.</i> Rose.         |
| <i>b.</i> Cramoisi. |  | <i>d.</i> Pourpre.      |  | <i>f.</i> Rouge cuivre. |

+*b.* Seneçons nains à fleurs doubles (*Senecio elegans nanus flore pleno*).

223. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 "  
 224. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 30  
 225. — — . . . . . 25 grammes . . . " 3 "

## Variétés.

- |                         |  |                    |  |                         |
|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
| <i>a.</i> Blanc.        |  | <i>c.</i> Pourpre. |  | <i>e.</i> Rouge cuivre. |
| <i>b.</i> Gris ardoisé. |  | <i>d.</i> Rose.    |  | <i>f.</i> Violet.       |

## THUNBERGIES GRIMPANTES.

*c.gr.* Thunbergies grimpantes (*Thunbergia alata*).

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

226. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 1 50  
 227. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 30  
 228. — — . . . . . 25 grammes . . . " 4 "

## Variétés.

- |                   |  |                             |  |                            |
|-------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| <i>a.</i> Alata.  |  | <i>c.</i> Alata aurantiaca. |  | <i>e.</i> Alata Freyeri.   |
| <i>b.</i> — alba. |  | <i>d.</i> — Barkeri.        |  | <i>f.</i> — intus candida. |

## VERVEINES HYBRIDES DES JARDINS.

+*c.* Verveines hybrides des jardins (*Verbena hybrida*).

229. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . la collection . . . fr. 2 50  
 230. Variétés en mélange . . . . . le paquet . . . " " 50  
 231. — — . . . . . 25 grammes . . . " 6 "  
 232. — striées, dites *Verveines italiennes*, en mélange . . . le paquet . . . " " 60  
 233. — — . . . . . 25 grammes . . . " 10 "

Le semis donne bon nombre de plantes à fleurs bariolées et striées de toutes couleurs.

## Variétés.

- |                  |  |                             |  |                       |
|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| <i>a.</i> Blanc. |  | <i>c.</i> Bleu à œil blanc. |  | <i>e.</i> Rouge sang. |
| <i>b.</i> Bleu.  |  | <i>d.</i> Écarlate.         |  | <i>f.</i> Violet.     |



## ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c. *Zinnia* à fleurs doubles (*Zinnia elegans flore pleno*) (FLORE, XIII, 189).

234. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 1 50
235. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 30
236. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 2 50

## Variétés.

a. Blanc.	d. Jaune d'or.	g. Pourpre.
b. Carmin.	e. — soufre.	h. Violet.
c. Écarlate.	f. Lilas.	

c. *Zinnia* nains à fleurs doubles (*Zinnia elegans nana flore pleno*) (FLORE, XIII, 189).

237. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 50
238. Variétés en mélange . . . . .	le paquet . . . . .	" " 40
239. — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 4 "

## Variétés.

a. Carmin.	c. Jaune.	e. Rose saumoné.
b. Écarlate.	d. Pourpre.	f. Violet.

240. c. <i>Zinnia</i> à fleur double vermillon éclatant . . . . .	le paquet . . . . .	fr. " 40
241. — — — — — . . . . .	25 grammes . . . . .	" 4 "

Variété bien double et se reproduisant exactement. Son brillant coloris vermillon produit un très-grand effet et la rend précieuse pour massif unicolore.

## GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergräser*).

Les épis gracieux de la plupart des Graminées ci-dessous indiquées, se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases qu'on puisse voir.

N. B. Les espèces précédées du signe + sont vivaces.

242. Collection de 12 espèces à mon choix (12 paquets) . . . . .	la collection . . . . .	fr. 2 "
--	-------------------------	---------

	Fr. C.		Fr. C.
243. <i>Agrostis laxiflora</i> . . . . .	" 25	260. <i>Chloropsis Blanchardiana</i> . . . . .	" 25
244. — <i>minutiflora</i> . . . . .	" 25	261. <i>Coix exaltata</i> . . . . .	" 25
245. — <i>nebulosa</i> . . . . .	" 25	262. — <i>Lacryma</i> . . . . .	" 25

Espèce extrêmement fine, dont l'ensemble simule une sorte de brouillard.

246. <i>Aira pulchella</i> . . . . .	" 25
--------------------------------------	------

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée pour la confection des bouquets.

247. + <i>Andropogon bombycinus</i> . . . . .	" 25
---	------

248. + <i>Arundinaria falcata</i> . . . . .	" 40
---	------

249. + <i>Arundo conspicua</i> . . . . .	" 25
--	------

250. + — <i>Donax</i> . . . . .	" 25
---------------------------------	------

Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres, et est très-utile comme décoration de pelouses.

251. + — — <i>foliis varieg.</i> (Fl., XIV, 81). " 50	
---	--

Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc; l'une des plus belles plantes panachées qui existent.

252. + — <i>gynerioides</i> . . . . .	" 25
---------------------------------------	------

253. + <i>Bambusa gracilis</i> . . . . .	" 30
--	------

254. <i>Briza geniculata</i> . . . . .	" 25
--	------

255. — <i>maxima</i> . . . . .	" 25
--------------------------------	------

256. — <i>minima</i> . . . . .	" 25
--------------------------------	------

257. <i>Bromus brizæformis</i> . . . . .	" 25
--	------

258. <i>Chloris gracilis</i> . . . . .	" 25
--	------

259. — <i>truncata</i> . . . . .	" 25
----------------------------------	------

Les graines de *Coix* sont entourées d'une écaille pierreuse perforée et servent à faire des chapelets.

263. + <i>Eulalia japonica</i> . . . . .	" 50
--	------

Graminée ornementale formant des touffes d'environ 2 mètres de hauteur; feuilles longues et relativement larges, à nervure médiane blanche, d'un élégant effet.

264. + — — <i>foliis albo-lineatis</i> (FLORE,	
--	--

XXI, 109) . . . . .

Charmanne Graminée ornementale encore nouvelle, à feuilles élégamment rubanées de blanc longitudinalement.

265. + — — <i>zebrina</i> . . . . .	" 1 50
-------------------------------------	--------

Belle Graminée nouvelle très-robuste et rustique, formant de fortes touffes à feuilles alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions recourbées, de grand effet; elle est très-ornementale dans les parterres, en plein air, pendant l'été et l'automne, et dans les serres, en hiver.

266. + <i>Gymnotrix caudata</i> . . . . .	" 25
---	------

267. + — <i>japonica</i> . . . . .	" 25
------------------------------------	------

268. + — <i>latifolia</i> . . . . .	" 25
-------------------------------------	------

269. + <i>Gynerium argenteum</i> (FLORE,	
--	--

XI, 197 et XX, 49). . . . .

270. + — — <i>carmineum</i> Rendatleri	
--	--

(FLORE, XX, 49). . . . .

	Fr. C.
271. + <i>Gynerium jubatum</i> . . . . .	40
Feuilles larges, d'un vert foncé, recourbées à la partie supérieure; du centre sortent de nombreuses hampes garnies de fleurs d'un rose rougeâtre à reflet argenté.	
272. <i>Hordeum jubatum</i> . . . . .	25
273. <i>Lagurus ovatus</i> . . . . .	25
274. <i>Lamarekia aurea</i> . . . . .	25
275. <i>Leptochloa gracilis</i> . . . . .	25
276. — <i>tenerrima</i> . . . . .	25
277. <i>Panicum capillare</i> . . . . .	25
278. <i>Pennisetum compressum</i> . . . . .	25
279. — <i>fimbriatum</i> . . . . .	25

	Fr. C.
280. <i>Pennisetum longistylum</i> . . . . .	25
281. <i>Poa amabilis</i> . . . . .	25
282. + <i>Stipa elegantissima</i> . . . . .	30
283. + — <i>pennata</i> . . . . .	25
284. + <i>Uniola latifolia</i> . . . . .	25
285. <i>Zea Mais Caragua</i> . . . . .	25
Mais gigantesque, très-ornemental quand on le plante en groupe dans les pelouses.	
286. — — <i>foliis vittatis</i> (Fl., XVI, 121) . . . . .	25
287. — — — — 25 grammes . . . . .	25

Charmante variété à feuilles rubanées de blanc.

## GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

### Flower Seeds, Annuals (*Summerblumen*).

	Fr. C.
288. <i>c. Abronia umbellata</i> (Fl., XI, 41) . . . . .	25
Plante rampante à fleurs d'un rose lilacé en larges ombelles.	
289. <i>c. Acroclinium roseum</i> (Fl., IX, 273) . . . . .	25
290. <i>c. — — flore albo</i> . . . . .	25
Immortelles à fleurs blanches ou roses.	
291. + <i>b. Adonis vernalis</i> . . . . .	25
On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.	
292. + <i>c. Ageratum conspicuum</i> . . . . .	1
Belle plante fleurissant de juin jusqu'aux gelées; fleurs d'un blanc pur, produisant un bon effet dans les corbeilles et les plates-bandes; elles sont aussi très-propres à la confection des bouquets.	
293. + <i>c. — Lasseauxi</i> . . . . .	75
Fleurs d'un beau rose, excellentes pour bouquets.	
294. + <i>c. — mexicanum</i> . . . . .	25
295. + <i>c. — — album</i> . . . . .	25
296. + <i>c. b. — — nanum</i> . . . . .	40
297. + <i>c. b. — — album</i> . . . . .	50
Ces deux dernières variétés sont constantes et forment de belles touffes bien florifères; excellentes pour bordures.	
298. + <i>Agrostemma cœli-rosa</i> . . . . .	25
299. + — — — <i>alba</i> . . . . .	25
300. + — — — <i>hybrida</i> . . . . .	25
Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc.	
301. + <i>Alonsoa albiflora</i> . . . . .	25
Fleurs d'un blanc pur à œil jaune, en longue grappe terminale; cultivée en pots et tenue en serre, cette espèce fleurit depuis l'automne jusqu'à la fin de l'hiver.	
302. + — <i>linearis</i> . . . . .	25
Buisson compacte garni d'un feuillage ténu qui se couronne de longs épis de fleurs d'un rouge vif.	
303. + — <i>myrtifolia</i> . . . . .	25
Cette espèce atteint environ 2 pieds et demi d'élévation, et donne de nombreux épis de fleurs d'un rouge vif.	
304. + — — <i>alba</i> . . . . .	50
Belle variété de la précédente, à fleurs blanches.	
305. + <i>b. Alyssum maritimum</i> . . . . .	25
Petites fleurs blanches, odorantes, en épi.	
306. <i>c. Amarantus amabilis tricolor</i> . . . . .	25
Variété à larges feuilles longuement aiguës, élégamment colorées de jaune, de rose et de rouge.	
307. <i>c. — bicolor</i> . . . . .	25
308. <i>c. — caudatus gibbosus</i> . . . . .	50
Variété de l' <i>Amarantus Queen de Renard</i> , ne produisant qu'une seule longue tige qui se penche vers le sol et est irrégulièrement garnie de nœuds à fleurs d'un rouge sang.	

	Fr. C.
309. <i>c. Amarantus Henderi</i> (FLORE, XX, 30) . . . . .	25
310. <i>c. — hybridus Prince of Wales</i> . . . . .	40
Variété à très-larges feuilles, dont la partie centrale est d'un cramoisi très-vif, le reste d'un jaune d'or veiné de carmin.	
311. <i>c. — — Queen Victoria</i> . . . . .	40
Brilliant variété à long feuillage rouge et jaune.	
312. <i>c. — melancholicus ruber</i> . . . . .	25
Feuillage d'un rouge sang; excellente variété pour groupe et pour bordure de massifs.	
313. <i>c. — nobilis pyramidalis</i> . . . . .	50
Magnifique espèce à feuillage ornemental d'une nuance claire, ayant environ 1 mètre de hauteur et 50 centimètres de diamètre, à fleurs d'un pourpre foncé.	
314. <i>c. — salicifolius</i> (FLORE, XIX, 3) . . . . .	30
315. <i>c. — — splendidissimus</i> . . . . .	30
Variété d'un port compacte, à feuillage d'un jaune d'or vif, nuancé de pourpre.	
316. <i>c. — — viridiflorus</i> . . . . .	50
Variété à tige et à feuilles vertes, dont les sommets sont d'un rouge saumon.	
317. <i>c. — tricolor</i> . . . . .	25
318. + <i>Ammobium alatum</i> . . . . .	25
319. + <i>Anchusa angustifolia</i> . . . . .	40
Excellente plante pour massifs, dont les fleurs, d'un bleu d'azur, peuvent remplacer avantageusement le <i>Myosotis bleu</i> dans les bouquets.	
320. + <i>Argemone mexicana</i> . . . . .	25
321. + — — <i>alba</i> . . . . .	25
322. <i>bc. Asperula azurea setosa</i> . . . . .	25
Jolie plante naine donnant, pendant tout l'été, d'abondantes ombelles de fleurs d'un bleu d'azur, odorantes.	
323. <i>c. Bartonia aurea</i> . . . . .	25
324. <i>c. Brachycome iberidifolia</i> . . . . .	25
Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches, rayonnées, de la forme de celles des <i>Cinéraires hybrides</i> .	
325. + <i>Calandrinia grandiflora</i> . . . . .	25
326. + — <i>speciosa</i> . . . . .	25
327. + — — <i>Burridgei</i> . . . . .	25
328. + <i>Calendula officinalis Le Proust</i> . . . . .	25
329. + — — <i>Meteor</i> . . . . .	1
Nouvelle variété à très-grandes fleurs doubles, d'un brillant orange foncé sur fond jaune paille presque blanc; elle donne une succession de fleurs depuis mai jusqu'à la fin de l'automne; très-recommandable.	
330. + — <i>Pongei flore pleno</i> . . . . .	25



Fr. C.

331. + *Callirrhoe pedata nana compacta* " 25  
Belle variété formant des touffes compactes, naines et très-florifères.

332. + *Campanula retrorsa* . . . . . 1 "  
Belle variété donnant de nombreuses longues tiges, qui se couvrent, ainsi que leurs ramifications, de fleurs d'un beau violet foncé, qui en font de véritables guirlandes.

333. + *Carduus candidissimus* . . . . . 1 "  
Belle plante ornementale dont les feuilles et les tiges sont blanches.

334. + — *Marianus* . . . . . " 25

335. + *Centaurea Cyanus*. . . . . " 25  
Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

336. + *b. Cheiranthus maritimus* . . . . . " 25

337. + *b. — — flore albo* . . . . . " 25

338. + *b. — — mutabilis* . . . . . " 25

339. + *Chrysanthemum carinatum Dun-*  
*netti flore pleno* . . . . . " 25

Variété précieuse pour grands massifs; fleurs blanches, doubles.

340. + — — — — *luteo pleno* . . . . . " 30  
Pendant de la variété précédente, à fleurs d'un jaune d'or, doubles.

341. + *c. — — inodorum flore pleno* . . . . . " 50  
Fleurs blanches, doubles et semi-doubles, depuis mai jusqu'en novembre.

342. + *c. Cineraria maritima*. . . . . " 25

343. + *c. — — asplenifolia*. . . . . " 25

344. + *c. — — candidissima*. . . . . " 40

Espèce à feuilles blanches élégamment découpées, très-recherchée pour bordures de petits massifs en pleine terre, où elle fait un bel effet pendant l'été.

345. + *Clarkia pulchella integripetala*. . . . . " 25

346. + — — — — *alba*. . . . . " 25

347. + — — — — *marginata*. . . . . " 25

348. + — — — — *pulcherrima*. . . . . " 25

349. *c. Cleome arborea*. . . . . " 25

350. *c. — sesquiorgyalis*. . . . . " 25

351. *c. — speciosa*. . . . . " 25

Plante arborescente pour groupes.

352. *c, gr. Cobæa scandens*. . . . . " 50

353. *c, gr. — — flore albo* . . . . . " 75

Belles plantes grimpantes à très-grandes fleurs blanches ou violettes, en cloche, propres à garnir des treillis, colonnettes, balcons, etc., et à former des guirlandes.

354. + *c. Cœlestina (Ageratum) superbiens* 1 50

Cette belle nouveauté est une des meilleures acquisitions de ces dernières années pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Ses fleurs sont d'un beau bleu violacé qui contraste agréablement avec la teinte rouge des capitules non encore épanouis.

355. + *b. Collinsia bartsiaefolia*. . . . . " 25

356. + *b. — bicolor carnea*. . . . . " 25

357. + *b. — multicolor*. . . . . " 25

358. *gr. c. Convolvulus aureus superbus* " 25

Espèce grimpante à belles fleurs d'un jaune d'or.

359. *c. — mauritanicus (Fl., XXI, 61)* " 25

Espèce à petit feuillage, formant des tapis qui se garnissent de milliers de petites corolles d'un bleu foncé, excellente pour vases suspendus.

360. + *Coreopsis cardaminifolia hybrida*  
*nana* . . . . . " 25

361. + — *nana marmorata*. . . . . " 25

362. *c. Cosmidium Burridgeanum (FLORE,*  
*XIII, 55)* . . . . . " 25

Fleurs oranges à centre beau velouté,

Fr. C.

363. + *c. Caphea purpurea nana, en mélange* " 25  
364. + *c. — silenoides* . . . . . " 25

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs sortes de plantes disposées par zones. Port rigide, longue et constante floraison.

365. *c. Datura fastuosa flore albo pleno*. . . . . " 25

366. *c. — — Huberiana, en mélange*. . . . . " 25

367. *c. — — violacea flore pleno*. . . . . " 25

368. *c. — — humilis flore albo pleno*  
(FLORE, X, 9) . . . . . " 25

369. *c. — — — pleno* . . . . . " 25

370. *c. — — meteloides (FLORE, XII, 163)* " 25

Espèce à grandes fleurs d'un blanc pur bordé de pensée, délicieusement parfumées.

371. + *Delphinium nudicaule (FL., XIX, 29)* " 50  
Fleurs d'un rouge cochenille, à centre jaune.

372. + *Dianthus barbatus* . . . . . " 25

373. — — 25 grammes . . . . . 2 "

Oeillet de poète, Bouquet parfait en mélange de superbes variétés.

374. + — — — *Dunnetti flore pleno*. . . . . " 40

Variété à fleurs bien pleines, d'un cramoi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

375. + — — — *flore pleno*. . . . . " 50

376. + *c. — — hybridus semperflorens*. . . . . 2 "

Cette belle nouveauté donne, dès la première année de semis, de charmantes fleurs doubles de toutes couleurs. Demi-naine et très-vigoureuse, elle sera employée avec succès pour la garniture des massifs, et sera recherchée des fleuristes pour culture en pots et confection de bouquets.

377. + *c. — sinensis diadematus flore*  
*pleno (FLORE, XV, 155)* " 50

378. — — — — 25 grammes . . . . . 5 "

Oeillets de Chine à fleurs doubles.

379. + *c. — — flore pleno* . . . . . " 25

380. — — — — 25 grammes . . . . . 2 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles.

381. + *c. — — Heddevigi (FL., XI, 197)* " 30

382. — — — — 25 grammes . . . . . 4 "

383. + *c. — — — Crimson Bells*. . . . . " 50

384. — — — — 25 grammes . . . . . 5 "

Belle nouveauté à fleurs de dimensions extraordinaires, finement laciniées et d'un brillant cramoi.

385. + *c. — — — Eastern Queen* . . . . . " 50

386. — — — — 25 grammes . . . . . 5 "

Nouvelle variété à très-grandes fleurs roses marbrées, de forme modèle.

387. + *c. — — imperialis flore pleno* . . . . . " 25

388. — — — — 25 grammes . . . . . 2 50

389. + *c. — — laciniatus (FLORE, XII,*  
*199)* . . . . . " 30

390. — — — — 25 grammes . . . . . 4 "

391. + *c. — — — flore pleno* . . . . . " 30

392. — — — — 25 grammes . . . . . 4 "

393. + *c. — — — striatus flore pleno* . . . . . " 30

394. — — — — 25 grammes . . . . . 4 "

395. + *c. — — — nanus cupreatus*. . . . . " 25

396. + *c. — — — roseus splendens fl. pl.* " 30

397. *c. Didiscus cæruleus*. . . . . " 25

Ombelles de jolies fleurs d'un bleu tendre.

398. *c. Echium candicans*. . . . . " 50

Bonne plante pour massifs, atteignant 30 à 60 centimètres de hauteur; nombreuses fleurs écarlates, passant au cramoi et au violet; floraison prolongée.



Fr. C.  
399. *c. Erodium gruinum* . . . . . n 50

L'algrette cornue de la graine d'*Erodium gruinum* posée, à un haut degré, des propriétés hygrométriques. Nous joignons à chaque paquet un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

400. + *Eschscholtzia californica* . . . . . n 25

401. + — — flore albo . . . . . n 25

402. + — — *Mandarin* . . . . . n 50

Nouveauté dont les fleurs et les boutons sont d'un orange vif; dans toutes les phases de sa floraison, son coloris est d'un ton merveilleux.

403. + — — rosea . . . . . n 25

404. + — — crocea flore pleno . . . . . n 75

Magnifique nouveauté très-ornementale, à très-grandes fleurs doubles d'un brillant orange écarlate, passant au rouge saumon.

405. + — — flore albo pleno . . . . . 1 50

Belle nouveauté provenant de la précédente, à grandes fleurs blanches doubles, tout à fait hors ligne.

406. *c. Euphorbia variegata* . . . . . n 30

Espèce très-ornementale à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

407. + *c. Gaillardia Amblyodon* . . . . . n 25

Très-belle espèce unicolore, très-florifère, à fleurs d'un rouge saumon.

408. + *c. — Drummondiana* . . . . . n 25

Variétés en beau mélange.

409. + *c. Gnaphalium lanatum* . . . . . n 40

410. + *c. — foliis argenteo-margin.* . . . . n 50

Belles espèces à feuilles argentées, très-recherchées pour bordure de massifs de plantes à feuillages multicolores.

411. + *Godetia rubicunda splendens* . . . . . n 25

412. + — var. *Lady Albemarle* . . . . . n 40

Variété à très-grandes fleurs cramoisies bordées de lilas, surpassant toutes ses congénères.

413. + — var. *The Bride* . . . . . n 25

414. + — *Whitneyi Brillant* . . . . . 1 n

Nouveauté à belles et grandes fleurs d'un carmin vif bordé de rose tendre, d'un port nain et compacte. C'est une plante précieuse, surtout pour la formation des massifs.

415. *c. Gomphrena globosa nana compacta* 1 n

Belle nouveauté de 12 centimètres de hauteur sur 18 de diamètre, d'un port nain et compacte, à fleurs d'un rouge violacé, incomparable pour massifs et culture en pots.

416. + *Gypsophila elegans* . . . . . n 25

417. + *b. — muralis* . . . . . n 25

418. + — — *viscosa* . . . . . n 25

Les *Gypsophiles* donnent des milliers de petites fleurs d'une extrême ténuité, qui sont indispensables dans les bouquets.

419. *c. Helianthus californicus insignis*

flore pleno (FLORE, XV, 37) . . . . . n 25

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-pleines, jaunes à centre vert.

420. *c. — peruvianus flore pleno* . . . . . n 75

Nouvelle espèce de Soleil d'un port nain, pyramidal, à fleurs doubles, jaunes tigrées de noir.

421. + *c. Humea elegans* . . . . . n 40

422. + *c. — alba* . . . . . n 75

423. + *c. — purpurea* . . . . . n 50

Les variétés de *Humea elegans* sont très-aromatiques et portent de grands plumets qui se conservent à l'instar des épis de Graminées.

424. + *b. Iberis (Thlaspi) amara* . . . . . n 25

425. + *b. — coronata Tom Thumb* . . . . . n 50

426. + *b. — umbellata carnea* . . . . . n 25

427. + *b. — formosa* . . . . . n 25

428. + *b. — lilacina* . . . . . n 25

Fr. C.  
429. *bc. Ionopsidium acaule* (Fl., IV, 389) n 25

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas, fleurissant en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

430. *gr. Ipomoea (Convolvulus) coccinea* . . . . . n 25

431. *gr. — hederacea grandiflora alba* . . . . . n 25

432. *gr. — — lilacina* . . . . . n 25

433. *gr. — limbata* . . . . . n 25

434. *gr. — Quamoclit* . . . . . n 25

435. *gr. — alba* . . . . . n 25

436. + *c. Ipomopsis elegans aurora* . . . . . n 25

437. + *c. — cupreata* . . . . . n 25

438. + *c. — superba* . . . . . n 25

Très-belles plantes bisannuelles dans les coloris rouge, jaune pankin, orange, etc., à hiverner en orangerie.

439. + *c. Isotoma axillaris* . . . . . n 25

Belle plante d'un joli port, à fleurs d'un bleu clair, assez grandes.

440. *gr. Lathyrus Napoleonis (tingitanus)* n 25

441. *Leptosiphon (Gilia) aureus* (FLORE, IX, 97) . . . . . n 25

442. *b. — hybridus, en mélange* . . . . . n 30

Jolies variétés à fleurs de diverses nuances, brun acajou, lilas, orange, etc.

443. *b. — roseus* . . . . . n 30

Fleurs d'un rose tendre, disposées en corymbe et se succédant pendant des semaines.

444. *Linaria bipartita splendens* . . . . . n 25

445. *b. — maroccana carminea* . . . . . n 30

Belle variété carmin foncé, supérieure à toutes les autres sortes et ne dépassant pas 25 centimètres de hauteur.

446. *b. Linum grandiflorum* (Fl., IX, 279) n 30

447. — — 25 grammes . . . . . 1 50

Le Lin à grandes fleurs d'un rouge vif, ornement indispensable de tous les jardins.

448. *b. — roseum* . . . . . n 30

449. + *c, gr. Loasa lateritia* . . . . . n 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs d'un rouge minium.

450. + *c. Lobelia cardinalis var. Queen*

*Victoria* . . . . . 1 n

Variété à fleurs d'un rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines; ses tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont aussi teintées de rouge, et ajoutent beaucoup à son mérite.

451. + *cb. — erinoides alba* . . . . . n 25

452. + *cb. — — kermesina* . . . . . n 40

Grande fleur d'un cramoisi pourpré.

453. + *cb. — — Lindleyana* . . . . . n 25

Fleur d'un rose violacé, gorge blanche.

454. + *cb. — — marmorata* . . . . . n 30

Grande fleur blanche à macule bleue.

455. + *cb. — — Paxtoni* . . . . . n 30

Fleur d'un bleu foncé à œil blanc.

456. + *cb. — — Pearl* . . . . . n 40

Fleur blanche à bord bleu.

457. + *cb. — — speciosa* . . . . . n 30

Fleur d'un bleu foncé à œil blanc.

458. + *cb. — — Crystal Palace* . . . . . n 30

Grande fleur d'un bleu foncé à œil blanc pur.

459. + *cb. — — — compacta* . . . . . n 40

460. *Lupinus albo-coccineus* . . . . . n 25

Epi de fleurs mi-rouge, mi-blanc pur.

461. — *Dunnetti atrovioleaceus* . . . . . n 25

Long épi de fleurs variées de violet, de blanc et de jaune.



Fr. C.

Fr. C.

462. *Lupinus nanus* . . . . . n 25  
Espèce à fleurs bleues, en épi compacte.
463. — — flore lilacino . . . . . n 25  
Variété à fleurs d'un bleu porcelaine.
464. — — subramosus . . . . . n 25  
Espèce automnale naine; fleurs d'un bleu foncé à œil blanc.
465. — — venustus tricolor . . . . . n 25  
Variété d'un port compacte, s'élevant à deux pieds, à épis de fleurs tricolores.
466. + *Malope grandiflora* . . . . . n 25
467. c. *Martynia fragrans* . . . . . n 25
468. + *Matricaria capensis* . . . . . n 25  
Belle espèce à fleurs blanches, très-doubles, excellentes pour bouquets.
469. + — — *eximia flore pleno* . . . . . n 25
470. + — — — *grandiflora flore pleno* . . . . . n 25
471. + — — — *nana flore pleno* . . . . . n 25
472. c. *Mesembryanthemum crystallinum* n 25  
La *Glaciale* dont les feuilles sont chargées de vésicules transparentes qui les font paraître comme couvertes de glace.
473. c. — — tricolor . . . . . n 25
474. +c. *Mimulus cardinalis* . . . . . n 25
475. +c. — — cupreus . . . . . n 25
476. +c. — — — *multimaculatus (tigri-dioides)* (FLORE, XV, III) n 40  
Mélange de belles variétés à grandes corolles tigrées et bariolées.
477. cb. — — *moschatus* . . . . . n 30  
La petite plante à muse qu'on voit à toutes les fenêtres.
478. +c. — — *quinquevulnerus maximus* n 40  
Mélange de variétés à grandes fleurs à cinq macules.
479. +c. *Myosotis azorica* . . . . . n 50
480. +c. — — alba . . . . . n 50
481. +c. — — — *coelestina* . . . . . n 50  
Très-jolies sortes de *Souvenez-vous de moi* pour culture en pots. Touffes compactes, fleurs blanches, bleu azuré, ou bleu foncé pendant l'été.
482. +c. — — *palustris* . . . . . n 25  
Le poétique *Ne m'oubliez-pas*, le *Forget-me-not* des Anglais, le *Vergeimnisch* des Allemands.
483. +c. — — — *semperflorens* . . . . . n 75  
Nouvelle variété à longue et abondante floraison, depuis mai jusqu'en novembre; fleurs d'un joli bleu de ciel, plus grandes que celles des sortes précédentes.
484. +c. — — — alba . . . . . 1 25  
Nouvelle variété de la précédente, à fleurs blanches.
485. +b. *Nemophila discoidalis* (FLORE, II, août, pl. VII) . . . . . n 25
486. +b. — — insignis . . . . . n 25
487. +b. — — — *purpurea rubra* . . . . . n 25
488. +b. — — *maculata* (FLORE, V, 431) . . . . . n 25
489. +b. — — — *purpurea* . . . . . n 25
490. +c. *Nicotiana atropurpurea grandiflora* . . . . . n 25  
Grande plante d'un aspect étrange; larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.
491. +c. — — *glauca* . . . . . n 25  
Tabac en arbre bisannuel d'un port majestueux, pyramidal; tige forte, grandes feuilles glauques.
492. +c. — — *macrophylla foliis varieg.* n 30
493. +c. — — — *gigantea* . . . . . n 25  
Variété très-ornementale à larges feuilles d'un vert luisant panaché de blanc; à planter en groupe ou isolément dans les pelouses.
494. +c. — — *wigandioides* . . . . . n 25

495. +c. *Nycteria capensis (Erinus lychnidea)* . . . . . n 25
496. + *Omphalodes linifolia (Cynoglossum)* . . . . . n 25  
Feuilles et tiges cendrées, fleurs blanches; bonne bordure pour massifs à feuillages rouges.
497. +c. *Oxalis corniculata foliis atropurpureis* (FLORE, XII, 47) . . . . . n 30  
Ressemble au petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs d'un jaune d'or.
498. +c. — — *floribunda, en mélange.* . . . . . n 25  
Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées, excellentes pour culture en appartement.
499. c. — — *rosea* . . . . . n 25
500. c. — — — alba . . . . . n 50
501. + *Papaver Murselli* . . . . . n 25
502. c. *Perilla nankinensis* . . . . . n 25
503. — — — 25 grammes . . . . . 2 n  
Très-beau feuillage pourpre noirâtre.
504. c. — — — *atropurpurea fol. laciniatis* n 30
505. — — — — 25 grammes . . . . . 3 n
506. c. *Petunia hybrida Countess of Ellesmere* . . . . . n 25  
Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.
507. c. — — — flore pleno . . . . . 1 50  
Les semis de *Petunia* doubles donnent environ 20 % de fleurs pleines.
508. c. — — — *inimitable* . . . . . 1 50  
Graines récoltées sur de belles variétés à grandes fleurs maculées, bariolées ou marbrées.
509. c. — — — *kermesina multiflora* . . . . . n 25  
Variété à petites fleurs d'un rouge ponceau, propre à former de beaux massifs unicolores.
510. c. — — — *robusta flore pleno* . . . . . 2 n  
Nouvelle race formant des touffes compactes de 30 centimètres de hauteur sur 35 centimètres de largeur; fleurs de couleurs variées dans toutes les nuances propres aux *Petunia*, doubles et parfois frangées. Excellente sorte pour culture en pots.
511. c. — — — *striata* . . . . . 1 n  
Graines récoltées sur de belles variétés à fleurs striées.
512. c. — — — *nyctaginiflora* . . . . . n 25  
Fleurs blanches, très-odorantes.
513. gr. *Phaseolus multiflorus (coccineus)* n 25  
*Haricot d'Espagne* à longues grappes de fleurs vermillonnées, bicolores, blanches, etc.
514. +c. *Phlox Drummondii* Heinh. n 50  
Belle variété à fleurs vermillon à la face supérieure des pétales, d'un rose transparent en dessous.
515. +c. — — — alba . . . . . 1 n  
Variété nouvelle de la précédente, à fleurs d'un blanc pur.
516. +c. — — — *striata* . . . . . n 75  
Fleurs d'un vermillon vif strié de blanc; port pyramidal et compacte.
517. +c. *Physalis Alkekengi* . . . . . n 25  
Plante dont les fruits rouges sont entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange; d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.
518. + *Polygonum orientale* . . . . . n 25
519. + — — — flore albo . . . . . n 25
520. + — — — *speciosum (pumilum)* . . . . . n 25
521. +cb. *Pyrethrum parthenifolium aureum Golden Feather* . . . . . n 25
522. — — — — 25 grammes . . . . . 4 n  
On forme, en plein soleil, de fort jolies bordures d'un jaune d'or avec cette variété; elle y fait un bel effet de contraste avec les autres nuances qu'elle entoure.



Fr. C.

523. +cb. *Pyrethrum parthenifolium*  
aureum laciniatum. . . . . n 50  
Variété remarquable par ses feuilles d'un jaune orangé gracieusement laciniées, plus naine et plus belle, pour bordures, que la variété précédente par le contraste qu'elle produit avec les nuances des autres plantes.
524. +cb. *Reseda odorata grandiflora*  
amélioré . . . . . n 25
525. — — — 25 grammes . . . . . 1 50
526. +cb. — — — *Diamant* . . . . . 1 50  
Variété nouvelle très-intéressante, à fleurs d'un blanc pur, d'un effet ravissant.
527. +cb. — — — *gigantea pyramidalis* n 25
528. — — — — 25 grammes . . . . . 2 50  
Magnifique variété pyramidale à épis compactes de larges fleurs très-odorantes.
529. +cb. — — — *Mile's Hybrid Spiral* n 50  
Variété surpassant toutes les autres par la bonne tenue, l'ampleur et l'étonnant développement de ses épis, et par son parfum exquis.
530. +cb. — — — *multiflora compacta*. n 30
531. — — — — 25 grammes . . . . . 2 50  
Variété naine et compacte, à très-grosses grappes de fleurs d'un brun cannelle.
532. +cb. — — — *Victoria* . . . . . n 40  
Très-belle variété d'un beau port, produisant de gros épis de fleurs d'un rouge plus intense que celui de toutes les autres sortes.
533. +c. *Rhodanthé Manglesi (Immortelle)*  
(FLORE, VI, 281) . . . . . n 30
534. +c. — — *alba* . . . . . n 30
535. +c. — — *atrosanguinea* . . . . . n 50
536. +c. — — *maculata* . . . . . n 30  
Grandes fleurs à disque d'un jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.
537. +c. *Salvia coccinea* . . . . . n 25
538. +c. — — *splendens* . . . . . n 25
539. b. *Sanvitalia procumbens flore pleno* n 25  
Plante naine rampante formant tapis, à fleurs jaunes doubles pendant tout l'été.
540. b. *Saponaria calabrica* . . . . . n 25
541. b. — — *alba* . . . . . n 25
542. b. — — *rosea*. . . . . n 30
543. c. *Schizanthus Grahmi*. . . . . n 25
544. c. — — *carneus* . . . . . n 25
545. c. — — *retusus* . . . . . n 25
546. c. — — *flore albo* . . . . . n 30
547. cb. *Schizopetalum Walkeri*. . . . . n 25  
Fleurs blanches frangées, à odeur de Vanille.
548. +c. *Senecio pulcher* . . . . . 2 n  
Belle plante bisannuelle ornementale, encore très-rare, fleurissant la première année du semis, atteignant environ un mètre de hauteur; fleurs très-grandes, d'un pourpre cramoisi vif.
549. +b. *Silene pendula* . . . . . n 25
550. — — 25 grammes. . . . . 1 25
551. +b. — — *alba* . . . . . n 25
552. — — — 25 grammes . . . . . 1 25
553. +b. — — *carnea* . . . . . n 50
554. — — — 25 grammes . . . . . 2 25  
Nouvelle variété à fleurs d'un rose très-tendre.
555. +b. — — *compacta* . . . . . n 30

Fr. C.

556. +b. *Silene pendula compacta alba*. n 40
557. +b. — — — *ruberrima* . . . . . n 40
558. +b. — — — *flore pleno* . . . . . n 40  
Variété à fleurs doubles du *Silene rose* ordinaire; nos graines donnent environ 25 % de fleurs pleines.
559. +b. — — — *ruberrima* . . . . . n 25  
Le *Silene rose* et ses variétés sont d'excellentes plantes pour petits massifs et bordures de parterres printaniers.
560. c. *Solanum hybridum Hendersoni*. n 50  
Plante très-ornementale atteignant 30 à 40 centimètres de hauteur; tiges dressées, très-ramifiées; feuillage vert foncé; fruits d'un rouge orangé luisant.
561. c. — *Lobeli* . . . . . n 50  
Nouveau remarquable par ses beaux feuilts de la grosseur d'un abricot, de couleur rouge sang vif à la maturité; port nain, très-approprié à la culture en pots.
562. c. — *marginatum* . . . . . n 30  
Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.
563. c. — *Melongena ovigerum*. . . . . n 25  
La plante s'élève à près d'un mètre et se couvre, à l'automne, de nombreux fruits pendants de la grosseur d'un œuf de poule; d'où le nom de *Plante aux œufs*.
564. c. — — — *fructo coccineo* . . . . . n 25  
Variété de la précédente à gros fruits rouges coccinés.
565. c. — *pyracanthos* . . . . . n 50  
Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines d'un rouge orangé.
566. c. — *robustum* . . . . . n 30  
La plus belle espèce du genre, précieuse pour massifs. Port majestueux, feuillage d'un brun ferrugineux.
567. c. — *Warszewiczii* . . . . . n 30  
Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental, à isoler dans les pelouses.
568. *Sphenogone speciosa aurea*. . . . . n 30
569. +c. *Tagetes erecta flore pleno*. . . . . n 25  
*Oeillet d'Inde* à fleurs jaunes, pleines.
570. +c. — *lucida* . . . . . n 25  
Espèce à fleurs jaunes, agréablement parfumées.
571. +cb. — *patula nana flore pleno*. n 25
572. +cb. — — — *pulchra flore pleno* n 30  
Belle variété ne dépassant pas 20 centimètres de hauteur et se couvrant de nombreuses fleurs doubles d'un beau jaune d'or à cœur brun. Recommandable pour bordure.
573. +cb. — *signata pumila* . . . . . n 30  
Variété naine très-florifère, précieuse pour bordures et massifs; fleurs d'un jaune vif strié d'orange; feuillage très-découpé.
574. c. *Torenia Bailloni* . . . . . 1 50  
Nouveau très-florifère à fleurs d'un brillant jaune d'or, brun foncé à la gorge.
575. c. — *Fournieri* . . . . . 1 n  
L'une des plus jolies plantes annuelles pour culture en pot; fleurs d'un bleu clair, ornées de trois grands yeux d'un bleu indigo velouté, maculés d'un jaune vif à la gorge.
576. +c. *Tournefortia heliotropioides* . . . . . n 25  
Espèce de petite Hélotrope rampante, rustique, très-florifère.
577. c. gr. *Tropæolum canariense (aduncum)* n 30  
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucine grimpante, se couvrant de nombreuses fleurs frangées d'un jaune canari; feuillage élégant.
578. c. *Verbena auriculæflora* . . . . . n 25
579. c. — *pulcherrima* . . . . . n 25  
Espèce à capitules de fleurs pourpres violacées.
580. c. — *teucrioides*. . . . . n 25  
Espèce très-robuste à fleurs d'un blanc rosé, odorantes.
581. c. — *venosa* . . . . . n 25



	Fr. C.
582. +b. <i>Viscaria cardinalis</i> . . . . .	25
Cette espèce constitue un digne pendant du <i>Lin à fleur rouge</i> . Fleurs d'un magnifique pourpre magenta.	
583. +b. — <i>elegans picta</i> . . . . .	25
Fleurs d'un cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.	
584. +b. — <i>hybrida splendens</i> . . . . .	25
585. +b. — <i>oculata perfecta nana</i> . . . . .	25
Belle variété formant des touffes compactes; fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé, gorge pourpre.	
586. <i>Whitlavia grandiflora</i> (Fl., XI, 19) . . . . .	25
587. — — <i>alba</i> . . . . .	25
588. <i>Xeranthemum annuum</i> ( <i>Immortelle</i> ) . . . . .	25
589. — — <i>album</i> . . . . .	25
590. — — <i>atropurpureum</i> flore pleno . . . . .	30

	Fr. C.
591. <i>Xeranthemum annuum imperiale</i> . . . . .	30
592. — — <i>superbissimum</i> . . . . .	75
Variété perfectionnée, indispensable à tous ceux qui emploient les fleurs séchées; elle a de grandes fleurs pourpres, très-doubles, en forme de boule.	
593. — — — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	1
Les fleurs de cette nouvelle variété sont blanches, pleines et de forme globuleuse; on sait que pour les bouquets perpétuels les fleurs blanches sont les plus recherchées.	
594. — — — <i>roseum flore pleno</i> . . . . .	1
Nouvelle variété dont les fleurs, très-doubles, sont d'un rose tendre.	
595. c. <i>Zinnia mexicana</i> flore pleno . . . . .	
( <i>Haageana flore pleno</i> ) . . . . .	30
<i>Zinnia</i> rampante naine, très-touffue, à fleurs oranges, doubles, en automne.	

## COLLECTIONS

## DE GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

## Au choix de l'Établissement.

596. Annuelles diverses. . . . .	200 sortes : fr.	40	»
597. — — . . . . .	100 —	»	20
598. — — . . . . .	50 —	»	11
599. — pour bordures. . . . .	25 —	»	6
600. — de taille élevée pour groupes . . . . .	10 —	»	2 50
601. — grimpantes. . . . .	10 —	»	2 50
602. — immortelles . . . . .	10 —	»	2 50
603. — à feuilles ornementales . . . . .	10 —	»	2 50
604. — à fleurs odorantes. . . . .	8 —	»	2

## GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial flower Seeds (*Stauden*).

	Fr. C.		Fr. C.
605. <i>Acanthus Candelabrum</i> . . . . .	25	624. <i>Aquilegia alpina</i> . . . . .	25
606. — <i>latifolius</i> . . . . .	40	625. — <i>blanda</i> . . . . .	25
607. — <i>longifolius</i> . . . . .	40	626. — <i>californica</i> . . . . .	25
608. — <i>mollis</i> . . . . .	25	627. — <i>canadensis</i> . . . . .	25
609. — <i>niger</i> . . . . .	50	628. — <i>chrysantha</i> . . . . .	40
610. — <i>Schottianus</i> . . . . .	40	Belle espèce se couvrant, en juillet et août, de grandes belles fleurs d'un jaune orangé vif.	
611. — <i>spinosus</i> . . . . .	25	629. — <i>Durandi variegata</i> . . . . .	25
612. <i>Achillea filipendulina</i> . . . . .	25	630. — <i>formosa</i> . . . . .	25
613. <i>Aconitum barbatum</i> . . . . .	25	631. — <i>hybrida</i> . . . . .	25
614. — <i>ferox</i> . . . . .	25	632. — <i>olympica</i> . . . . .	40
615. — <i>inunctum</i> . . . . .	25	633. — <i>Rokimonti</i> . . . . .	75
616. — <i>Lycocotum</i> . . . . .	25	634. — <i>Skinneri</i> . . . . .	30
617. — <i>Napellus foliis variegatis</i> . . . . .	50	635. — — <i>alba</i> . . . . .	50
618. <i>Alyssum saxatile compactum</i> . . . . .	25	636. — — <i>violacea</i> . . . . .	30
619. <i>Anemone japonica elegans</i> . . . . .	50	637. — <i>spectabilis</i> . . . . .	50
620. — — <i>Honorine Jobert</i> . . . . .	50	638. — <i>versicolor</i> . . . . .	40
621. — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	25	639. — <i>Vervaeckiana foliis variegatis</i> . . . . .	25
622. <i>Anthericum plumosum</i> . . . . .	25	640. — <i>vulgaris caryophylloides</i> . . . . .	25
623. — <i>ramosum</i> . . . . .	25		

	Fr. C.
641. <i>Aquilegia Wittmanniana</i> . . . . .	25
642. — <i>Collection de 12 espèces et variétés</i> 3	"
643. <i>Arabis mollis foliis argenteo-varieg.</i> . . . .	50
644. <i>Arenaria caespitosa</i> . . . . .	25
Charmaute plante formant gazon, excellente pour bordures naines.	
645. — <i>purpurea</i> . . . . .	25
646. <i>Armeria formosa</i> . . . . .	30
647. — <i>maritima alba</i> . . . . .	30
648. <i>Asclepias Douglassi</i> . . . . .	40
649. — <i>incarnata</i> . . . . .	25
650. — <i>tuberosa</i> . . . . .	30
651. <i>Asphodelus albus</i> . . . . .	40
652. <i>Aubrietia graeca</i> . . . . .	25
653. — <i>purpurea grandiflora</i> . . . . .	25
654. <i>Ballota nigra foliis variegatis</i> . . . . .	25
655. <i>Baptisia australis</i> . . . . .	25
656. <i>Bellis perennis</i> (FLORE, VI, 161) . . . . .	50
<i>Paquerettes en mélange.</i>	
657. <i>Betonica grandiflora</i> . . . . .	25
658. — <i>rosea</i> . . . . .	25
659. <i>Bocconia cordata yeddoensis</i> . . . . .	25
660. <i>Campanula carpathica</i> . . . . .	25
661. — — <i>cærulescens</i> . . . . .	25
662. — — <i>flore albo</i> . . . . .	25
On forme de ces trois <i>Campanules</i> à fleurs bleues et blanches, de très-belles bordures à floraison continue.	
663. — <i>grandiflora autumnalis</i> . . . . .	25
<i>Variétés en superbe mélange.</i>	
664. — <i>macrantha</i> . . . . .	25
665. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	25
666. — — <i>flore albo</i> . . . . .	25
<i>Campanules dont la tige atteint 1 mètre et plus de hauteur, et se garnit, tout le long, de fleurs bleues ou blanches.</i>	
667. — <i>Trachelium, en mélange</i> . . . . .	25
668. — <i>turbinata</i> . . . . .	40
669. <i>Catananche cærulea bicolor</i> . . . . .	25
670. <i>Centaurea atropurpurea</i> . . . . .	25
671. — <i>candidissima</i> . . . . .	75
672. — <i>Clementei</i> . . . . .	50
673. — <i>dealbata</i> . . . . .	25
674. — <i>gymnocarpa</i> . . . . .	25
675. — — <i>plumosa</i> . . . . .	40
676. — <i>lugdunensis</i> . . . . .	50
Belle plante vivace formant une touffe serrée; grandes fleurs bleu de ciel, très-estimées pour bouquets.	
677. — <i>rutifolia</i> . . . . .	50
Feuillage blanchâtre formant une touffe arrondie haute de 30 à 60 centimètres; fleurs blanches.	
678. <i>Cephalaria tatarica</i> . . . . .	25
679. <i>Cerastium Biebersteini</i> . . . . .	25
Plante naine à feuillage blanchâtre, cotonneux, propre pour bordures, tapis et effet de contraste.	
680. — <i>tomentosum</i> . . . . .	25
681. <i>Chamaepeuce Casabonæ</i> . . . . .	40
682. — <i>diacantha</i> . . . . .	40
683. — <i>stricta</i> . . . . .	50
684. <i>Chelidonium majus flore pleno</i> . . . . .	30
685. <i>Chelone barbata Torreyi</i> . . . . .	40
686. <i>Coreopsis auriculata</i> . . . . .	30
687. — <i>longipes</i> . . . . .	25

	Fr. C.
688. <i>Corydalis capnoides alba</i> . . . . .	25
689. — — <i>lutea</i> . . . . .	25
690. — <i>Caseana</i> . . . . .	75
691. <i>Cucurbita perennis (Cucumis)</i> . . . . .	25
Citrouille vivace à superbe feuillage, très-propre à garnir les murailles, treillis, tonnelles, etc.	
692. <i>Delphinium atrovioleaceum</i> . . . . .	25
693. — <i>Belle Alliance</i> . . . . .	25
694. — <i>cashmerianum</i> . . . . .	1 "
Variété encore rare et très-naine, à fleurs violettes nuançées de mauve et de bleu foncé, plus grande que le <i>Delphinium formosum</i>	
695. — <i>Chevalier de Saint-Jean</i> . . . . .	30
696. — <i>coelestinum</i> . . . . .	25
697. — <i>Faustina</i> . . . . .	30
698. — <i>Felix Crousse</i> . . . . .	30
699. — <i>formosum</i> (FLORE, XII, 7) . . . . .	30
700. — — <i>25 grammes</i> . . . . .	2 "
701. — <i>Général Uhrich</i> . . . . .	30
702. — <i>Granville</i> . . . . .	30
703. — <i>Heinemann</i> . . . . .	30
704. — <i>Hermann Stenger</i> . . . . .	30
705. — <i>Le XIX<sup>me</sup> siècle</i> . . . . .	30
706. — <i>Mad. Hock</i> . . . . .	25
707. — <i>Méandre</i> . . . . .	30
708. — <i>Paul de Lambertye</i> . . . . .	30
709. — <i>Collection de 12 espèces et variétés</i> 3	"
710. <i>Dictamnus albus</i> . . . . .	30
711. — — <i>flore purpureo</i> . . . . .	25
712. <i>Digitalis purpurea, en mélange</i> . . . . .	25
713. <i>Dracocephalum speciosum vernaum</i> . . . . .	1 "
714. <i>Eccremocarpus scaber</i> . . . . .	25
715. — — <i>aurantiacus</i> . . . . .	40
Magnifique plante grimpante à fleurs rouge corail et jaune citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.	
716. <i>Echinacea intermedia</i> . . . . .	25
717. <i>Echium pomponicum</i> . . . . .	25
718. <i>Eremostachys pinnatifida</i> . . . . .	50
719. <i>Erigeron caucasicum</i> . . . . .	25
720. <i>Eryngium bromeliæfolium</i> . . . . .	50
721. — <i>pandanifolium</i> . . . . .	50
722. — <i>pumilum</i> . . . . .	25
723. — <i>rigidum</i> . . . . .	25
724. <i>Francoa ramosa picturata</i> . . . . .	25
725. <i>Funkia lanceolata foliis marginatis</i> . . . . .	25
726. — <i>ovata</i> . . . . .	25
727. <i>Gaillardia grandiflora</i> . . . . .	25
728. <i>Gentiana cruciata</i> . . . . .	25
729. — <i>Saponaria</i> . . . . .	25
730. <i>Geranium sanguineum</i> . . . . .	25
731. <i>Geum coccineum</i> . . . . .	25
732. — — <i>atrosanguineum</i> . . . . .	25
733. <i>Gunnera manicata</i> . . . . .	50
734. — <i>scabra</i> (FLORE, XVIII, 119) . . . . .	40
735. — — <i>25 grammes</i> . . . . .	5 "
Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le <i>Gunnera scabra</i> atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose.	
736. <i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .	25
Fleurs blanches extrêmement délicates, précieuses pour la confection des bouquets.	



	Fr. C.
737. <i>Gypsophila Sternbergi</i> . . . . .	25
738. — <i>Steveni</i> . . . . .	25
Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.	
739. <i>Helenium grandiflorum</i> . . . . .	30
740. <i>Helianthus Maximiliani</i> . . . . .	25
741. <i>Helleborus abschaticus</i> . . . . .	25
742. — <i>atrorubens</i> . . . . .	50
743. — <i>colchicus</i> . . . . .	40
744. — <i>foetidus</i> . . . . .	40
745. — <i>olympticus</i> . . . . .	25
746. — <i>orientalis</i> . . . . .	25
747. <i>Helonias erythrosperma</i> . . . . .	30
748. <i>Hemerocallis flava</i> . . . . .	25
749. — <i>Mettendorffiana</i> . . . . .	40
750. <i>Heracleum eminens</i> . . . . .	25
751. — <i>eximium</i> . . . . .	25
752. — <i>giganteum</i> . . . . .	30
753. — <i>platytænium</i> . . . . .	25
754. — <i>Sphondylium foliis variegatis</i> . . . . .	30
755. <i>Hesperis matronalis alba compacta</i> . . . . .	25
756. <i>Hibiscus Moscheutos albus</i> . . . . .	30
757. — — <i>roseus</i> . . . . .	30
758. <i>Hieracium punctatum</i> . . . . .	25
759. <i>Iberis Tenoreana</i> . . . . .	30
760. <i>Lathyrus grandiflorus splendens</i> . . . . .	30
761. — <i>latifolius albus</i> . . . . .	40
762. — <i>sylvestris</i> . . . . .	30
763. <i>Linum perenne album</i> . . . . .	25
764. — <i>sibiricum</i> . . . . .	30
765. <i>Lupinus polyphyllus, en mélange</i> . . . . .	25
766. <i>Lychnis alpina</i> . . . . .	30
767. — <i>chalconica (Croix de Jérusalem)</i> . . . . .	25
768. — — <i>cupreata</i> . . . . .	30
769. — — <i>flore albo</i> . . . . .	25
770. — — <i>mutabilis</i> . . . . .	30
771. — <i>fulgens</i> . . . . .	30
772. — <i>Haageana hybrida</i> . . . . .	50
Belle plante à grandes fleurs écarlates et oranges, et même parfois blanches.	
773. <i>Lysimachia punctata</i> . . . . .	25
774. <i>Michauxia campanuloides</i> . . . . .	50
775. <i>Morina longifolia</i> . . . . .	50
<b>OEILLETS (Dianthus Caryophyllus):</b>	
776. — <i>de fantaisie (Pinks)</i> , 100 graines 2	n
Mélange très-varié.	
777. — <i>flamands (Flemish Carnations)</i> , 100 graines . . . . .	4 n
Mélange de très-belles variétés récoltées sur une riche collection.	
778. — <i>remontants (Tree Carnations)</i> , 100 graines . . . . .	2 50
Mélange récolté sur une riche collection. Ces OEillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, parfois dès l'année du semis.	
779. — — <i>nains</i> , 100 graines . . . . .	3 n
Nouveau genre d'OEillet remontant, supérieure à tout ce qui était connu jusqu'ici; les plantes se ramifient bien et sont recherchées pour culture en pots.	
780. — <i>saxons (de Bohême)</i> . . . . .	1 n
Mélange récolté sur une riche collection.	

	Fr. C.
781. <b>OEillets de Vienne (OEillets des fleuristes)</b> . . . . .	1 n
Variétés naines, très-touffues, très-compactes, à fleurs très-nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.	
782. — <b>Grenadin (OEillet rouge)</b> . . . . .	1 50
Variété très-florifère et très-hâtive, à fleurs rouge ponceau, odorantes. C'est la sorte la plus estimée pour le marché; son port nain et compacte la rend très-propre pour massifs et bordures.	
783. — <b>mignardise virginal</b> , 100 graines . . . . .	2 n
Variété d'OEillet mignardise à fleurs blanches, doubles, frangées, très-odorantes, s'épanouissant admirablement en pleine terre, excellente pour bouquets.	
784. <i>Oenothera Fraseri</i> . . . . .	25
785. <i>Orobis niger</i> . . . . .	25
786. — <i>sylvestris</i> . . . . .	30
787. <i>Papaver alpinum luteum</i> . . . . .	30
788. — <i>bracteatum</i> . . . . .	30
789. — <i>orientale</i> . . . . .	25
790. — <i>spicatum</i> . . . . .	25
791. <i>Pentstemon Cobæa</i> . . . . .	1 n
Très-belle et rare espèce à grandes fleurs blanches reflettées de pourpre et à gorge lavée de jaune.	
792. — <i>gentianoides</i> . . . . .	75
Variétés de semis en beau mélange.	
793. — <i>gloxiniædorus</i> . . . . .	25
794. — <i>Jeffreyanus</i> . . . . .	30
Magnifique espèce à fleurs d'un bleu d'azur vif, l'une des plus belles du genre.	
795. — <i>Murrayanus</i> . . . . .	25
796. — <i>ovatus</i> . . . . .	25
797. — — <i>albus</i> . . . . .	25
798. — <i>pulchellus</i> . . . . .	25
799. — <i>Wrighti</i> . . . . .	40
800. <i>Phlox decussata</i> . . . . .	50
Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.	
N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.	
801. <i>Phyteuma orbiculare</i> . . . . .	25
802. <i>Podophyllum Emodi</i> (FL., XVI, 95) . . . . .	50
803. <i>Polemonium œruleum</i> . . . . .	25
804. — — <i>flore albo</i> . . . . .	25
805. <i>Potentilla (FLORE, passim)</i> . . . . .	25
Graines en mélange récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.	
806. — <i>rupestris</i> . . . . .	25
807. <i>Primula Auricula</i> . . . . .	75
Graines d'Auricules en mélange, récoltées sur de très-belles variétés.	
808. — — <i>capitata œrulea</i> . . . . .	1 n
Forme de jolies petites touffes très-ramifiées et se couvre de nombreuses fleurs d'un bleu lilacé.	
809. — — <i>var. liégeoises</i> . . . . .	2 n
Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.	
810. — <i>japonica (FLORE, XVIII, 31)</i> . . . . .	50
Mélange bien varié récolté sur les plus belles variétés. Cette graine germe très-lentement; elle doit être semée en automne; elle lève ordinairement au printemps suivant.	
811. — <i>veris</i> . . . . .	50
812. — — <i>25 grammes</i> . . . . .	5 n
Graines de <i>Primævères</i> en mélange, provenant de notre riche collection.	
813. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 n
Graines récoltées sur une collection à fleurs très-doubles.	

	Fr. C.		Fr. C.
814. <i>Prunella pyrenaica</i> . . . . .	" 25	852. <i>Silene petraea</i> . . . . .	" 25
815. <i>Pyrethrum carneum roseum flore pleno, en mélange.</i> . . . .	" 30	853. — <i>Zawadskii</i> . . . . .	" 25
816. <i>Rhaponticum niveum.</i> . . . .	" 25	854. <i>Silphium laciniatum</i> . . . . .	" 25
817. <i>Rheum australe macrophyllum.</i> . . . .	" 25	855. — <i>terebinthinaceum</i> . . . . .	" 40
818. — <i>compactum</i> . . . . .	" 25	856. <i>Sisyrinchium bermudianum</i> . . . . .	" 25
819. — <i>crassinervium.</i> . . . .	" 25	857. — <i>sulphureum</i> . . . . .	" 25
820. — <i>Emodi</i> . . . . .	" 40	858. <i>Stachys lanata.</i> . . . .	" 25
821. — <i>hybridum</i> . . . . .	" 25	859. <i>Statice bellidifolia.</i> . . . .	" 25
822. — <i>leucorrhizum</i> . . . . .	" 25	860. — <i>coccinea</i> . . . . .	" 30
823. — <i>officinale palmatum tanguticum l</i> "		861. — <i>eximia</i> . . . . .	" 25
Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles marbrés de taches pourpres; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées verdâtres.		862. — <i>incana alba</i> . . . . .	" 30
824. — <i>tauricum</i> . . . . .	" 25	863. — <i>Fortunei</i> (FLORE, II, mars, pl. 8) "	" 30
825. — <i>undulatum.</i> . . . .	" 25	864. — <i>Limonium.</i> . . . .	" 25
826. <i>Salvia pratensis albo-cærulea</i> . . . . .	" 25	865. — <i>marginata</i> . . . . .	" 30
827. <i>Saxifraga ajugæfolia.</i> . . . .	" 25	866. — <i>Willdenowi</i> . . . . .	" 30
828. — <i>Bucklandi.</i> . . . .	" 25	867. <i>Stevia Eupatoria</i> . . . . .	" 25
829. — <i>Cotyledon pyramidalis.</i> . . . .	" 25	868. — <i>purpurea</i> . . . . .	" 30
830. — <i>Hostii</i> . . . . .	" 25	869. <i>Tritoma Mac Owani</i> . . . . .	" 75
831. — <i>notata</i> . . . . .	" 25	Belle espèce à superbe épi de fleurs d'un rouge orangé vif sur le tube de la corolle et jaune sur le limbe; floraison depuis juillet jusqu'à novembre.	
832. — <i>Sponhemica condensata</i> . . . . .	" 25	870. — <i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .	" 30
833. — — <i>flavescens</i> . . . . .	" 25	871. <i>Trollius asiaticus flore croceo</i> . . . . .	" 30
834. <i>Scutellaria alpina bicolor</i> . . . . .	" 25	872. — <i>europæus</i> . . . . .	" 30
835. <i>Sedum Ewersii</i> . . . . .	" 25	873. <i>Veratrum nigrum.</i> . . . .	" 40
836. — <i>ibericum</i> . . . . .	" 25	874. — <i>viride</i> . . . . .	" 25
837. — <i>involutum.</i> . . . .	" 25	875. <i>Veronica candidissima</i> . . . . .	" 25
838. — <i>ochroleucum</i> . . . . .	" 25	876. — <i>glabra</i> . . . . .	" 40
839. — <i>oppositifolium</i> . . . . .	" 25	877. — <i>sibirica.</i> . . . .	" 30
840. — <i>spurium</i> . . . . .	" 25	878. <i>Viola cornuta</i> . . . . .	" 30
841. — — <i>album</i> . . . . .	" 25	879. — — <i>25 grammes</i> . . . . .	2 50
842. — — <i>pallide roseum</i> . . . . .	" 25	Belle Violette à fleurs d'un mauve clair, à floraison continue.	
843. <i>Sempervivum Delassieui.</i> . . . .	" 25	880. — — <i>alba</i> . . . . .	" 30
844. — <i>fimbriatum</i> . . . . .	" 25	Variété de la précédente, à fleurs blanches, à floraison continue.	
845. — <i>Funkii</i> . . . . .	" 25	881. — <i>epipsila</i> . . . . .	" 50
846. — <i>globiferum</i> . . . . .	" 25	882. — <i>Jooi</i> . . . . .	" 40
847. — <i>Mettenianum</i> . . . . .	" 25	883. — <i>lutea grandiflora.</i> . . . .	" 40
848. — <i>rubicundum</i> . . . . .	" 25	884. — <i>odorata (semperflorens)</i> . . . . .	" 25
849. — <i>tectorum minus</i> . . . . .	" 25	885. — — <i>de Russie</i> . . . . .	" 40
850. — <i>Verloti.</i> . . . .	" 25	886. — — <i>flore albo</i> . . . . .	" 40
851. <i>Silene alpestris</i> . . . . .	" 25	887. — — <i>The Czar</i> . . . . .	" 30
		888. — <i>Patrinii</i> . . . . .	" 25

## COLLECTIONS

## DE GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Au choix de l'Établissement.

889. Vivaces diverses . . . . .	100 sortes : fr.	20 »
890. — — . . . . .	50 —	" 11 »
891. — pour bordures . . . . .	10 —	" 2 50
892. — pour grands groupes . . . . .	10 —	" 2 50



## GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

## Greenhouse and Stove Plant Seeds.

*Samen von Gewächshaus-Pflanzen.*

N. B. Nous prenons toutes les précautions possibles pour n'offrir que des graines d'espèce sûre et de bonne qualité ; mais, comme nous ne pouvons les essayer toutes avant de les vendre, nous devons nous borner à un examen très-attentif lors de leur arrivée, et nous n'annonçons que celles dont l'apparence nous paraît satisfaisante (*toutes celles dont la qualité nous inspire des doutes étant rigoureusement écartées*). D'un autre côté, la germination des GRAINES D'ARBRES et de certaines GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE étant souvent incertaine, très-lente et longuement successive, par conséquent sujette à de nombreux accidents, nous ne pouvons en garantir la réussite, ni consentir à des réductions ou bonifications pour défaut de levée ou erreurs de dénomination. Toutes les demandes qui nous seront transmises seront exécutées sous cette réserve. Nous reprendrons, d'ailleurs, les graines que nos correspondants ne considéreront pas comme bonnes, à la condition que le retour en sera fait immédiatement après la réception et franco.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *gr.* grimpante.

	Fr. C.		Fr. C.
893. <i>fr.</i> <i>Abutilon album striatum</i> . . .	" 40	928. <i>fr.</i> <i>Acacia lophantha speciosa</i> . . .	" 30
894. " — <i>Alphonse Karr</i> . . .	" 40	929. " — — <i>superba</i> . . .	" 40
895. " — <i>aurantiacum</i> . . .	" 50	930. " — <i>retioides</i> . . .	" 30
896. " — <i>Béranger</i> . . .	" 40	931. " — <i>salicifolia</i> . . .	" 40
897. " — <i>Boule de neige</i> . . .	" 60	932. " — <i>saligna</i> . . .	" 40
898. " — <i>Comtesse de Medici-Spada</i> . . .	" 50	933. " — <i>Collection de 15 espèces</i> . . .	5 "
899. " — <i>Darwini</i> . . .	" 40	934. <i>ch.</i> <i>Æchmea cœlestis</i> . . .	1 "
900. " — — <i>robustum</i> . . .	" 50	935. " — <i>spectabilis</i> . . .	1 25
901. " — — <i>roseum multiflorum</i> . . .	" 50	936. <i>fr.</i> <i>Agave angustifolia</i> . . .	1 50
902. " — — <i>tessellatum</i> . . .	" 40	937. " — <i>cærulescens</i> . . .	1 25
903. " — <i>insigne</i> . . .	" 40	938. " — <i>cæspitosa</i> . . .	1 25
904. " — <i>Montgolfier</i> . . .	" 50	939. " — <i>chiapensis</i> . . .	" 50
905. " — <i>Sellowianum marmoratum</i> . . .	" 75	940. " — <i>coccinea</i> . . .	1 "
906. " — <i>striatum Van Houttei</i> . . .	" 40	941. " — <i>dealbata</i> . . .	1 50
907. " — <i>Tonelianum</i> . . .	" 40	942. " — <i>densiflora</i> . . .	1 50
908. " — <i>Collection de 10 espèces et variétés</i> . . .	3 "	943. " — <i>Deserti</i> . . .	2 "
Belles plantes arborescentes à fleurs de divers coloris, blanc, jaune, orange, rouge pâle, rouge foncé, rouge saumon, quelques-uns striés, etc., en grandes clochettes pendantes.		944. " — <i>erythracantha Toneliana</i> . . .	1 50
909. " <i>Acacia acuminata</i> . . .	" 75	945. " — <i>filifera</i> . . .	1 50
910. " — <i>Adansoni</i> . . .	" 40	946. " — <i>Ghiesbreghtii</i> . . .	1 50
911. " — <i>angustifolia</i> . . .	" 30	947. " — <i>grandidens</i> . . .	1 25
912. " — <i>armata</i> . . .	" 40	948. " — <i>heteracantha</i> . . .	1 50
913. " — <i>calamistrata</i> . . .	" 50	949. " — <i>mexicana</i> . . .	" 50
914. " — <i>capensis</i> . . .	" 30	950. " — <i>micrantha</i> . . .	1 "
915. " — <i>cultriformis</i> . . .	" 30	951. " — <i>Ousselghemiana</i> . . .	1 25
916. " — <i>Cyclopis</i> . . .	" 40	952. " — <i>Salmiana</i> . . .	1 "
917. " — <i>dealbata</i> . . .	" 40	953. " — <i>Scolymus</i> . . .	1 25
918. " — <i>Douglasi</i> . . .	" 40	954. " — <i>striata</i> . . .	1 "
919. " — <i>eburnea</i> . . .	" 30	955. " — <i>Vander Vini</i> . . .	2 "
920. " — <i>floribunda splendens</i> . . .	" 50	956. " — <i>variegata</i> . . .	" 75
921. " — <i>genistefolia</i> . . .	" 50	957. " — <i>Verschaffeltii</i> . . .	1 50
922. " — <i>ixiophylla</i> . . .	" 50	958. " — <i>xalapensis</i> . . .	1 "
923. " — <i>juliflora</i> . . .	" 40	959. " — <i>Collection de 12 espèces</i> . . .	12 "
924. " — <i>linariæfolia</i> . . .	" 40	960. <i>ch.</i> <i>Alocasia longiloba</i> . . .	1 "
925. " — <i>linifolia</i> . . .	" 40	961. " — <i>metallica</i> . . .	1 "
926. " — <i>longifolia</i> . . .	" 30	962. " — <i>odora</i> . . .	1 "
927. " — <i>lophantha</i> . . .	" 30	963. <i>fr.</i> <i>Aloe brachyphylla</i> . . .	" 75
		964. " — <i>carinata</i> . . .	" 75

965. fr.	<i>Aloe depressa</i> . . . . .	n 60
966. " —	<i>excavata</i> . . . . .	1 "
967. " —	<i>ferox</i> . . . . .	1 25
968. " —	<i>incurva</i> . . . . .	n 75
969. " —	<i>variegata</i> . . . . .	n 75
970. ch.	<i>Amaryllis (Hippeastrum hybridum)</i> , 25 graines . . . . .	1 50
971. — — —	— — — 100 graines . . . . .	5 "

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos *Amaryllis* ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

972. fr.	<i>Angelonia grandiflora</i> . . . . .	n 75
973. " —	<i>Anigosanthus coccinea</i> . . . . .	1 "
974. ch.	<i>Anthurium caudatum</i> . . . . .	2 "
975. " —	<i>coriaceum</i> . . . . .	1 50
976. " —	<i>Antigonon leptopus</i> . . . . .	1 "
977. " —	<i>Anona aurantiaca</i> . . . . .	1 25
978. " —	<i>Cherimolia</i> . . . . .	1 "
979. " —	<i>cinerea</i> . . . . .	1 "
980. " —	<i>macrocarpa</i> . . . . .	1 "
981. " —	<i>pyrifera</i> . . . . .	1 "
982. " —	<i>Aphelandra aurantiaca</i> Rœzlii . . . . .	n 75
983. fr.	<i>Aralia leptophylla</i> . . . . .	1 50
984. " —	<i>Osyana</i> . . . . .	1 50
985. " —	<i>papyrifera</i> . . . . .	n 75
986. " —	<i>pulchra</i> . . . . .	1 25
987. " —	<i>Sieboldi</i> . . . . .	n 75
988. " —	<i>Aristolochia ciliosa</i> . . . . .	n 75
989. " —	<i>Arundinaria Khasyana</i> . . . . .	1 "
990. " —	<i>Azalea indica</i> . . . . .	1 50

Graines récoltées sur une collection de premier ordre.

991. " —	<i>Bambusa Brandisi</i> . . . . .	1 "
992. " —	<i>stricta</i> . . . . .	1 "
993. " —	<i>Barbacenia hybrida</i> . . . . .	1 "
994. " —	<i>Beaucarnea tuberculata</i> . . . . .	2 "
995. ch.	<i>Bégonias herbacés (FL., passim)</i> . . . . .	2 "

Mélange récolté sur les variétés de notre riche collection.

996. pt.	<i>Bégonias tubéreux (FL., passim)</i> . . . . .	2 50
----------	--	------

Les amateurs de *Bégonias* qui ont visité notre Établissement pendant l'été ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables variétés que nous avons obtenues. Ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre.

997. ch.	<i>Bertolonia hybrida (FL., passim)</i> . . . . .	1 50
----------	---	------

Variétés en superbe mélange, récoltées sur notre riche collection.

998. " —	<i>Billbergia cærulea</i> . . . . .	1 50
999. " —	<i>coelestis</i> . . . . .	2 "
1000. " —	<i>vittata</i> . . . . .	2 "
1001. fr.	<i>Bonaparteia filamentosa</i> . . . . .	1 50
1002. " —	<i>Hystrix compacta</i> . . . . .	1 50
1003. " —	<i>— glauca</i> . . . . .	1 25
1004. " —	<i>junceae</i> . . . . .	2 "
1005. " —	<i>robusta</i> . . . . .	2 "

1006. pt.	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> . . . . .	n 40
-----------	--	------

1007. ch.	<i>Caladium hybridés (FL., passim)</i> . . . . .	2 "
-----------	--	-----

Graines récoltées sur notre riche collection; chaque plante de semis forme, la même année, une belle touffe.

1008. fr.	<i>Calcéolaires herbacées (FLORE, III, 250 et XV, 105)</i> . . . . .	5 "
-----------	--	-----


Chaque paquet de graines est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

" Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis de *Calcéolaires*.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis



ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Fr. C.

1009. *pt. Calceolaires ligneuses* (Calceolaria lignosa) . . . . . 2 50

Graines de variétés récoltées sur une très-belle collection, dans les tons jaunes, mordorés et bruns; fleurs amples, en bouquets volumineux.

1010. *fr. Camptosema rubicundum* (FLORE, VII, 153) . . . . . n 30

1011. *ch. Carica Papaya* . . . . . l n  
Arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-ornemental, d'une culture facile.

1012. n *Cassia corymbosa* . . . . . n 50  
1013. n — *geminiflora* . . . . . n 40  
1014. n — *glauca* . . . . . n 40  
1015. n — *grandiflora floribunda* . . . . . n 30  
1016. n — *laevigata* . . . . . n 50  
1017. *fr. Chorizema Chandleri* . . . . . n 50  
1018. n — *elegans multiflorum* . . . . . n 60  
1019. n — *ilicifolium* . . . . . n 40  
1020. n — *Lawrenceanum* . . . . . n 40  
1021. n — *splendens* . . . . . n 40  
1022. n — *varium* . . . . . n 50

1023. *pt. Chrysanthemum indicum*  
à grandes fleurs, mélange  
de belles variétés . . . . . n 75

1024. n — — *pompon*, mélange de  
belles variétés . . . . . n 75

Ces deux races donnent, en automne, d'abondantes fleurs très-variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.

1025. n — *japonicum flore pleno* . . . . . n 75  
*Chrysanthèmes* très-curieux par leur forme et leurs coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés.

1026. *fr. Cinéraires hybrides anglaises*. 2 n  
1027. n — — *naïves de premier choix* 1 50  
1028. n — — *Tom Pouce*. . . . . 2 50

Mélange de variétés à très-grandes fleurs (8 centimètres de diamètre environ).

1029. n — *doubles* (Haage et Schmidt)  
(FLORE, XXII, 173) . . . . . 2 50

En paquets originaux munis du sceau des obtenteurs. Magnifiques nouveautés de duplicature parfaite, de bonne forme, de coloris très-variés.

1030. n *Clianthus Dampieri* (FLORE, VI, 121) . . . . . n 75

Le type à fleurs rouges; ornées d'une grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1031. n — *magnificus* . . . . . n 50  
1032. n — *punicus* . . . . . n 50  
1033. *ch.gr. Clitoria heterophylla* . . . . . n 75  
1034. n n — *Mariana*. . . . . n 50  
1035. n n — *Ternatea*. . . . . n 30

Grandes fleurs d'un bleu superbe.

Fr. C.

1036. *ch.gr. Clitoria Ternatea* flore albo. n 30

1037. n *Coleus* (FLORE, *passim*) . . . . . l 50

Superbe mélange de variétés provenant de notre riche collection.

1038. *fr. Colletia ferox bictoniensis*. . . . . n 40

Arbrisseau rustique à feuillage épineux, extrêmement distingué.

1039. *ch. Colocasia albo-violacea*. . . . . l n

1040. n — *gigantea superba*. . . . . l n

1041. n — *macrorrhiza foliis varieg.* l 50

1042. n *Croton interruptum*. . . . . l n

1043. n — *undulatum* . . . . . l n

1044. n — *variegatum* . . . . . l 25

1045. *pt. Cuphea Galeottiana* . . . . . n 40

1046. n — *platycentra* . . . . . n 40

1047. n — *Rozlii* . . . . . n 75

Plante d'un beau port, très-ornementale pendant l'hiver en serre froide; fleurs d'un écarlate vif.

1048. n — — *grandiflora superba* . l n

Nouvelle variété d'un port pyramidal, à très-grandes fleurs d'un rouge vif, dépassant en grandeur le *C. Rozlii*.

1049. n — *strigulosa* . . . . . n 30

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre, l'été.

1050. *fr. Cytisus racemosus* . . . . . n 40

1051. n — *ramosissimus*. . . . . n 40

1052. n — *superbus* . . . . . n 50

1053. n *Dasylyrium glaucum*. . . . . l n

1054. n — *gracile* . . . . . l 25

1055. n — *Hartwegianum* . . . . . l n

1056. n — *robustum* . . . . . l 25

1057. n — *serratifolium* . . . . . l n

1058. *ch. Datura arborea* . . . . . n 75

1059. n — — *flore pleno*. . . . . l n

1060. *pt. Danbentonia Tripetiana* coc-  
cinea . . . . . n 30

1061. n — — *magnifica* . . . . . n 30

1062. n — — *superba* . . . . . n 40

Les Danbentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent en plein air, l'été.

1063. *ch. Didymocarpus Rexii*. . . . . l n

1064. n *Dipladenia mexicana, la graine* n 50

1065. *ch.gr. Disemma adiantifolia* . . . . . n 50

1066. n n — *coccinea* . . . . . n 41

Passiflorée à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide, se couvrant de fleurs écarlates.

1067. n n — — *purpurea* . . . . . n 75

1068. n n — *Hahnii* . . . . . n 50

1069. n n — *macrocarpa* . . . . . n 60

1070. *fr. Dracena albicans* . . . . . l 25

1071. n — *arborea*. . . . . l 50

1072. n — *australis* . . . . . n 75

1073. n — *congesta zebrina*. . . . . n 75

1074. n — *Draco* . . . . . n 50

1075. n — — *canariensis*. . . . . n 75

1076. n — — *longifolia pendula* . . . . . n 60

1077. n — — *zebrina*. . . . . l n

1078. n — *grandis*. . . . . l 25

1079. n — *Hookeri* . . . . . l n

1080. n — *indivisa*. . . . . n 75



	Fr. C.		Fr. C.
1081. <i>fr. Dracæna indivisa calocoma</i> . . .	1 25	1133. <i>ch. Gesneria Van Houttei (Dircæa)</i> . . .	1 50
1082. " — — <i>lentiginosa</i> . . .	1 25	1134. " <i>Gloxinia hybrida (FL., passim)</i> . . .	3 "
1083. " — — <i>lineata</i> . . .	1 "	Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Etablissement possède, tant en érigées qu'en inclinées.	
1084. " — — <i>latifolia pendula</i> . . .	1 "	1135. " — — <i>crassifolia</i> . . .	4 "
1085. " — — <i>linariæfolia</i> . . .	1 50	Race perfectionnée de coloris très-variés, aussi florifère que la précédente; port robuste, feuilles larges et épaisses, fleurs dressées, de forme symétrique, très-grandes.	
1086. " — — <i>longifolia</i> . . .	1 25	1136. <i>fr. Grevillea Banksii</i> . . .	1 50
1087. " — — <i>nutans</i> . . .	1 50	1137. " — — <i>Forsteri</i> . . .	1 "
1088. " — — <i>paniculata</i> . . .	1 50	1138. " — — <i>Hilli</i> . . .	1 50
1089. " — — <i>rigidifolia</i> . . .	1 50	1139. " — — <i>longifolia</i> . . .	1 25
1090. " — — <i>rubra</i> . . .	1 50	1140. " — — <i>Macleayi</i> . . .	1 "
1091. " — — <i>salicifolia</i> . . .	1 50	1141. " — — <i>hybrida</i> . . .	2 "
1092. " — — <i>terminalis rosea</i> . . .	1 50	1142. " — — <i>Manglesi</i> . . .	1 "
1093. " — — <i>Veitchi</i> . . .	1 50	1143. " — — <i>robusta</i> . . .	n 50
1094. " <i>Dyckia species nova</i> . . .	n 50	1144. " — — <i>pyramidalis</i> . . .	n 75
1095. " <i>Echeveria</i> . . .	1 25	1145. " — — <i>Thelemanniana splendens</i> . . .	1 50
Variétés en beau mélange.		1146. " <i>Hakea saligna</i> . . .	1 "
1096. " <i>Epacris hybrida</i> . . .	2 "	1147. " — — <i>Victoria</i> . . .	1 "
Graines récoltées sur la riche collection d'un amateur.		1148. <i>fr.gr. Hardenbergia macrophylla</i> . . .	n 60
1097. <i>pt. Erythrina castra</i> . . .	1 "	1149. " — — <i>ovata alba</i> . . .	n 40
1098. " — — <i>Coraliodendron</i> . . .	1 "	1150. " — — <i>hilacina</i> . . .	n 50
1099. " — — <i>crista galli</i> . . .	n 50	1151. " — — <i>rosea</i> . . .	n 50
1100. " — — <i>floribunda</i> . . .	n 75	1152. " — — <i>salicifolia</i> . . .	n 75
1101. " — — <i>Hendersoni</i> . . .	n 50	1153. <i>ch. Hedysarum gyrans</i> . . .	1 "
1102. " — — <i>Impératrice Eugénie</i> . . .	1 "	La plante Télégraphe dont les jeunes feuilles se meurent pendant les chaleurs.	
1103. " — — <i>insignis</i> . . .	n 75	1154. " <i>Hexacentris coccinea</i> . . .	n 57
1104. " — — <i>laurifolia</i> . . .	n 50	1155. " — — <i>purpurea</i> . . .	1 "
1105. " — — <i>macrophylla</i> . . .	n 75	1156. " — — <i>lutea</i> . . .	n 75
1106. " — — <i>ovalifolia</i> . . .	n 75	1157. " — — <i>mysorensis</i> . . .	1 "
1107. <i>fr. Eucalyptus calophylla</i> . . .	n 50	1158. " <i>Hibiscus macrophyllus</i> . . .	n 75
1108. " — — <i>fissilis</i> . . .	n 40	1159. " — — <i>mutabilis albus plenus</i> . . .	1 50
1109. " — — <i>Globulus</i> . . .	n 50	1160. " — — <i>purpureo-striatus</i> . . .	n 50
Arbre atteignant des proportions gigantesques, à magnifique feuillage d'un vert glauque bleuâtre.		1161. " — — <i>Reevesi</i> . . .	n 50
1110. " — — <i>Lehmanni</i> . . .	n 50	1162. " — — <i>Rosa sinensis aureus</i> . . .	n 40
1111. " — — <i>marginata</i> . . .	n 50	1163. " — — — <i>carminatus</i> . . .	n 50
1112. " — — <i>obliqua</i> . . .	n 30	1164. " — — — <i>havanensis</i> . . .	n 40
1113. " — — <i>oleosa</i> . . .	n 50	1165. " — — — <i>isabellinus</i> . . .	n 40
1114. " — — <i>rostrata</i> . . .	n 50	1166. " — — — <i>ruber</i> . . .	n 50
1115. " <i>Eupatorium albidiflorum</i> . . .	n 75	1167. " — — — <i>speciosus</i> . . .	n 30
1116. " — — <i>grandiflorum album</i> . . .	n 75	1168. " <i>Himantophyllum hybridum</i> , le fruit. . . . .	1 50
1117. " <i>Fagelia bituminosa</i> . . .	n 75	1169. " — — <i>la douzaine</i> . . .	15 "
1118. <i>pt. Ferdinanda eminens</i> . . .	n 75	Graines en mélange récoltées sur notre riche collection.	
1119. <i>ch. Ficus Cooperi</i> . . .	1 50	1170. " — — <i>Van Houttei, le fruit</i> . . .	3 "
1120. " — — <i>eburnea</i> . . .	1 50	1171. " — — <i>la douzaine</i> . . .	30 "
1121. <i>fr.</i> — — <i>elastica</i> . . .	n 75	Hybride superbe gagné dans l'Etablissement, supérieur à tous les autres <i>Himantophyllum</i> , à fleurs plus grandes, mieux faites, d'un coloris plus vif, portées sur des hampes plus élevées.	
1122. <i>ch.</i> — — <i>imperialis</i> . . .	n 75	1172. <i>fr. Hovea Celsi</i> . . .	1 "
1123. " — — <i>laurifolia</i> . . .	n 75	1173. " <i>Indigofera amena</i> . . .	n 40
1124. <i>fr. Fortunea chinensis</i> . . .	n 75	1174. " — — <i>australis</i> . . .	n 40
1125. <i>pt. Fuchsia, variétés anglaises en</i> <i>mélange</i> . . . . .	2 "	1175. " — — <i>coccinea</i> . . .	n 50
1126. " <i>Genista florida</i> . . .	n 40	1176. <i>ch. Inga pulcherrima</i> . . .	1 25
1127. " — — <i>linifolia</i> . . .	n 40	1177. " <i>gr. Ipomœa Leari</i> . . .	n 40
1128. <i>ch. Gesneria Blasi (Dircæa)</i> . . .	1 50	1178. " — — <i>quercifolia</i> . . .	n 40
1129. " — — <i>hybrida (n)</i> . . .	1 50	1179. " — — <i>rubro-cærulea</i> . . .	n 60
Graines en mélange, récoltées sur notre riche collection.		1180. " — — — <i>flore albo</i> . . .	n 75
1130. " — — <i>Leopoldi</i> . . .	2 "		
1131. " — — <i>macrantha (Dircæa)</i> . . .	1 "		
1132. " — — <i>regalis (n)</i> . . .	1 "		



## Fr. C.

1181. fr.	Jacaranda mimosaefolia (FLORE, III, 185)	75
1182. "	— flore albo	1 "
1183. fr.gr.	Kennedya andomarensis	40
1184. " "	— bimaculata	50
1185. " "	— cœrulea	50
1186. " "	— coccinea	75
1187. " "	— Comptoniana	40
1188. " "	— Licheriana	50
1189. " "	— longiracemosa	50
1190. " "	— Maryatti	50
1191. " "	— mollis	40
1192. " "	— nigricans	40
1193. " "	— rubicunda	30
1194. " "	— Sieberiana	50
1195. " "	— Sieboldi	40

Charmantes Papilionacées de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et de coloris variés.

1196. pt. *Lantana*, variétés en mélange . . . 50  
Jolies plantes de coloris variés, l'été, en corbeilles, en pleine terre sèche.

1197. fr. *Libonia floribunda* . . . 1 "  
1198. " — *penrhosiensis* . . . 1 25

Les *Libonia* sont de charmants arbustes fleurissant pendant l'hiver; d'élégantes fleurs en clochettes les garnissent de haut en bas.

1199. " *Lomatia longifolia* . . . 1 "  
1200. fr.gr. *Lophospermum coccineum* . . . 50

1201. " " — *grandiflorum* . . . 40  
Charmantes plantes à cultiver en pot, en plein air, l'été.

1202. fr. *Macadamia ternifolia*, le fruit . . . 50  
1203. fr.gr. *Mandevilla (Echites) suave-*

*olens* (FLORE, XI, 139) . . . 30  
Arbuste à fleur odorante, s'épanouissant et fructifiant en

Provence; connu aussi sous le nom de Jasmin du Tucuman.

1204. pt.gr. *Maurandia antirrhiniflora alba* . . . 25  
1205. " " — *Barclayana* . . . 25

1206. " " — *Emeryana rosea* . . . 30  
1207. " " — *purpurea grandiflora* . . . 30

1208. " " — *semperflorens violacea* . . . 30  
Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes

fleurs, qu'on doit palisser sur treillis ou contre un mur.

1209. ch. *Mimosa pudica* . . . 30  
La *Sensitive* dont les rameaux et les feuilles fléchissent au

moindre attouchement.

1210. " *Musa coccinea* (FL., VII, 213). 2 50  
1211. " — *Ensete* (FLORE, XIV, 65),

*une graine* . . . 1 25  
1212. *la douzaine* . . . 12 "

Serre tempérée pendant sa jeunesse; puis pleine terre en été, en plein soleil, à l'abri des grands vents; le *Musa Ensete* y acquiert de grandes dimensions.

1213. " — *glauca* . . . 1 50  
1214. " — *lancifolia* . . . 1 50

1215. " — *ornata* . . . 1 75  
1216. " — *rosacea* . . . 1 "

1217. " — *sapientum* . . . 1 "  
1218. " — *speciosa* . . . 1 75

1219. " — *superba* . . . 2 "  
1220. " — *uranoscopus* . . . 1 50

1221. " — *zebrina* (FLORE, X, 223). 1 50  
1222. " *Nægelia hybrida* (FL., *passim*). 2 "

Mélange de graines récoltées sur notre riche collection

## Fr. C.

1223. fr. *Nerium splendens* . . . 25  
Mélange de toutes les variétés de *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

1224. ch. *Panax elegans* . . . 1 50  
1225. " *Pandanus utilis*, 10 fruits . . . 2 "

1226. pt. *Panicum plicatum* . . . 40  
1227. " — *sulcatum maximum* . . . 25

Variété ayant le triple des dimensions des autres espèces.  
Bel ornement de pelouse en été.

1228. ch.gr. *Passiflora amabilis* (FLORE, III, 209) . . . 50

1229. fr. " — *cœrulea grandiflora* . . . 40  
1230. " " — *cardinalis* . . . 75

1231. " " — *coelestina* . . . 50  
1232. " " — *edulis* . . . 50

1233. " " — *fulgens* . . . 40  
1234. " " — *Lawsoniana* . . . 50

1235. " " — *palmata* . . . 40  
1236. " " — *suberosa* . . . 40

1237. ch. *Pavetta borbonica* . . . 1 "  
1238. " — *cafra* . . . 1 "

1239. " — *rotundifolia* . . . 75

Pelargonium *Scarlet* (Geranium):

1240. pt. — — variétés à fleurs blanches . . . 50  
1241. " — — — roses . . . 50

1242. " — — — rouges . . . 40  
1243. " — — — saumon . . . 50

1244. " — — — en mélange . . . 50  
1245. fr. — variétés à grandes fleurs . . . 2 "

1246. " — — de fantaisie . . . 1 50  
1247. " — — à cinq macules . . . 2 "

1248. " — — en mélange . . . 1 50  
1249. " *Phaseolus Caracalla* . . . 60

1250. pt. *Phormium tenax* . . . 50  
1251. " — — *atropurpureum* . . . 1 "

1252. fr. *Pimelea ligustrina* . . . 75  
1253. " *Podocarpus elongata* . . . 1 25

1254. " — *longifolia* . . . 1 25  
1255. " *Poinciana Gilliesi* (FL., I, 127). . . 30

Fleurit parfaitement en Provence. Orangerie en Belgique, et pleine terre, au pied d'un mur au midi, en été; les plantes

adultes y opèrent leur admirable floraison.

1256. " — *regia* . . . 1 "  
1257. ch. *Poinsettia heterophylla* . . . 1 50

1258. " — *pulcherrima* . . . 1 "  
Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge

éblouissant.

1259. fr. *Polygala attenuata* . . . 50  
1260. " — *cordata* . . . 40

1261. " — *Dalmaisia* . . . 50  
1262. " — *grandiflora* . . . 30

1263. " — *longifolia* . . . 60  
1264. " *Primula sinensis fimbriata* (Pri-

*mevères de Chine frangées)* alba 1 50  
1265. " — — — alba plena . . . 2 50

1266. " — — — *atrocarminea* . . . 1 25  
1267. " — — — *erecta* . . . 1 "

1268. " — — — flore albo . . . 1 50  
1269. " — — — *kermesina* . . . 1 25

1270. " — — — plena . . . 2 "

	Fr. C.		Fr. C.
1271. fr. <i>Primula sinensis fimbriata</i>		1301. fr. <i>Statice arborea</i>	50
<i>macrophylla alba</i>	1 50	1302. " — <i>Holfordi</i>	60
1272. " — — — <i>kermesina</i>	2 "	1303. " — <i>imbricata</i>	40
1273. " — — — <i>magenta splendida</i>	2 "	1304. " — <i>macrophylla</i>	50
1274. " — — — <i>punctata elegantis-</i>		1305. ch. <i>Strelitzia augusta</i>	2 "
<i>sima</i>	1 50	1306. fr. <i>Swainsonia alba violacea</i>	40
1275. " — — — <i>purpurea plena</i>	2 "	1307. " — <i>Greyana</i>	25
1276. " — — — <i>punctata</i>	1 50	1308. " — <i>Osbornei</i>	30
1277. " — — — <i>rosea</i>	1 "	1309. " — <i>Rollissoni</i>	40
1278. " — — — <i>rubra</i>	1 50	Long épi de grandes fleurs de divers coloris très-vifs; floraison dehors, tout l'été.	
1279. " — — — <i>plena</i>	2 50	1310. fr. gr. <i>Tacsonia eriantha</i>	1 "
1280. " — — — <i>striatiflora</i>	1 50	1311. " " — <i>exoniensis</i>	75
1281. " — — — <i>Variétés hors ligne en</i>		1312. " " — <i>igneae</i>	75
<i>mélange, 100 graines</i>	3 "	L'une des Passiflores les plus brillantes de serre froide.	
Les fleurs en sont très-larges et parfaites de forme, simples ou semi-doubles, à bords dentelés, dans les coloris blancs, incarnats, rosés, carminés, rouge magenta, striés, etc.			
1282. ch. <i>Psidium aromaticum</i>	30	1313. " " — <i>insignis</i>	1 "
1283. " — <i>Cattleyanum</i>	50	1314. " " — <i>manicata</i>	50
1284. " — <i>pomiferum</i>	50	1315. " " — <i>pinnatifida</i>	75
1285. " — <i>pyriferum</i>	50	1316. " " — <i>sanguinea</i> (FL., VIII, 147)	1 "
1286. " — <i>sinense</i>	50	1317. ch. <i>Tamarindus indica</i>	1 "
Les Goyaviers ( <i>Psidium</i> ) sont des arbres fruitiers très-esti- més sous les tropiques; ils fructifient dans nos serres chaudes.			
1287. " <i>Puya heterophylla</i>	1 "	1318. ch. gr. <i>Thunbergia coccinea</i>	1 "
1288. " <i>Ravenala madagascariensis</i>		1319. fr. <i>Veronica hybrida</i>	50
(FLORE, XXI, 121)	1 50	1320. ch. <i>Vinca rosea</i>	30
1289. fr. <i>Rhododendron arboreum hy-</i>		1321. " — — <i>candidissima</i>	40
<i>bridum</i>	1 "	1322. " — — <i>flore albo</i>	30
1290. " — <i>himalayense Campbelliae</i>	2 50	1323. pt. <i>Wigandia caracasana</i>	40
1291. " — — <i>ciliatum</i>	2 "	1324. " — — <i>imperialis</i>	50
1292. " — — <i>Maddeni</i>	2 "	1325. " — — <i>Vigieri</i>	30
1293. pt. <i>Salvia amabilis</i>	50	Les sujets provenant du semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.	
1294. " — <i>patens</i> (FLORE, V, 503)	75	1326. fr. <i>Yucca angustifolia</i>	1 "
1295. " — <i>Pitscheri</i>	40	1327. " — <i>canaliculata</i>	75
1296. " — — <i>alba</i>	75	1328. " — <i>gigantea</i>	50
1297. " — — <i>splendens</i>	50	1329. " — <i>glaucescens</i>	75
1298. " — — <i>alba</i> (FLORE, V, 503)	75	1330. " — <i>Liervali pendula</i>	60
1299. " <i>Solanum Capsicastrum</i> (FLORE, XII, 115)	40	1331. " — <i>lutescens</i>	75
Jolie espèce sous-ligneuse se couvrant de nombreuses baies d'un rouge orangé, qui ornent la plante pendant une grande partie de l'année.			
1300. fr. <i>Sparmannia africana</i>	50	1332. " — <i>quadricolor</i>	1 "
		1333. " — <i>rigidifolia</i>	1 "
		1334. " — <i>Treculeana</i>	75
		1335. " — <i>undulata</i>	60
		1336. " — <i>variegata</i>	50
		1337. " — <i>Whipplei</i>	75

## COLLECTIONS DE GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

1338. Plantes de serres diverses	500 sortes :	fr. 60	»
1339. — — —	100 —	» 34	»
1340. — — —	50 —	» 20	»
1341. — — —	25 —	» 12	»
1342. — — grimpantes	15 —	» 6	»



## GRAINES DE FOUGÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.
1343. fr. <i>Adiantum</i> Capillus Veneris		1396. fr. <i>Goniophlebium</i> Reinwardti . . .	1 "
amabile . . . . .	" 75	1397. ch. <i>Gymnogramma</i> chrysophylla	
1344. ch. — concinnum . . . . .	" 40	Laucheana . . . . .	" 40
1345. " — — latum . . . . .	" 50	1398. " — — gigantea . . . . .	" 40
1346. fr. — cuneatum . . . . .	" 75	1399. " — decomposita . . . . .	" 50
1347. " — diaphanum . . . . .	" 50	1400. " — hybrida . . . . .	" 50
1348. ch. — excisum Leyi . . . . .	" 75	1401. " — Parsonsi . . . . .	" 60
1349. " — — multifidum . . . . .	" 75	1402. " — — gigantea . . . . .	" 50
1350. fr. — formosum . . . . .	" 50	1403. " — peruviana argyrophylla . . .	" 40
1351. ch. — gracillimum . . . . .	" 50	1404. " — tatarica . . . . .	" 50
1352. fr. — hispidulum . . . . .	" 50	1405. " — triangularis . . . . .	" 50
1353. ch. — macrophyllum . . . . .	" 50	1406. " — Wettenhalliana . . . . .	" 40
1354. " — peruvianum . . . . .	" 75	1407. " — — gigantea . . . . .	" 50
1355. " — polyphyllum . . . . .	" 50	1408. fr. <i>Hemionitis</i> palmata . . . .	1 "
1356. " — Sanctæ-Catharinæ . . . .	" 40	1409. ch. <i>Hymenodium</i> palmatum . .	1 "
1357. " — Scutum . . . . .	" 50	1410. " — crinitum . . . . .	1 "
1358. " — trapeziforme . . . . .	" 50	1411. pt. <i>Lastrea</i> cristata . . . . .	" 50
1359. " — Veitchi . . . . .	1 "	1412. " — — major . . . . .	" 50
1360. fr. <i>Aneimia</i> Phyllitidis . . . .	1 "	1413. " — — uliginosa . . . . .	" 50
1361. ch. <i>Angiopteris</i> erecta . . . . .	1 "	1414. " — dilatata . . . . .	" 30
1362. " — neglecta . . . . .	" 75	1415. " — Filix-mas Barnesi . . . .	" 40
1363. fr. <i>Aspidium</i> molle . . . . .	1 "	1416. " — — cristata . . . . .	" 30
1364. " <i>Asplenium</i> aristatum . . . .	" 75	1417. " — — — intermedia . . . .	" 40
1365. " — bulbiferum . . . . .	" 50	1418. " — — — paleacea . . . . .	" 30
1366. " — cristatum variegatum		1419. " — — — pumila . . . . .	" 50
canifolium . . . . .	" 75	1420. " — — — spinulosa . . . . .	" 50
1367. " — Hookeri . . . . .	1 "	1421. fr. <i>Litobrochia</i> Alecyonis . . .	" 50
1368. " — nemorale . . . . .	" 50	1422. " — Currori . . . . .	1 "
1369. " — Veitchianum . . . . .	" 75	1423. " — nobilis . . . . .	2 "
1370. pt. <i>Athyrium</i> asplenioides angustum	" 75	1424. " — palmata . . . . .	1 "
1371. " — Filix-fœmina alatum . . .	" 75	1425. " <i>Lomaria</i> ciliata . . . . .	" 50
1372. " — — Applebyanum . . . . .	" 50	1426. " — Patersoni . . . . .	" 75
1373. " — — — cornigerum . . . . .	" 50	1427. " <i>Microlepis</i> davallioides furcans	1 "
1374. " — — — Craigii . . . . .	" 50	1428. " — rugosa . . . . .	1 "
1375. " — — — depauperatum . . . .	" 50	1429. " <i>Nephrolepis</i> neglecta . . . .	" 50
1376. " — — — Frizellæ . . . . .	" 25	1430. " — undulata . . . . .	" 50
1377. " — — — laciniato-angustum	" 50	1431. ch. <i>Nothochlæna</i> lævis . . . .	" 75
1378. " — — — laciniatum . . . . .	" 40	1432. pt. <i>Osmunda</i> cinnamomea . . .	" 50
1379. " — — — multifidum . . . . .	" 40	1433. " — regalis . . . . .	" 40
1380. " — — — pendulum . . . . .	" 40	1434. fr. <i>Polypodium</i> albo-punctatum	1 "
1381. " — — — Pritchardicristatum	" 50	1435. " — aureum . . . . .	" 50
1382. " — — — purpureum . . . . .	" 30	1436. " — Dryopteris . . . . .	" 40
1383. " — — — Stansfieldi . . . . .	" 75	1437. pt. <i>Polystichum</i> acrostichoides	" 40
1384. " — — — stipatum . . . . .	" 50	1438. " — angulare hirsutissimum .	" 40
1385. " — — — Vernoniæ crispum	" 60	1439. " — — plumosum . . . . .	" 50
1386. " — — — Victoriæ . . . . .	" 50	1440. " — — proliferum . . . . .	" 60
1387. " <i>Blechnum</i> Spicant . . . . .	" 50	1441. fr. <i>Pteris</i> argyræa . . . . .	" 40
1388. " — — contractum . . . . .	" 60	1442. " — cretica albo-lineata . . .	" 75
1389. fr. <i>Campyloneuron</i> decurrens .	1 "	1443. " — leptophylla . . . . .	" 75
1390. " <i>Cibotium</i> regale . . . . .	" 75	1444. " — serrulata . . . . .	" 50
1391. " — Schiedei . . . . .	" 75	1445. " — — Leyi . . . . .	1 "
1392. " <i>Cyathea</i> Burkei . . . . .	1 "	1446. pt. <i>Scolopendrium</i> pendulum . .	" 50
1393. pt. <i>Cystopteris</i> fragilis . . . .	" 40	1447. " <i>Todea</i> hymenophylloides . .	1 50
1394. ch. <i>Diplazium</i> grandiflorum . .	" 75	1448. " <i>Woodsia</i> obtusa . . . . .	1 "
1395. fr. — pubescens . . . . .	1 "		

## GRAINES DE FOUGÈRES.

Au choix de l'Établissement.

1449.	Fougères de serre chaude . . . . .	12	sortes : fr.	5	»
1450.	— — froide. . . . .	12	—	»	5
1451.	— de pleine terre. . . . .	12	—	»	3 50

## GRAINES DE PALMIERS.

Arrivées récemment du pays natal.

				Fr. C.
1452.	ch. <i>Areca alba</i> . . . . .	10	graines	3
1453.	n — <i>Catechu</i> . . . . .	10	n	2
1454.	— — — . . . . .	100	n	15
1455.	n — <i>madagascariensis</i> . . . . .	10	n	2
1456.	— — — . . . . .	100	n	15
1457.	n — <i>nobilis</i> . . . . .	10	n	4
1458.	— — — . . . . .	100	n	30
1459.	n — <i>oleracea</i> . . . . .	10	n	2
1460.	— — — . . . . .	100	n	15
1461.	fr. — <i>rubra</i> HORT. . . . .	10	n	1
1462.	ch. <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .	10	n	2
1463.	n <i>Borassus flabelliformis</i> . . . . .	10	n	2
1464.	n <i>Caryota Alberti</i> . . . . .	10	n	2 50
1465.	n — <i>urens</i> . . . . .	10	n	2 50
1466.	n <i>Chamædorea Deckeriana</i> . . . . .	10	n	2 50
1467.	n — <i>geonomæformis</i> . . . . .	10	n	5
1468.	n — <i>Sartorii</i> . . . . .	10	n	2 50
1469.	fr. <i>Chamærops argentea</i> . . . . .	10	n	1 50
1470.	n — <i>Biroo</i> . . . . .	10	n	2
1471.	n — <i>canariensis</i> . . . . .	10	n	2
1472.	n — <i>dealbata</i> . . . . .	10	n	2
1473.	n — <i>elata</i> . . . . .	10	n	1 50
1474.	n — <i>erecta rigidifolia</i> . . . . .	10	n	2 50
1475.	n — <i>excelsa</i> . . . . .	100	n	2
1476.	n — <i>farinosa</i> . . . . .	10	n	2
1477.	n — <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .	10	n	2
1478.	n — <i>gracilis</i> . . . . .	10	n	1 50
1479.	n — <i>Humboldti</i> . . . . .	10	n	2 50
1480.	n — <i>humilis</i> . . . . .	10	n	60
1481.	n — — . . . . .	100	n	4
1482.	n — <i>arborea</i> . . . . .	10	n	1 75
1483.	n — <i>elegans tomentosa</i> . . . . .	10	n	2
1484.	n — <i>nana compacta</i> . . . . .	10	n	1 50
1485.	n — <i>Hystrix</i> . . . . .	10	n	2
1486.	n — <i>indica nigra variegata</i> . . . . .	10	n	3
1487.	n — <i>lanceolata</i> . . . . .	10	n	2
1488.	n — <i>longifolia</i> . . . . .	10	n	2
1489.	n — <i>macrophylla</i> . . . . .	10	n	1 50
1490.	n — <i>Martiana</i> . . . . .	10	n	2 50
1491.	n — <i>melanacantha</i> . . . . .	10	n	1 50
1492.	n — <i>nivea</i> . . . . .	10	n	1 50
1493.	n — <i>robusta</i> . . . . .	10	n	1 75
1494.	n — <i>stauracantha</i> . . . . .	10	n	4
1495.	fr. <i>Cocos australis</i> . . . . .	10	n	2
1496.	n — <i>Bonneti</i> . . . . .	10	n	2 50



					Fr. C.
1497.	fr.	<i>Cocos botryophora</i>	10	graines	3 "
1498.	"	— <i>campestris</i>	10	"	2 50
1499.	ch.	— <i>coronata</i>	10	"	3 "
1500.	"	— <i>flexuosa</i>	10	"	3 "
1501.	"	— <i>lapidea</i>	10	"	2 "
1502.	"	— <i>peruviana</i>	10	"	2 50
1503.	fr.	— <i>plumosa</i>	10	"	3 "
1504.	"	— <i>Romanzoffiana</i>	10	"	3 "
1505.	ch.	— <i>schizophylla</i>	10	"	2 "
1506.	"	— <i>Weddelliana</i>	10	"	4 "
1507.	fr.	<i>Copernicia littoralis</i>	10	"	2 "
1508.	"	— <i>tectorum</i>	10	"	2 50
1509.	"	— <i>Wighti</i>	10	"	2 "
1510.	"	<i>Corypha australis</i> ( <i>Livistona</i> ) (FLORE, XVII, 129)	10	"	2 50
1511.	"	— — —	100	"	15 "
1512.	ch.	— <i>elata</i>	10	"	3 "
1513.	fr.	— <i>excelsa</i>	10	"	3 "
1514.	ch.	— <i>Gebanga</i>	10	"	2 "
1515.	"	— <i>macroglossa spinosa</i>	10	"	2 25
1516.	"	— <i>ovalifolia</i>	10	"	2 50
1517.	fr.	— <i>tectorum</i>	10	"	3 "
1518.	"	— <i>umbraculifera</i>	10	"	3 "
1519.	ch.	<i>Elaeis guineensis</i>	10	"	2 50
1520.	"	<i>Euterpe edulis</i>	10	"	1 50
1521.	"	— — —	100	"	12 "
1522.	"	<i>Geonoma Ghiesbreghtii</i>	10	"	5 "
1523.	"	— <i>pumila</i>	10	"	3 "
1524.	"	— <i>Schottiana</i>	10	"	2 "
1525.	"	— — —	100	"	15 "
1526.	"	— <i>speciosa</i>	10	"	2 "
1527.	"	— — —	100	"	15 "
1528.	"	<i>Hyophorbe amaricaulis</i>	10	"	3 "
1529.	fr.	<i>Jubæa spectabilis</i>	10	"	4 "
1530.	"	<i>Latania borbonica</i>	10	"	75 "
1531.	"	— — —	100	"	6 "
1532.	ch.	<i>Oreodoxa regia</i>	10	"	2 "
1533.	"	<i>Phœnicophorium Sechellarum</i>	10	"	2 "
1534.	"	— — —	100	"	15 "
1535.	fr.	<i>Phœnix acaulis</i>	10	"	1 50
1536.	"	— <i>canariensis</i>	10	"	2 "
1537.	"	— <i>cycadifolia</i>	10	"	1 50
1538.	"	— <i>dactylifera</i>	10	"	75 "
1539.	"	— <i>farinifera</i>	10	"	1 25
1540.	"	— — —	100	"	10 "
1541.	"	— <i>glaucescens</i>	10	"	2 "
1542.	"	— <i>leonensis</i>	10	"	1 50
1543.	"	— — —	100	"	12 "
1544.	"	— — <i>spinosa</i>	10	"	2 "
1545.	"	— <i>natalensis</i>	10	"	2 50
1546.	"	— <i>paludosa</i>	10	"	1 50
1547.	"	— <i>paradenia</i>	10	"	1 50
1548.	"	— — —	100	"	12 "
1549.	"	— <i>peruviana</i>	10	"	2 50
1550.	"	— <i>pumila</i>	10	"	1 50
1551.	"	— <i>reclinata</i>	100	"	3 "
1552.	"	— — —	1000	"	25 "
1553.	"	— <i>rupicola</i>	10	"	2 "
1554.	"	— — —	100	"	15 "

L'un des plus beaux *Phœnix*, encore très-rare dans les collections; graines fraîches.

			Fr. C.
1555.	fr. <b>Phoenix</b> saharensis . . . . .	10 graines	2 50
1556.	" — senegalensis . . . . .	10 "	1 50
1557.	" — sylvestris . . . . .	10 "	1 50
1558.	" — — . . . . .	100 "	12 "
1559.	" — tenuis . . . . .	10 "	2 50
1560.	" — tomentosa . . . . .	10 "	2 "
1561.	" <b>Pritchardia</b> filifera . . . . .	10 "	1 50
1562.	" — — . . . . .	100 "	12 "
1563.	" <b>Sabal</b> Adansoni . . . . .	10 "	1 "
1564.	" — angustifolia . . . . .	10 "	2 "
1565.	" — australis . . . . .	10 "	2 "
1566.	" — Blackburniana . . . . .	10 "	2 50
1567.	" — dealbata . . . . .	10 "	2 "
1568.	" — Ghiesbreghtii . . . . .	10 "	1 50
1569.	" — havanensis . . . . .	10 "	2 50
1570.	" — longifolia . . . . .	10 "	2 "
1571.	" — longipedunculata . . . . .	10 "	2 "
1572.	" — macrophylla . . . . .	10 "	2 "
1573.	" — mauritiæformis . . . . .	10 "	1 50
1574.	" — mexicana . . . . .	10 "	2 "
1575.	" — Mocini . . . . .	10 "	2 "
1576.	" — Palmetto . . . . .	10 "	1 25
1577.	ch. — princeps . . . . .	10 "	2 "
1578.	" — speciosa . . . . .	10 "	2 "
1579.	" — umbraculifera . . . . .	10 "	2 50
1580.	fr. <b>Seaforthia</b> elegans (FLORE, XX, 93) . . . . .	10 "	2 "
1581.	" — Cunninghamii . . . . .	10 "	3 "
1582.	ch. <b>Thrinax</b> argentea . . . . .	10 "	2 "
1583.	" — elegans . . . . .	10 "	2 "
1584.	" — gracilis . . . . .	10 "	2 "
1585.	" — radiata . . . . .	10 "	2 50

## GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr. C.		Fr. C.
1586. <b>Alisma sinense</b> . . . . .	" 40	1603. <b>Nelumbium rubrum plenum</b> . . . . .	2 "
1587. <b>Cyperus alternifolius foliis varieg.</b> . . . .	" 75	1604. — <b>speciosum</b> (FLORE, III, 265) . . . . .	2 "
1588. — <b>fastigiatus</b> . . . . .	" 30	1605. <b>Nymphaea albobirens</b> . . . . .	1 50
1589. — <b>myriostachyus</b> . . . . .	" 25	1606. — <b>ampla</b> . . . . .	1 "
1590. — <b>Papyrus</b> . . . . .	" 60	1607. — <b>cærulea</b> (FLORE, VII, 19) . . . . .	" 50
1591. — <b>tuberculatus</b> . . . . .	" 75	1608. — <b>capensis</b> . . . . .	1 "
1592. — <b>vegetus</b> . . . . .	" 30	1609. — <b>dentata</b> (FLORE, VI, 293) . . . . .	" 75
1593. — <b>virens</b> . . . . .	" 25	1610. — <b>scutifolia</b> (FLORE, VI, 341) . . . . .	" 50
1594. <b>Hydrolea azurea</b> . . . . .	" 40	1611. — <b>thermalis</b> (FLORE, VII, 169) . . . . .	" 50
1595. <b>Nelumbium album</b> . . . . .	1 25	1612. <b>Papyrus antiquorum</b> . . . . .	1 "
1596. — — <b>plenum</b> . . . . .	1 50	1613. — <b>sicular</b> . . . . .	" 50
1597. — <b>asperifolium</b> . . . . .	1 25	1614. <b>Phalaris arundinacea</b> . . . . .	" 25
1598. — <b>carnosum</b> . . . . .	1 50	1615. <b>Pontederia cordata</b> . . . . .	" 40
1599. — <b>luteum</b> . . . . .	1 "	1616. <b>Thalia dealbata</b> . . . . .	" 40
1600. — — <b>plenum</b> . . . . .	1 25	1617. <b>Victoria regia</b> (FLORE, III, 199-204), <i>une graine</i> . . . . .	1 "
1601. — <b>macrorrhizum</b> . . . . .	1 25	1618. — — <i>la douzaine</i> . . . . .	10 "
1602. — <b>roseum flore pleno</b> . . . . .	1 50		



## GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — Samen von Zwiebel und Knollengewächsen.

	Fr. C.		Fr. C.
1619. <i>Agapanthus minor</i> Mooreanus . . .	75	1671. <i>Cyclamen persicum album</i> . . .	1 25
1620. <i>Allium acuminatum</i> (FL., VI, 339) . . .	40	1672. — — — candidissimum . . .	1 50
1621. — album . . . . .	25	1673. — — giganteum . . . . .	2 "
1622. — cydni . . . . .	25	1674. — — roseum . . . . .	1 "
1623. — fragrans . . . . .	25	1675. — — en mélange . . . . .	1 "
1624. — roseum . . . . .	30	1676. — — pyrenaicum . . . . .	" 50
1625. — sibiricum . . . . .	30	1677. — repandum . . . . .	" 75
1626. — triquetrum . . . . .	25	1678. — <i>Collection de 12 espèces</i> . . .	5 "
1627. <i>Alstromeria aurantiaca</i> . . . . .	30	1679. <i>Dahlia, en mélange</i> . . . . .	" 40
1628. — chilensis . . . . .	40	1680. — <i>liliputiens, en mélange</i> . . .	" 50
Mélange de belles variétés.		1681. <i>Erythronium Dens canis flore albo</i> (FLORE, VIII, 273). . . . .	" 25
1629. — peruviana . . . . .	40	1682. — — — purpureo . . . . .	" 30
1630. <i>Anemone coronaria</i> . . . . .	30	1683. — — — — majus . . . . .	" 40
1631. — fulgens . . . . .	40	1684. — — — — roseo . . . . .	" 30
1632. — — atrosanguinea . . . . .	50	1685. <i>Fritillaria imperialis</i> . . . . .	" 40
1633. <i>Arum cornutum</i> ( <i>Sauromatum</i> ) . . .	40	1686. — Meleagris . . . . .	" 30
1634. <i>Babiana, en mélange</i> . . . . .	40	1687. <i>Geissorrhiza Hookeri</i> . . . . .	" 30
1635. <i>Bobartia aurantiaca</i> . . . . .	40	1688. <i>Gladiolus communis</i> . . . . .	" 25
1636. <i>Botryanthus moschatus racemosus</i> .	25	1689. — — roseus major . . . . .	" 40
1637. — neglectus . . . . .	25	1690. — gandavensis, <i>en beau mélange</i> .	" 50
1638. <i>Bravoa geminiflora</i> (FL., V, 520) .	40	1691. — nanus . . . . .	" 50
1639. <i>Brodiaea congesta hybrida</i> . . .	40	1692. <i>Hyacinthus (Galtonia) candicans</i> (FLORE, XXI, 47). . . . .	" 75
1640. <i>Bulbocodium vernum</i> . . . . .	25	1693. — — — 25 grammes . . . . .	5 "
1641. <i>Calliprora lutea</i> . . . . .	50	1694. <i>Iris anglica, en mélange</i> . . . .	" 25
1642. <i>Calochortus elegans</i> . . . . .	40	1695. — — — 25 grammes . . . . .	2 50
1643. — lilacinus . . . . .	40	1696. — calaminaris . . . . .	" 25
1644. <i>Camassia esculenta</i> (FL., III, 275). .	30	1697. — graminea . . . . .	" 25
1645. — — alba . . . . .	50	1698. — <i>Güldenstädtii</i> . . . . .	" 25
1646. — — atrocærulea . . . . .	30	1699. — — cærulea . . . . .	" 25
1647. — — erecta . . . . .	40	1700. — hispanica, <i>en mélange</i> . . . .	" 25
1648. — præcox . . . . .	50	1701. — — — 25 grammes . . . . .	2 50
1649. <i>Colchicum autumnale</i> . . . . .	25	1702. — <i>Kämpferi</i> . . . . .	" 40
1650. — — flore albo . . . . .	30	1703. — pulchella . . . . .	" 25
1651. — — multiflorum . . . . .	30	1704. — sibirica, <i>en mélange</i> . . . . .	" 25
1652. — Bivonæ . . . . .	25	1705. — versicolor . . . . .	" 25
1653. — lætum . . . . .	30	1706. — virginica . . . . .	" 25
1654. — speciosum . . . . .	50	1707. <i>Ixia, en beau mélange</i> . . . . .	" 40
1655. <i>Commelina caroliniana</i> . . . . .	25	1708. <i>Lilium dauricum</i> . . . . .	" 50
1656. — cœlestis . . . . .	25	1709. — giganteum . . . . .	1 "
1657. — — flore albo . . . . .	25	1710. — Jama Juri . . . . .	" 50
1658. — — foliis variegatis . . . . .	30	1711. — Martagon . . . . .	" 50
1659. <i>Crocus</i> (FL., XVI, 135), <i>en mélange</i> .	25	1712. — — dalmaticum . . . . .	1 "
1660. <i>Cyclamen coum</i> . . . . .	40	1713. — — flore albo . . . . .	" 50
1661. — — vernum . . . . .	75	1714. — — punctatum . . . . .	" 75
1662. — hederæfolium album . . . . .	1 "	1715. — pomponium luteum . . . . .	" 50
1663. — — rubrum . . . . .	75	1716. — — rubrum . . . . .	" 75
1664. — hybridum Atkinsi ( <i>ibericum</i> <i>album</i> ) . . . . .	75	1717. — pyramidale superbum . . . . .	" 75
1665. — — carneum . . . . .	75	1718. — Szowitzianum . . . . .	" 50
1666. — ibericum roseum . . . . .	75	1719. <i>Methonica virescens Plantii</i> . .	1 "
1667. — latifolium . . . . .	50	1720. <i>Moræa longifolia</i> . . . . .	" 50
1668. — — macrophyllum . . . . .	40	1721. — sinensis . . . . .	" 40
1669. — macrophyllum . . . . .	1 "		
1670. — — marmoratum . . . . .	50		

	Fr. C.		Fr. C.
1722. <i>Narcissus Bulbocodium</i> . . . . .	n 40	1736. <i>Scilla nutans carnea</i> . . . . .	n 25
1723. <i>Nemastylis geminiflora</i> . . . . .	n 50	1737. — — <i>rosea</i> . . . . .	n 25
1724. <i>Ornithogalum atticum</i> . . . . .	n 25	1738. — — <i>peruviana (Clusiana)</i> . . . . .	n 30
1725. — <i>narbonense</i> . . . . .	n 40	1739. — — <i>alba</i> . . . . .	n 30
1726. — <i>pyramidale</i> . . . . .	n 40	1740. — — <i>bicolor</i> . . . . .	n 30
1727. <i>Puschkinia scilloides</i> . . . . .	n 75	1741. — — <i>sibirica</i> . . . . .	n 25
1728. <i>Ranunculus asiaticus flore pleno</i> . . . . .	n 30	1742. <i>Sparaxis tricolor, en mélange</i> . . . . .	n 25
1729. <i>Scilla amethystina</i> . . . . .	n 40	1743. <i>Tigridia caelestis</i> . . . . .	n 40
1730. — — <i>alba</i> . . . . .	n 50	1744. <i>Trichonema speciosum</i> . . . . .	n 40
1731. — — <i>bifolia</i> . . . . .	n 25	1745. <i>Triteleia laxa</i> . . . . .	n 40
1732. — — <i>alba</i> . . . . .	1 n	1746. — — <i>obscura</i> . . . . .	1 n
1733. — — <i>grandiflora</i> . . . . .	n 75	1747. — — <i>pallida</i> . . . . .	1 50
1734. — — <i>rosea</i> . . . . .	n 60	1748. <i>Tritonia, en mélange</i> . . . . .	n 30
1735. — — <i>nutans alba</i> . . . . .	n 25	1749. <i>Uropetalum serotinum</i> . . . . .	n 25

## GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

1750. 50 sortes au choix de l'Établissement . . . . .	fr. 10 n
1751. 25 — — — — — . . . . .	n 6 n

## GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen*.

Toute demande de moins d'un quart de kilogr. sera cotée d'après le prix établi pour le détail.

Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre, pour plant à hiverner, sont désignées par le signe +.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Arroche (Orach) :</b> 15 GRAMMES.		<b>Asperge (Asparagus) :</b>	
1752. blonde, Belle Dame . . . . .	n 25	1768. blanche grosse d'Argenteuil,	
1753. verte géante de Lee . . . . .	n 25	30 grammes . . . . .	n 75
Toutes les variétés d'Arroche sont d'une grande ressource		1769. . . . .	le kilogr. . . . . 15 n
pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.		1770. Belles plantes de 2 ans, le cent . . . . .	5 n
<b>Artichaut (Artichoke) :</b>		1771. . . . . 3 — — — — —	7 50
1754. gros camus de Bretagne . . . . .	1 25	1772. blanche grosse Connover's Colossal,	
1755. Belles plantes . . . les douze . . . . .	7 50	30 grammes . . . . .	n 75
Très-bonne espèce plus précoce que l'A. vert de Laon ;		1773. Belles plantes de 2 ans, le cent . . . . .	7 50
fruit aplati au sommet.		Variété américaine très-grosse et de bonne qualité.	
1756. vert de Laon . . . . .	1 n	<b>Betterave (Beet) :</b> 15 GRAMMES.	
1757. . . . . le kilogr. . . . .	25 n	1774. rouge longue à salade . . . . .	n 25
1758. Belles plantes . . . les douze . . . . .	7 50	1775. . . . . le kilogr. . . . .	4 n
Variété très-cultivée en Belgique et dans le nord de la		1776. — — nec plus ultra . . . . .	n 30
France ; très-gros fruit vert d'excellente qualité.		1777. . . . . le kilogr. . . . .	5 n
1759. vert de Provence . . . . .	n 60	Variété à racine demi-longue, rouge noirâtre, d'excel-	
1760. . . . . le kilogr. . . . .	20 n	lente qualité ; feuilles d'un cramoisi luisant à reflet métal-	
1761. Belles plantes . . . les douze . . . . .	5 n	lique, très-ornementales.	
La plus hâtive de toutes les variétés ; fruits moins gros que		1778. — plate d'Égypte . . . . .	n 30
celui de l'A. vert de Laon.		1779. . . . . le kilogr. . . . .	5 n
1762. violet . . . . .	n 60	Variété à petites feuilles et à racine rouge sang foncé, de	
1763. . . . . le kilogr. . . . .	20 n	forme ronde aplatie.	
Variété précoce requérant un climat chaud, excellente à		1780. — Victoria . . . . .	n 50
la poivrade, moins bonne cuite.		Variété très-précoce ; racine demi-longue, fusiforme,	
<b>Asperge (Asparagus) :</b>		rouge noirâtre ; feuilles rouge sang à reflet métallique, très-	
1764. blanche grosse de Gand, 30 grammes . . . . .	n 30	ornementales.	
1765. . . . . le kilogr. . . . .	7 50	<b>Cardon (Cardoon) :</b>	
1766. Belles plantes de 2 ans, le cent . . . . .	2 50	1781. d'Espagne . . . . .	n 40
1767. . . . . 3 — — — — —	3 50	1782. . . . . le kilogr. . . . .	10 n
		Sans épines et à côtes très-pleines.	



Fr. C.	
<b>Cardon (Cardoon) :</b>	15 GRAMMES.
1783. de Tours . . . . .	" 30
1784. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Côtes épineuses, charnues et pleines.

1785. Puvis . . . . .	" 30
1786. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Variété non épineuse, à côtes larges et pleines, d'un beau rose purpurin après l'étiollement.

50 GRAMMES.	
<b>Carottes hâtives :</b>	
1787. + rouge courte Grelot ( <i>C. Toupie</i> ). . . . .	" 75
1788. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

La plus hâtive de toutes les Carottes, d'un rouge foncé, très-courte, presque ronde, convenant surtout pour culture forcée.

1789. + — — fine à primeur . . . . .	" 75
1790. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Pour culture à froid sous châssis, le premier semis en pleine terre sur coteière, et le semis d'automne pour hiverner sur place.

1791. + — — de Hollande . . . . .	" 75
1792. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Excellente variété très-précoce, très-répandue dans les Flandres, très-productive, d'un rouge foncé, très-sucrée.

1793. — demi-longue nantaise . . . . .	" 75
1794. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Très-belle variété, très-productive, très-grosse, sans cœur, d'un rouge foncé, très-sucrée, de très-bonne qualité.

1795. — — — obtuse . . . . .	" 75
1796. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Semée au printemps, cette excellente variété d'entre-saison succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

Carottes tardives :	
1797. rouge d'Altringham . . . . .	" 60
1798. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

Variété très-longue, d'un rouge foncé, douce et de bonne garde; on la cultive en grand pour la coloration du beurre.

1799. — demi-courte de Gand . . . . .	" 75
1800. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Variété très-grosse, très-productive, cylindrique, d'un rouge vif, supérieure pour provision d'hiver et pour entre-semis.

1801. — longue de Hollande . . . . .	" 75
1802. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Excellente variété très-productive, longue, grosse, d'un rouge foncé, très-sucrée, très-appreciée dans les Flandres.

1803. — — obtuse sans cœur . . . . .	" 75
1804. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout arrondi, vraiment sans cœur, de qualité excellente.

Céleri ( <i>Celery</i> ) :	
1805. blanc ture . . . . .	" 25
1806. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

Variété améliorée à côtes très-larges, longues, très-pleines, charnues, d'un vert foncé luisant.

1807. — plein à grosses côtes . . . . .	" 30
1808. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Belle variété perfectionnée, sans dragons, à côtes plus pleines et plus serrées que chez les autres variétés, blanchissant très-facilement et presque naturellement.

1809. — frisé fin à couper . . . . .	" 25
1810. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

On le sème très-épais; il repousse, après avoir été coupé, comme le Persil et le Cerfeuil.

1811. — nain de Sandringham . . . . .	" 30
1812. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Belle et excellente variété à côtes blanches, bien pleines, excessivement larges et très-tendres.

Fr. C.	
<b>Céleri (<i>Celery</i>) :</b>	15 GRAMMES.
1813. blanc court hâtif . . . . .	" 25
1814. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été, en paillant le sol; le lier comme les Endives; il blanchit sans buttage.

1815. Major Clarke's . . . . .	" 50
--------------------------------	------

Superbe variété anglaise à côtes d'un rose violacé, bien pleines, charnues et tendres après l'étiollement.

1816. violet gros de Tours . . . . .	" 25
1817. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

Variété à côtes très-larges, d'un vert foncé lavé de violet, charnues, tendres et cassantes.

1818. Rave ou Céleri Navet . . . . .	" 25
1819. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

1820. — d'Erfurt, très-gros . . . . .	" 30
1821. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 10

Plus hâtif que le Céleri Rave ordinaire; racine plus grosse, très-tendre et douce.

1822. — pommé . . . . .	" 40
1823. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 13

Très-remarquable variété donnant des tubercules gros, presque sphériques et entièrement lisses; chair tendre, blanche et de très-bonne qualité.

Cerfeuil ( <i>Chervil</i> ) :	
1824. + frisé ou en rosette, 30 grammes . . . . .	" 40

1825. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7
1826. + — mousse . . . . .	" 50

1827. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 9
---	-----

Nouvelle variété très-précieuse et tellement frisée que ses feuilles semblent être de la mousse.

1828. + ordinaire . . . . .	" 40
1829. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 7

1830. Champignon (Blanc de), <i>le kilogr.</i> . . . .	" 3 50
--	--------

Chicorée ( <i>Endive</i> ) :	
1831. frisée de la Passion . . . . .	" 75

Variété à longues feuilles vertes, frisées, rouges à la base, formant une très-grande rosette.

1832. — fine de Ruffec . . . . .	" 60
1833. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 20

Variété à feuilles très-longues, extrêmement découpées, d'un blond verdâtre.

1834. — d'Italie . . . . .	" 50
1835. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 16

Cette variété est la meilleure pour les premiers semis d'été et pour culture forcée; feuilles d'un vert brillant, pomme serrée et dure au centre.

1836. — toujours blanche . . . . .	" 50
1837. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 16

Variété à semer de mars en septembre; elle se coupe sans pomme comme les *Laitues à couper*.

1838. — mousse très-fine . . . . .	" 60
1839. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 20

Variété très-recherchée pour salade, dont la feuille est si finement découpée et tellement crispée qu'elle ressemble à de la mousse.

1840. — verte de Meaux . . . . .	" 40
1841. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 13

Variété très-répandue, plus lente à se faire que la *Chicorée d'Italie* et convenant mieux pour l'automne.

1842. — de Louviers . . . . .	" 60
1843. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	" 20

Variété améliorée dont le cœur est tellement finement blanchi que l'intérieur blanchit sans être étioilé; feuilles finement découpées.

Fr. C.

**Chicorée (*Endive*) :** 15 GRAMMES.

1844. Scarole très-large . . . . . " 50  
 1845. . . . . *le kilogr.* . . . . " 16 "  
 La plus recommandable des Scaroles; cœur bien fourni et presque pommé.

1846. — blonde . . . . . " 40  
 1847. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "  
 1848. sauvage panachée . . . . . " 25  
 1849. . . . . *le kilogr.* . . . . " 8 "

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun, donnant une très-bonne salade d'hiver lorsqu'on la fait blanchir par étiolement.

1850. — pommée . . . . . " 25  
 1851. . . . . *le kilogr.* . . . . " 8 "

Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole*.

N. B. Ces deux dernières variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.

1852. à grosse racine de Bruxelles (*Witloof*) " 40  
 1853. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Feuilles assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de *Romaine*; excellent légume d'hiver et de printemps.

**Chou cabas ou pommé (*Cabbage*) :**

1854. blanc cœur de bœuf . . . . . " 30

1855. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété tardive très-cultivée; pomme en ovule renversé, serrée, obtuse.

1856. + — à pied court . . . . . " 30

1857. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété hâtive; pomme ronde et ferme, de grosseur moyenne.

1858. — de Saint-Denis . . . . . " 30

1859. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

1860. + — d'Erfurt . . . . . " 40

1861. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Belle pomme ronde n'ayant presque pas de feuilles, d'excellent goût et précoce.

1862. — pointu de Winnigstadt . . . . . " 40

1863. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Excellente variété tardive et très-productive; pomme grosse, conique, dure et très-serrée.

1864. — Quintal de Strasbourg . . . . . " 30

1865. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété tardive et très-estimée pour faire la Choucroute; pomme très-grosse, ronde, très-ferme.

1866. + — Joannet ou nantais . . . . . " 30

1867. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété précoce; pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.

1868. + — femelle ou de Fumel . . . . . " 30

1869. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Le plus hâtif de tous les choux de printemps; pomme ronde, peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.

1870. — plat de Brunswick . . . . . " 30

1871. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Excellente variété tardive, supportant très-bien le froid; pomme plate, très-grosse et ferme.

1872. + — hâtif d'York . . . . . " 30

1873. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété très-précoce; pomme petite, conique, serrée.

1874. + — pain de sucre . . . . . " 30

1875. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété hâtive, très-tendre et très-estimée; pomme allongée en cône renversé.

Fr. C.  
15 GRAMMES.**Chou cabas ou pommé (*Cabbage*) :**

1876. blanc de Schweinfurt . . . . . " 40

1877. . . . . *le kilogr.* . . . . " 16 "

Le plus gros de tous les Choux, très-hâtif; pomme énorme, ronde, un peu aplatie, peu ferme.

1878. + rouge foncé de Gand . . . . . " 30

1879. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété tardive; pomme grosse et ronde.

1880. + — noir dur d'Utrecht . . . . . " 40

1881. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Variété hâtive de saveur musquée; pomme moyenne, ronde.

1882. + — tête de nègre . . . . . " 40

1883. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Variété hâtive pour salade; pomme très-petite.

**Chou pommé de Milan (*Savoy*) :**

1884. doré . . . . . " 30

1885. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété qui mérite d'être plus cultivée; pomme arrondie, très-lâche, prenant une couleur tout à fait jaune pendant l'hiver.

1886. + d'Ulm (*Chou de mai*) . . . . . " 40

1887. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite, ronde, un peu conique, peu serrée, feuilles fortement cloquées; variété indispensable et très-estimée dans les Flandres où on la rencontre sur tous les marchés, au mois de mai.

1888. + court hâtif . . . . . " 40

1889. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Pomme moyenne, déprimée, serrée, finement frisée; pied extrêmement court.

1890. + de Vienne, vert à pied court . . . . . " 40

1891. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Variété naine à petite pomme très-dure, d'un vert glacé.

1892. de Gand, vert gros d'hiver . . . . . " 40

1893. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Bonne variété à pomme verte, grosse, dure, frisée, très-cultivée dans les Flandres pour provision d'hiver.

1894. de Norvège . . . . . " 30

1895. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.

1896. des Vertus . . . . . " 40

1897. . . . . *le kilogr.* . . . . " 13 "

Variété très-volumineuse, excellente pour la ferme; pomme ronde.

1898. Pancalier de Joulin . . . . . " 30

1899. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Excellente variété hâtive à petite pomme bien serrée, d'un vert glacé, à pied court.

1900. Victoria . . . . . " 30

1901. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

Variété tardive, bonne et très-estimée; pomme grosse, très-frisée.

1902. Chou de Bruxelles ou à jets,

(*Sprout*) . . . . . " 30

1903. . . . . *le kilogr.* . . . . " 10 "

1904. -- — nain . . . . . " 75

Graines récoltées sur des plantes de premier choix.

1905. — — Schrymger's Giant . . . . . " 60

1906. . . . . *le kilogr.* . . . . " 20 "

Variété anglaise produisant une grande quantité de jets très-gros, fermes et serrés.



Fr. C.

15 GRAMMES.

1907. Chou à grosse côte frangé (*Chou*  
*fraîse de veau*) . . . . . n 30

1908. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

Variété très-cultivée, résistant parfaitement pendant l'hiver  
et donnant une sorte de petite pomme lorsque tous les Choux  
pommés sont épuisés.Chou non pommé frisé (*Kale*) :

1909. grand rouge . . . . . n 30

1910. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1911. — vert . . . . . n 30

1912. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1913. nain rouge. . . . . n 30

1914. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1915. — vert . . . . . n 30

1916. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1917. à grosse côte blonde (*Chou Beurre*) n 30

1918. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

Variété très-productive; feuilles grandes, lisses, arrondies,  
d'un blond verdâtre, à côtes larges, pleines et charnues.Chou-fleur (*Cauliflower*) :

1919. + court d'Erfurt . . . . . 1 50

1920. . . . . le kilogr. . . . . 60 "

Variété hâtive, venant bien en tous sols; grande pomme  
blanche, bien faite, d'un grain serré.

1921. + — — Perfection, 5 grammes. 1 50

La plus hâtive des variétés; pied très-court, tête très-  
grosse, très-ferme et très-blanche; sa hauteur ne dépasse  
pas 20 centimètres. Variété excellente pour forcer aussi bien  
que pour pleine terre.

1922. + impérial . . . . . 1 50

1923. . . . . le kilogr. . . . . 60 "

Variété hâtive de premier mérite; grosse pomme à grain  
fin, très-serré.

1924. demi-dur de Hollande . . . . . 1 "

1925. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

1926. — — de Paris . . . . . 1 25

1927. . . . . le kilogr. . . . . 45 "

1928. Géant de Veitch . . . . . 2 "

Excellente variété pour l'automne; pomme très-volumi-  
neuse, plus ferme et plus grosse que celle de toutes les autres  
variétés.

1929. gros hâtif de Hollande . . . . . 1 "

1930. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

1931. — Salomon . . . . . 1 25

1932. . . . . le kilogr. . . . . 45 "

Cette variété est surtout cultivée par les primeuristes.

1933. — tardif de Hollande . . . . . 1 "

1934. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

1935. — — d'Utrecht. . . . . 1 25

1936. . . . . le kilogr. . . . . 45 "

Variété encore peu connue, à pomme très-grosse, résis-  
tant bien aux froids, la plus cultivée par les maraîchers de  
Hollande.

1937. — — Lenormand . . . . . 1 50

1938. . . . . le kilogr. . . . . 60 "

Pomme énorme, grain très-blanc, fin, serré, de très-bonne  
qualité.

1939. — — — à pied court. . . . . 1 50

1940. . . . . le kilogr. . . . . 60 "

Pomme très-grosse, bien formée, résistant assez bien aux  
froids.

Fr. C.

Chou-Brocoli (*Broccoli*): 15 GRAMMES.

1941. blanc hâtif de Hollande. . . . . n 60

1942. . . . . le kilogr. . . . . 20 "

1943. — — superfin . . . . . 1 "

1944. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

Remplace le Chou-fleur au printemps.

1945. — Empereur d'Elletson . . . . . 1 "

1946. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

1947. — Mammouth . . . . . 1 "

1948. . . . . le kilogr. . . . . 33 "

Variété tardive et rustique; grosse pomme blanche, très-  
serrée.Chou-Rave (*Kohlrabi*) à collet hors

de terre :

1949. blanc gros hâtif . . . . . n 30

1950. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1951. — — tardif . . . . . n 30

1952. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1953. violet gros hâtif . . . . . n 30

1954. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1955. — — tardif . . . . . n 30

1956. . . . . le kilogr. . . . . 10 "

1957. Chou-marin (*Sea-Kale*), Crambe . n 40

1958. Belles plantes . . . la douzaine . 4 "

1959. . . . . le cent . . . . . 25 "

Plantes de force à produire immédiatement.

1960. Ciboule commune (*Welsh-Onion*) . n 60

1961. + Clayton perfoliée, Pourpier

d'hiver . le paquet. . . . . n 50

Concombre :

1962. blanc court . . . . . n 40

1963. . . . . le kilogr. . . . . 13 "

1964. — très-long . . . . . n 50

1965. . . . . le kilogr. . . . . 16 "

1966. brodé de Russie (*C. Agourci*) . n 50

Fruit ovale, peau brune, chair fine, excellente.

1967. long vert Gladiator . . . . . n 50

1968. . . . . le kilogr. . . . . 16 "

1969. — — de Chine . . . . . n 40

Variété très-hâtive et très-productive; fruit bien lisse,  
très-long, chair très-ferme, d'excellente qualité.

1970. — — d'Athènes . . . . . n 50

Excellente variété à chair blanche, ferme et fine, d'une  
fécondité extraordinaire.1971. vert hâtif petit (*C. à bouquets*). . n 40

La plus recherchée des variétés pour Cornichons.

1972. . . . . le kilogr. . . . . 13 "

1973. — — de Russie. . . . . n 40

1974. . . . . le kilogr. . . . . 13 "

La plus précoce de toutes les variétés, à fruits ronds, très-  
petits, pour Cornichons.

1975. Serpent . . . . . n 40

Sa forme, ses dimensions et sa couleur foncée font recher-  
cher, comme curiosité, cette variété par les cucurbitomanes.

1976. Duke of Edinburgh, le paquet . . 1 "

Magnifique variété anglaise; fruits d'un mètre de longueur,  
cylindriques, à aiguillons blancs.

1977. Prince of Wales . le paquet . . 1 50

Nouvelle variété à fruits d'un vert foncé, longs, cylin-  
driques, à côtes peu saillantes.

Fr. C.

Concombre : 15 GRAMMES.

1978. Rollisson's Telegraph, *le paquet* . . . 1 "   
 Belle variété anglaise à longs fruits vers d'un excellent goût.

N. B. Ces trois dernières variétés sont les meilleures pour culture forcée.

Courge (*Gourd*) :

1979. à la moelle (*Vegetable Marrow*) . . . 40 "

1980. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 Le fruit, à moitié formé, est employé en guise de Chou-fleur, dont il imite les parties charnues et tendres.

1981. Giraumon turban (*Bonnet turc*) . . . 40 "

1982. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1983. Patisson (*Bonnet d'Electeur*) . . . 40 "

1984. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1985. — panaché . . . . . 50 "

1986. Potiron blanc . . . . . 40 "

1987. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1988. — jaune . . . . . 40 "

1989. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1990. — vert . . . . . 40 "

1991. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1992. sucrière du Brésil . . . . . 40 "

1993. . . . . *le kilogr.* . . . 13 "   
 1994. Échalotte de Gand,

*bulbes, le kilogr.* . . . 2 "

Épinard (*Spinach*) :

1995. + monstrueux de Viroflay,

100 grammes. . . 40 "

1996. . . . . *le kilogr.* . . . 3 "   
 Variété à très-larges feuilles d'un vert foncé, arrondies et très-épaisses.

1997. blond à feuille de laitue,

100 grammes. . . 40 "

1998. . . . . *le kilogr.* . . . 3 "   
 1999. à large feuille, graine piquante,

pour l'été . . . 100 grammes. . . 30 "

2000. . . . . *le kilogr.* . . . 2 50   
 2001. + — — graine ronde, pour l'hiver,

100 grammes . . . 30 "

2002. . . . . *le kilogr.* . . . 2 50   
 Fève de marais (*Beans*) : LE 1/2 KILOGR.

2003. grosse ordinaire . . . . . 75 "

2004. d'Agua-dulce . . . . . 1 50   
 Variété trop peu connue, hâtive et très-productive; très-longues cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur, grains très-gros.

2005. de Séville . . . . . 1 25   
 Variété hâtive et productive; très-longues cosses, grains larges, aplatis.

2006. de Beck . . . . . 1 25   
 Variété hâtive, très-productive et très-recherchée pour la culture de primeur sur coteière ou sur plate-bande abritée; grains verts.

2007. prolifique . . . . . 1 25   
 Variété neuve remarquable par sa précocité et son grand produit, la meilleure pour culture forcée; petits grains jaunâtres.

2008. blanche de Windsor. . . . . 1 "   
 Variété très-productive; cosses très-larges, grains forts, presque ronds.

2009. verte de Windsor . . . . . 1 "   
 Variété très-productive; cosses très-larges, grains presque ronds, pouvant être mangés dans un état plus avancé que ceux des autres sortes.

Haricot à rames sans parchemin  
ou mange-tout (*Kidney Beans*,  
*Runners*) : LE 1/2 KILOGR.

Fr. C.

2010. Beurre d'Alger . . . . . 1 50   
 Variété à grains noirs, à cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

2011. — blanc . . . . . 1 50   
 Excellente variété hâtive et très-productive, dont les cosses peuvent se manger longtemps après la formation des grains.

2012. — à cosse violette (*Fl.*, XVII, 13) 2 "   
 Longues cosses épaisses et charnues; par la cuisson, leur couleur violette tourne au vert.

2013. de Prague blanc (*Coco blanc*) . . . 1 50   
 Excellente variété améliorée; cosses nombreuses et charnues, tout à fait sans parchemin.

2014. — marbré (*Coco rose*) . . . . . 1 25   
 Haricot très-estimé pour être mangé sec; cosses droites, peau un peu épaisse, grains d'un blanc rosé marbré de rouge, très-farineux.

2015. Prédome (*H. Perle*) . . . . . 2 50   
 Sous-variété du Haricot *Princesse*, préférable pour sécher vert et pour conserver.

2016. Princesse de Flandre . . . . . 2 "   
 Variété hâtive et très-productive, *mange-tout* par excellence; cosses très-garnies.

2017. Sabre (*Snij-boon*) (*Swor*d) . . . 2 50   
 Excellente variété à grosses et longues cosses, bonne à manger coupée verte et en grains secs, qui sont très-farineux et presque sans parchemin.

Haricot à rames à parchemin :

(*Kidney Beans*, *Runners*) :

2018. de Soissons . . . . . 1 50   
 Excellent Haricot blanc connu sous le nom de *Haricot de Rome*, l'un des plus estimés pour être mangé sec.

2019. d'Espagne blanc géant . . . . . 1 50   
 2020. — rouge géant (*Scarlet Runner*). 1 50   
 Cosses très-longues et très-larges, disposées en longs racèmes; elles se coupent comme celles du Haricot *Sabre*.

Haricot nain sans parchemin ou

*mange-tout* (*Kidney Beans*, *dwarf*) :

2021. Flageolet blanc (*Hâtif de Laon*) . . 1 50   
 Variété indispensable à tout potager et très-productive; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille.

2022. — à feuille gaufrée. . . . . 1 75   
 Variété très-productive, à cosses légèrement arquées, vertes, très-tendres; très-recommandable pour culture forcée et pour pleine terre.

2023. — d'Etampes . . . . . 2 "   
 Le plus hâtif des *Haricots Flageolets*, très-productif, excellent pour culture de primeur en pleine terre et sur couche.

2024. — jaune . . . . . 1 25   
 Variété très-hâtive, d'un grand mérite, excellente en grains écosés frais.

2025. — vert . . . . . 1 75   
 Variété fort estimée pour être mangée en grains écosés frais; elle diffère des précédentes par la couleur verte de ses grains, qu'elle conserve même à sa maturité.

2026. Beurre blanc . . . . . 1 75   
 Variété à larges cosses, très-recommandable pour chassais et coteière.

2027. Princesse . . . . . 1 75   
 Haricot très-recherché pour sa grande et prompt production; en le plantant à la fin de mai, la récolte en est très-abondante et vient après celle du Haricot à rames *Princesse*; ses grains sont blancs, ronds.

2028. Sabre (*Snij-boon*) . . . . . 2 "   
 Variété très-productive, plus hâtive que le Haricot à rames *Sabre*; à manger coupée verte et en grain sec.



Fr. C.

LE 1/2 KILOGR.

**Haricot nain sans parchemin ou****mange-tout (*Kidney Beans, dwarf*):**

2029. de Chine . . . . . 1 25

Variété productive à grains jaunes; très-bon Haricot écosé frais et en grain sec.

2030. du Canada . . . . . 1 25

Le plus nain et l'un des plus hâtifs des Haricots, très-bon sec et écosé frais; grains d'un jaune soufre.

**Haricot nain à parchemin :**2031. de Bagnolet (*Suisse gris*) . . . . . 1 25

Variété très-productive et l'une des meilleures pour être mangée en gousses vertes; grains droits, d'un noir violacé.

2032. de Belgique . . . . . 1 50

Variété à grains d'un noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2033. de Soissons . . . . . 1 50

Variété très-productive et réunissant toutes les qualités de celle de même nom à rames; grains blancs en forme de rognon.

2034. Suisse blanc . . . . . 1 25

Variété recommandable pour grande culture par ses tiges fortes et dressées; grains blancs, droits, très-bons écosés frais et excellents secs.

**Laitue à couper : 15 GRAMMES.**

2035. frisée mousse . . . . . n 60

Feuilles blanches finement crépues.

2036. — de Californie . . . . . n 75

Variété restant plusieurs semaines avant de monter à graine; feuilles tendres, laciniées, d'un vert jaunâtre.

2037. — de Zélande . . . . . n 75

Variété très-lente à monter et donnant une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.

**Laitue pommée hâtive (*Cabbage-******Lettuce*):**

2038. + jaune de Hollande . . . . . n 60

2039. + Gotte lente à monter . . . . . n 60

Variété presque tout en pomme, montant très-lentement.

2040. + — jaune d'or . . . . . n 75

Variété de beaucoup supérieure à l'ancienne Gotte, excellente pour chassis et pleine terre; pomme dure, feuilles d'un jaune d'or.

2041. + Wheeler's Tom Thumb . . . . . n 75

Variété anglaise à pomme dure, résistant bien aux chaleurs, très-recommandable pour première saison et pour culture forcée.

**Laitue pommée d'été :**

2042. de Perpignan améliorée . . . . . 1 n

Pomme très-ferme, d'une très-longue durée, ne montant que très-difficilement et ne donnant que très-peu de graines.

2043. blonde paresseuse . . . . . n 50

Pomme grosse, très-ferme, aplatie, résistant très-bien aux chaleurs.

2044. — de Berlin . . . . . n 50

Variété rustique et hâtive; pomme ronde, assez grosse, ferme et serrée.

2045. — de Versailles . . . . . n 60

Variété rustique; pomme grosse, prompte à se former, bien fournie et très-tendre.

2046. grosse gantoise . . . . . 1 n

Variété que tous les jardiniers des environs de Gand cultivent, supérieure en volume et en qualité à tout ce que nous connaissons en ce genre.

2047. turque (*L. Mogol*) . . . . . n 60Laitue incomparable, grosse, la plus tardive de toutes, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Fr. C.

**Laitue pommée d'automne : 15 GRAMMES.**

2048. Batavia blonde . . . . . n 50

Bonne variété et l'une des plus volumineuses; pomme peu serrée, très-grosse, en forme de Chou.

2049. Bossin . . . . . n 75

Variété tardive; pomme énorme et peu serrée, la plus grosse de toutes les Laitues.

2050. d'Amérique . . . . . n 75

Variété formant une touffe de feuilles serrées, qui, cueillies à la manière du Chou vert, donnent la laitue la plus tendre pendant presque tout l'été.

2051. Chou de Naples . . . . . n 50

Pomme très-grosse, très-ferme, ronde, en forme de Chou.

2052. de Malte . . . . . n 50

Excellente variété, tendre et douce; pomme très-grosse, haute, très-pleine.

**Laitue pommée d'hiver :**

2053. Passion blonde . . . . . n 60

Variété un peu dure et gardant assez bien sa pomme, qui est moyenne et peu serrée.

2054. Morine . . . . . n 50

Variété très-tendre, lente à monter, la meilleure des *Laitues d'hiver*.

2055. Roquette . . . . . n 75

Très-petite, verte marginée de rouge, résistant bien aux froids de l'hiver, spécialement recommandée comme la plus précoce du printemps, excellente pour forcer.

**Laitue romaine (*Cos Lettuce*):**

2056. Kinsholm de Wheeler . . . . . 1 n

Variété remarquable par la grosseur de sa pomme serrée; feuilles lisses, cassantes, d'un blond verdâtre, d'une saveur très-douce.

2057. blonde maraîchère . . . . . n 50

2058. verte maraîchère . . . . . n 50

**Mâche (*Corn Salad*) (*Salade de blé*):**

2059. + ordinaire . . . . . n 25

2060. . . . . le kilogr. . . . . 6 n

2061. + de la Régence (*Grosse Mâche*) . . . . . n 30

2062. . . . . le kilogr. . . . . 10 n

2063. + verte à petite pomme . . . . . n 75

Cette nouvelle variété diffère des autres par sa forme plus ramassée et plus compacte, qui la fait ressembler à une petite pomme.

**Melon, variétés Cantaloup : LE PAQUET.**

2064. d'Alger . . . . . n 25

Écorce d'un vert argente, chair verte, parfumée.

2065. d'Archangel . . . . . n 25

Variété hâtive, très-productive, très-recommandable; chair d'un rouge orangé.

2066. brodé très-hâtif . . . . . n 25

Chair orange, parfumée.

2067. musqué des Indes . . . . . n 75

Variété de grosseur moyenne, exquise, se conservant très-longtemps après être cueillie; écorce très-mince, chair d'un rouge vif, très-parfumée.

2068. noir des Carmes (FLORE, XXI, 55) n 25

Petite variété hâtive; peau d'un vert très-foncé, chair rouge, parfumée.

2069. orange brodé . . . . . n 25

Chair d'un rouge orangé.

2070. de Pierre-Bénite . . . . . n 75

Nouvelle variété hâtive et très-productive, à petits fruits très-aplatis, à côtes bien marquées; chair rouge, d'excellente qualité.

2071. Prescott à fond blanc . . . . . n 25

Chair d'un rouge orangé.

## Fr. C.

**Melon, variétés Cantaloup : LE PAQUET.**

2072. Prescott à fond gris. . . . . " 25  
Chair rouge.  
2073. — hâtif des primeuristes . . . . . " 25  
2074. Victoria . . . . . " 50  
Fruit moyen, rond, écorce mince et argentée, chair rouge, excellente.

**Melon, variétés brodées :**

2075. Ananas . . . . . " 25  
Écorce d'un vert tendre, chair jaune verdâtre, sucrée.  
2076. de Honfleur . . . . . " 25  
Écorce grisâtre, chair d'un rouge orangé.  
2077. grim pant . . . . . " 50  
Variété rustique, excellente.  
2078. maraîcher . . . . . " 25  
Écorce d'un vert grisâtre, chair rouge et jaune.  
2079. Sucrin de Tours . . . . . " 25  
Fruit gros, chair d'un rouge vif, ferme, très-sucrée.  
2080. Orangine de M. Hérault. . . . . " 50  
Fruit rond, écorce grise, lisse, sans côtes, chair d'un rouge orangé, d'un goût délicieux.  
2081. d'eau ou Pastèque, graine noire . . . . . " 25  
2082. — — graine rouge. . . . . " 25

**Navet de table (Turnip) : 30 GRAMMES.**

2083. blanc hâtif Boule de neige . . . . . " 30  
2084. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.  
2085. — — dit Navet de mai . . . . . " 30  
2086. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Racine déprimée, un peu irrégulière, chair blanche et tendre.  
2087. — — plat à feuille entière . . . . . " 30  
2088. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété recommandable pour le potager en raison de sa chair fine et douce, et de sa précocité.  
2089. — demi-long . . . . . " 30  
2090. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Peau d'un blanc jaunâtre, chair blanche, sèche, très-serrée et sucrée.

2091. jaune de Petrowski . . . . . " 75  
Nouvelle variété Russe très-recommandable, ayant la forme de la Betterave rouge plate d'Egypte; chair d'un jaune foncé, d'un goût fin.

2092. — hâtif de Hollande . . . . . " 30  
2093. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété demi-hâtive; chair sèche, serrée, d'un blanc jaunâtre, sucrée.

2094. orange foncé (Boule d'or) . . . . . " 30  
2095. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété très-recommandable pour les derniers semis; peau d'un jaune foncé, chair jaune paille, peu serrée.

2096. rouge plat. . . . . " 30  
2097. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété hâtive; peau rouge, chair blanche, serrée et sucrée.

2098. — — à feuille entière. . . . . " 30  
2099. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente qualité; bulbe moyen, à collet très-fin, de très-bonne garde pendant l'hiver.

**Ognon (Onion) (1) :**

2100. + blanc hâtif. . . . . 1 "   
2101. . . . . le kilogr. . . . . 25 "   
Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente qualité; bulbe moyen, à collet très-fin, de très-bonne garde pendant l'hiver.

## Fr. C.

**Ognon (Onion) :**

30 GRAMMES.

2102. + blanc hâtif petit de Nocera. . . . . 1 25  
2103. . . . . le kilogr. . . . . 30 "   
Variété excessivement précoce; bulbe petit, pour confire.  
2104. + — — — de la Reine. . . . . 1 25  
Le plus hâtif de tous les Oignons, mûrissant en juillet.

2105. jaune paille de Hollande . . . . . 1 "   
2106. . . . . le kilogr. . . . . 25 "   
Excellente variété plate, grosse, très-productive et de bonne garde.

2107. — — de Danver . . . . . 1 25  
2108. . . . . le kilogr. . . . . 30 "   
Variété hâtive et de bonne garde, remarquable par sa qualité et sa précocité; bulbe gros, de couleur jaune cuivre, à collet fin, feuilles petites.

2109. — — des Vertus . . . . . 1 "   
2110. . . . . le kilogr. . . . . 25 "   
Variété assez grosse, remarquable par son produit et sa bonne qualité.

2111. — — plat d'Alost . . . . . 1 25  
2112. . . . . le kilogr. . . . . 30 "   
Variété très-productive, très-grosse et très-employée pour grande culture dans les Flandres; elle se conserve plus longtemps que l'ancienne variété.

2113. — pyriforme . . . . . " 75  
2114. . . . . le kilogr. . . . . 20 "   
Bulbe en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.

2115. rouge clair (Ognon brun) . . . . . " 75  
2116. . . . . le kilogr. . . . . 20 "   
Bulbe très-gros, d'excellente qualité, de bonne garde.

2117. — — de Strasbourg . . . . . 1 "   
2118. . . . . le kilogr. . . . . 25 "   
Variété demi-hâtive, de bon produit.

2119. — sang plat gros (Ognon violet) . . . . . 1 "   
2120. . . . . le kilogr. . . . . 25 "   
Variété demi-hâtive, de longue garde, de bonne grosseur.

2121. — de Madère . . . . . " 75  
2122. . . . . le kilogr. . . . . 20 "   
Variété très-estimée; bulbe très-gros, rond, de saveur sucrée.

**Oseille (Sorrel) : 15 GRAMMES.**

2123. + blonde à large feuille . . . . . 25  
2124. . . . . le kilogr. . . . . 7 "   
2125. + — de Belleville . . . . . " 30  
2126. . . . . le kilogr. . . . . 10 "   
La plus belle et la meilleure de toutes les Oseilles; très-larges feuilles d'une acidité modérée.

2127. Patience, Épinard perpétuel . . . . . " 25  
2128. . . . . le kilogr. . . . . 7 "   
2129. Panais (Parsnip) rond hâtif . . . . . " 25  
2130. . . . . le kilogr. . . . . 4 "   
Variété à grosse racine charnue, que l'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

**Persil (Parsley) :**

2131. à feuille triplement frisée . . . . . " 25  
2132. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
2133. à grosse racine . . . . . " 25  
2134. . . . . le kilogr. . . . . 5 "   
Variété à grosse racine charnue, que l'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

(1) Nous considérons l'année 1880 comme l'une des plus mauvaises que nous ayons eues depuis très-longtemps pour

les graines d'Oignons, Laitues et Chicorées; bien que nous majorions nos prix, nous pouvons nous féliciter de la marchandise que nous offrons ici, et qui ne laisse rien à désirer.



	Fr. C.
<b>Persil (<i>Parsley</i>):</b>	15 GRAMMES.
2135. frisé nain . . . . .	" 25
2136. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	6 "
Remarquable par la finesse de ses feuilles.	
2137. — — mousse . . . . .	" 30
2138. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	10 "
Charmante variété tellement frisée que ses feuilles ressemblent à de la mousse.	
2139. — à feuille de Fougère. . . . .	" 40
2140. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	13 "
Variété trapue, précieuse non-seulement pour le jardin potager, mais aussi pour la formation des corbeilles.	
2141. ordinaire . . . . .	" 25
2142. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "

	Fr. C.
<b>Pissenlit (<i>Dandelion</i>):</b>	15 GRAMMES.
2143. + à large feuille . . . . .	" 75
2144. + — — à cœur plein . . . . .	1 "
Graines récoltées sur des plantes améliorées par la culture, et qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines prises sur le Pissenlit des prairies.	
<b>Poirée (<i>Leaf Beet</i>):</b>	
2145. à cardes . . . . .	" 25
2146. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	4 "
Les côtes, blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.	
2147. + blonde ( <i>Waarmoes</i> ) . . . . .	" 25
2148. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	4 "
Feuilles blondes, charnues et succulentes, qu'on emploie en guise de Pourpier et d'Epinard.	

## POIS (*PEAS*).

Les variétés sont classées dans chaque série par ordre de précocité; leur hauteur approximative est indiquée à la suite du nom.

### Pois mange-tout (*SUGAR PEAS*). LE 1/2 KILOGR.

	Fr. C.
2149. Nain à bordures (25 centimètres) . . . . .	3 "
2150. de Hollande (1 mètre 15 centimètres) . . . . .	1 75
Variété très-hâtive, d'une production extraordinaire; cosses renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ronds, très-serrés.	
2151. Ridé demi-nain (60 centimètres) . . . . .	2 "
Variété demi-hâtive, très-productive; cosses renfermant 7 à 8 grains blancs, ridés, sucrés. C'est le seul <i>Pois mange-tout</i> à grains ridés; le semer en plein soleil.	
2152. à grain vert (80 centimètres) . . . . .	1 75
Variété demi-hâtive, productive et très-recommandable; grandes cosses renfermant 7 à 8 grains verts, ronds.	
2153. Corne de Bélier (1 mètre 60 centimètres). . . . .	2 "
Variété tardive, productive et rustique; cosses grandes, droites et légèrement crochues, renfermant 6 à 8 grains blancs, ronds, sucrés, de première qualité.	

## Pois à écosser.

### 1° A forcer (*FORCING PEAS*).

	Fr. C.
2154. Très-nain à châssis ( <i>Nain de Bretagne</i> ) (30 centimètres) . . . . .	1 25
Variété productive se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados au pied des espaliers; cosses renfermant 6 grains blancs, ronds.	
2155. Little Gem ( <i>Petit bijou</i> ) ( <i>Maclean</i> ) (35 centimètres) . . . . .	2 "
Variété précieuse, productive et très-précoce; cosses renfermant 5 à 7 grains verdâtres, très-sucrés, d'un goût excellent.	
2156. Maclean's Blue Peter (30 centimètres) . . . . .	2 "
Variété précoce, très-productive et d'excellente qualité; cosses renfermant 7 à 8 grains verts, ronds.	
2157. Évêque (60 centimètres) . . . . .	1 25
Variété hâtive et très-productive, excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ; cosses renfermant 7 à 8 grains blancs, ronds.	

## 2° Pois de première saison, hâtifs (EARLY PEAS).

LE 1/2 KILOGR.

Fr. C.

2158. **Uniflore de Gendbrugge** (*Prince Albert*) (90 centimètres) . . . . . 1 25  
Variété remarquable par sa précocité; cosses renfermant 6 à 7 grains d'un blanc verdâtre, d'un goût très-fin.
2159. **Caractacus** (75 centimètres) . . . . . 1 25  
Variété très-productive, très-recommandable pour culture maraîchère; cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ronds.
2160. **Bleu de Carter** (75 centimètres) . . . . . 1 50  
Variété précieuse, très-productive, de bonne qualité; cosses renfermant 6 à 7 grains verts, ronds.
2161. **Dr Maclean** (80 centimètres) . . . . . 1 75  
Nouvelle variété très-productive; cosses droites, renfermant jusqu'à 8 grains ridés, verts, d'une saveur délicieuse.
2162. **Laxton's Alpha** (90 centimètres) . . . . . 2 "  
Variété très-productive et précoce; cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ridés, sucrés.
2163. **Advancer** (*Maclean*) (75 centimètres) . . . . . 1 50  
Variété très-productive et précoce; cosses très-longues, renfermant 8 grains ridés, verts, de qualité parfaite.
2164. **Carter's Challenger** (75 centimètres). . . . . 100 grammes . . . . . 1 "  
Nouvelle variété anglaise très-recommandable et productive; cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ridés.

## 3° Pois de seconde saison (de succession).

(PEAS SECOND CROP.)

2165. **Léopold II** (1 mètre 50 centimètres) . . . . . 1 50  
Excellente variété très-productive; très-large et longues cosses renfermant 9 à 10 grains blancs, ronds, de très-bonne qualité.
2166. **Biflore de Gendbrugge** (*Michaux*) (1 mètre 25 centimètres) . . . . . 1 25  
La meilleure variété pour semis de seconde saison et celle de prédilection de nos maraîchers; cosses renfermant 7 grains blancs, ronds, excellents.
2167. **Laxton's Prolific** (70 centimètres) . . . . . 1 50  
Variété très-recommandable et productive; cosses très-longues, recourbées, renfermant jusqu'à 10 grains ronds.
2168. **Auvergne** (*Serpette*) (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 1 25  
Variété très-productive en tout sol; cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, renfermant 9 à 10 grains blancs, excellents.
2169. **Auvergne à grain vert** (1 mètre 75 centimètres). . . . . 1 50  
Variété améliorée de la précédente, plus productive encore; grandes cosses crochues, renfermant jusqu'à 8 grains verts, très-gros.
2170. **Carter's Telephone** (1 mètre 60 centimètres). . . . . 100 grammes . . . . . 1 25  
Excellente nouveauté anglaise très-productive, vigoureuse et d'excellente qualité; cosses très-large et longues, renfermant jusqu'à 10 grains verts, ridés, très-gros.
2171. **Fillbasket** (1 mètre) . . . . . 1 50  
Variété excessivement productive; grandes et longues cosses d'un vert clair, crochues, renfermant 8 à 10 grains verts, ronds.
2172. **Vert nain champêtre** (*Vert nain du Cap*) (70 centimètres). . . . . 1 "  
Variété de grand rapport, précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons; cosses renfermant 6 à 8 grains ronds, d'un vert bleuâtre.



## 4° Pois de troisième saison, tardifs (LATE PEAS).

LE 1/2 KILOGR.

Fr. C.

2173. **Culverwell's Telegraf** (1 mètre 30 centimètres) . . . . . 100 grammes. . . . . 1 25  
Nouvelle variété anglaise très-productive; grandes cosses renfermant 8 à 10 grains  
gros, verts, ridés, d'excellente qualité.
2174. **Excelsior** (1 mètre 60 centimètres). . . . . 1 25  
Excellente variété de grand produit; grandes cosses renfermant 8 à 10 grains  
blancs, ronds et tendres jusque près de la maturité.
2175. **Champion de Fairbeard** (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 2 "  
Variété assez productive, remarquable par son excellente qualité; cosses énormes  
renfermant 8 à 9 grains verts, très-gros, ridés.
2176. **Vert normand** (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 1 25  
L'une des variétés les plus méritantes; en grain sec, elle est fort usitée comme  
Pois à purée, et en vert, elle est employée de préférence pour les conserves.
2177. **Ridé grand** (1 mètre 80 centimètres) . . . . . 1 75  
Variété très-productive, l'une des meilleures pour manger en vert, nullement  
exigeante sur la nature du terrain; grandes cosses renfermant 6 à 8 grains  
blancs, ridés, très-sucrés.
2178. **Vert ridé grand** (1 mètre 75 centimètres). . . . . 1 50  
Variété très-productive; grandes cosses renfermant 8 grains verts, gros, ridés,  
sucrés et moelleux.
2179. **Ridé demi-nain** (75 centimètres) . . . . . 1 75  
Variété de grand rapport; cosses renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ridés, de  
première qualité en vert.
2180. **Vert ridé demi-nain** (75 centimètres). . . . . 1 75  
Variété très-recommandable; cosses renfermant 8 grains très-gros, tendres et  
sucrés, d'un vert foncé à la maturité.
2181. **Mammoth (Roi de moelle)** (1 mètre 75 centimètres). . . . . 2 "  
Variété remarquable par son produit et sa qualité; très-grandes cosses renfermant  
jusqu'à 8 grains verts, gros, ridés, sucrés jusqu'à parfaite maturité.
2182. **Clamart de Flandre** (1 mètre 75 centimètres) . . . . . 1 50  
Variété très-productive; longues cosses renfermant 8 à 9 grains blancs, ronds,  
très-sucrés jusqu'à parfaite maturité.

**Porreau (Leek) :**

Fr. C.

2183. d'été petit du Brabant. . . . . " 40  
2184. . . . . le kilogr. . . . . 8 "  
Semer clair en place, au premier printemps.
2185. d'hiver gros du Brabant. . . . . " 50  
2186. . . . . le kilogr. . . . . 12 "  
Cette variété est très-rustique, très-grosse et très-appreciée  
pour grande culture dans les Flandres.
2187. — gros court monstrueux de Rouen " 75  
2188. . . . . le kilogr. . . . . 15 "  
Remarquable par la grosseur de sa tige et l'épaisseur de  
ses feuilles.
2189. — monstrueux de Carentan. . . . . 1 "  
2190. . . . . le kilogr. . . . . 25 "  
Le plus volumineux de tous les Porreaux, très-rustique,  
tout particulièrement recommandable.
2191. jaune du Poitou. . . . . " 75  
Tige assez grosse, feuilles blondes.

**Pourpier (Purslain) :**

2192. doré à large feuille. . . . . " 50  
2193. . . . . le kilogr. . . . . 12 "  
**Radis hâtif (1<sup>re</sup> saison) (Radish) :**
2194. + blanc rond . . . . . " 40  
2195. . . . . le kilogr. . . . . 7 "

**Radis hâtif (1<sup>re</sup> saison) (Radish) :**

F. C.

2196. + blanc demi-long . . . . . " 30  
2197. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2198. + rose demi-long . . . . . " 30  
2199. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2200. + — — — à bout blanc. . . . . " 40  
2201. . . . . le kilogr. . . . . 7 "  
2202. + — rond . . . . . " 30  
2203. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2204. + — — à bout blanc. . . . . " 40  
2205. . . . . le kilogr. . . . . 7 "  
2206. + violet rond . . . . . " 30  
2207. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2208. + — demi-long à bout blanc . . . . . " 60

**Radis d'été (2<sup>e</sup> saison) :**

2209. blanc rond plat . . . . . " 30  
2210. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2211. gris rond . . . . . " 30  
2212. . . . . le kilogr. . . . . 5 "  
2213. jaune ovale . . . . . " 30  
2214. . . . . le kilogr. . . . . 5 "

Radis d'automne (3 <sup>e</sup> saison) :	Fr. C.
2215. blanc d'Augsbourg . . . . .	" 30
2216. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "
Très-belle variété à racine fusiforme, peau peu rugueuse, chair serrée, de saveur très-piquante.	
2217. rose de Chine. . . . .	" 40
2218. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	7 "

Radis d'hiver (4 <sup>e</sup> saison) ( <i>Black Spanish Radish</i> ) :	
2219. noir long . . . . .	" 30
2220. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "
2221. — rond . . . . .	" 30
2222. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "

Rave ( <i>Long Radish</i> ) :	
2223. blanche à collet violet . . . . .	" 30
2224. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "
2225. rose . . . . .	" 30
2226. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "
2227. violette. . . . .	" 30
2228. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	5 "

Les Raves, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et succulentes, se développent rapidement.

Rhubarbe :	LE PAQUET.
2229. Crimson Perfection . . . . .	" 25
2230. Hawke's Champagne . . . . .	" 25
2231. Johnston's Saint-Martin . . . . .	" 25
2232. Linnæus . . . . .	" 25
2233. Victoria . . . . .	" 25

La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers du continent; en Angleterre, les jeunes pétioles constituent un légume estimé dont la consommation est considérable.

Scorsonère :	Fr. C.
2234. blanc ( <i>Salsifs</i> ). . . . .	100 grammes . 2 "
2235. noir. . . . .	100 " . 1 25
2236. Tétragone, Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . .	15 grammes . " 30
2237. . . . . <i>le kilogr.</i> . . . .	10 "
La Tétragone remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs de l'été.	

Tomate ( <i>Tomato</i> ) :	
2238. à grappes ( <i>T. Groseille</i> ). . . . .	" 30
Grappes de très-bons fruits d'un rouge vif.	
2239. Carter's Green Gage. . . . .	" 40
Très-belle nouveauté à fruits jaunes, ronds; peau très-fine, chair excellente.	
2240. énorme à fruit lisse . . . . .	" 50
Variété remarquable par la beauté et la grosseur de ses fruits qui sont sans côtes, à chair rouge et tout à fait pleins.	
2241. grosse rouge . . . . .	" 25
2242. Little Gem . . . . .	" 50
Variété d'une grande précocité; fruits de la grosseur d'une Prune Reine-Claude, d'excellente qualité.	
2243. rouge naine hâtive . . . . .	" 30
Bonne variété précoce et productive; fruits de grosseur moyenne, rouges, pleins, assez unis.	
2244. Le trophée . . . . .	" 30
La plus belle des Tomates; fruits rouges, ronds, lisses, bien faits, d'un goût excellent.	
2245. violette ( <i>Belle de Leuville</i> ) . . . . .	" 40
Beaux fruits très-charnus, d'un vermillon violacé.	
2246. Vick's Criterion . . . . .	" 60

## GRAINES DE PLANTES UTILISÉES COMME CONDIMENTS OU ASSAISONNEMENTS.

	Fr. C.
2247. Ail ( <i>bulbes</i> ) . . . . .	LE 1/2 KILOGR. . . . . 2 "
2248. Alkekonge à fruit doux . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . . " 25
2249. Aneth. . . . .	" . . . . . " 25
2250. Angélique de Niort. . . . .	" . . . . . " 25
2251. Anis . . . . .	" . . . . . " 25
2252. Aubergine blanche longue . . . . .	" . . . . . " 25
2253. — violette longue . . . . .	" . . . . . " 25
2254. Basilic fin vert . . . . .	" . . . . . " 25
2255. — — violet . . . . .	" . . . . . " 25
2256. Cerfeuil musqué. . . . .	" . . . . . " 25
2257. Chenille petite ( <i>Attrapes, Surprises</i> ). . . . .	" . . . . . " 25
2258. — grosse( — — ) . . . . .	" . . . . . " 25
2259. Ciboulette . . . . .	12 plantes . . . . . 1 "
2260. Citronnelle ( <i>Mélisse</i> ) . . . . .	<i>le paquet</i> . . . . . " 25
2261. Cresson alénois doré . . . . .	15 grammes . . . . . " 25
2262. — — frisé . . . . .	" . . . . . " 25
2263. — de fontaine . . . . .	" . . . . . " 75
2264. Estragon. . . . .	<i>la plante</i> . . . . . " 50
2265. Fenouil doux long. . . . .	<i>le paquet</i> . . . . . " 25
2266. — de Florence . . . . .	" . . . . . " 25
2267. Hérisson ( <i>Attrapes, Surprises</i> ) . . . . .	" . . . . . " 25
2268. Hysope . . . . .	" . . . . . " 25
2269. Lavande . . . . .	" . . . . . " 25
2270. Limaçon ( <i>Attrapes, Surprises</i> ) . . . . .	" . . . . . " 25
2271. Livèche . . . . .	" . . . . . " 25
2272. Marjolaine . . . . .	" . . . . . " 25



			Fr C.
2273.	Montarde blanche . . . . .	15 grammes . . . . .	n 25
2274.	— noire . . . . .	" . . . . .	n 25
2275.	Origan . . . . .	la plante . . . . .	n 50
2276.	Piment cerise . . . . .	la paquet . . . . .	n 25
2277.	— gros carré doux . . . . .	" . . . . .	n 25
2278.	— jaune . . . . .	" . . . . .	n 25
2279.	— monstrueux . . . . .	" . . . . .	n 25
2280.	Pimpernelle petite . . . . .	15 grammes . . . . .	n 25
2281.	Raifort . . . . .	la plante . . . . .	n 25
2282.	Romarin . . . . .	le paquet . . . . .	n 40
2283.	Sarriette annuelle . . . . .	" . . . . .	n 25
2284.	— vivace . . . . .	" . . . . .	n 25
2285.	Sauge . . . . .	" . . . . .	n 25
2286.	Thym . . . . .	" . . . . .	n 25
2287.	Vers ( <i>Attrapes, Surprises</i> ) . . . . .	" . . . . .	n 25

## GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. Le chiffre placé à la suite du N° Indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.

			1 hectogr. 1 kilogr.	Fr. C.	Fr. C.
2288.	5 kilogr.	Betterave blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert . . . . .	n 30		2 50
2289.	5 "	— — — à collet rose . . . . .	n 30		2 50
2290.	5 "	— — longue à collet vert . . . . .	n 30		2 50
2291.	5 "	— — jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre . . . . .	n 30		2 50
2292.	5 "	— — des Barres . . . . .	n 30		2 50
2293.	5 "	— — grosse ronde . . . . .	n 30		2 50
2294.	5 "	— — rouge de Hollande, très-longue, à feuilles nom- breuses, collet hors de terre . . . . .	n 30		2 50
2295.	5 "	— — disette . . . . .	n 30		2 50
2296.	5 "	— — grosse ronde, énorme . . . . .	n 30		2 50
2297.	5 "	Carotte blanche très-grosse, à collet vert . . . . .	n 40		3 50
2298.	5 "	— — jaune, à collet vert . . . . .	n 50		4 50
2299.	5 "	— — rouge pâle longue de Flandre . . . . .	n 50		4 50
2300.	5 "	— — — à collet vert . . . . .	n 60		5 "
2301.	7 "	Chicorée de Flandre . . . . .	n 75		6 "
		Variété perfectionnée de la Chicorée ordinaire; racine cylindrique, régulièrement grosse et lisse.			
2302.	7 "	— — de Magdebourg . . . . .	n 75		6 "
		Belle variété à très-longue racine lisse, à large feuille entière et droite.			
2303.	7 "	— — de Brunswick . . . . .	n 75		6 "
		Variété très-recherchée pour la fabrication de la Chicorée à café.			
2304.	1 "	Chou non pommé branchu du Poitou, Chou à mille-têtes. . . . .	n 60		5 "
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.			
2305.	1 "	— — Cavalier, grand Chou à fourrage. . . . .	n 50		4 "
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.			
2306.	1 "	— — de Flandre . . . . .	n 75		5 "
		Ne diffère du précédent que par les nervures rouges de ses feuilles et par sa plus grande résistance au froid.			
2307.	1 "	— — moellier vert . . . . .	n 75		6 "
		Le tronc, qui devient très-gros, se donne, découpé par tran- ches, aux bêtes à cornes qui en sont très-friandes.			

				1 hectogr. 1 kilogr.
				Fr. C. Fr. C.
2308.	4 kilogr.	<b>Chou-Navet</b> Rutabaga blanc gros de Suède . . . . .	n 50	4 "
2309.	4 "	— — à collet rouge . . . . .	n 60	5 "
2310.	10 "	<b>Lotier</b> corniculé . . . . .	n "	6 "
Excellente plante fourragère pour les prés élevés, résistant parfaitement à la sécheresse.				
2311.	10 "	— velu . . . . .	n "	4 "
Très-bon fourrage pour terrains humides, entrant abondamment dans les mélanges pour prairies fraîches.				
2312.	15 "	<b>Lupuline</b> , <i>Minette dorée</i> , <i>Trèfle noir</i> . . . . .	n "	1 25
La <i>Lupuline</i> réussit bien dans les terrains médiocres, est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des mélanges pour prés à faucher et pour pâturages.				
2313.	20 "	<b>Luzerne</b> de Provence . . . . .	n "	3 50
Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans les sols secs. La durée d'une luzernière est presque indéfinie.				
2314.	20 "	— du Poitou . . . . .	n "	3 "
2315.	80 "	<b>Maïs</b> blanc hâtif . . . . .	n 40	2 "
2316.	100 "	— — dent de cheval . . . . .	n 40	2 "
2317.	80 "	— jaune hâtif . . . . .	n 40	2 "
2318.	65 "	— — quarantain . . . . .	n 40	2 "
2319.	80 "	— rouge . . . . .	n 40	2 "
2320.	3 "	<b>Navet</b> blanc long pour bétail. . . . .	n 50	4 "
2321.	3 "	— — — à collet rouge . . . . .	n 50	4 "
2322.	3 "	— — rond . . . . .	n 50	4 "
2323.	3 "	— — — à collet rouge . . . . .	n 50	4 "
2324.	3 "	— jaune d'Allemagne. . . . .	n 60	5 "
Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.				
2325.	6 "	<b>Panais</b> long de Flandre . . . . .	n 40	3 "
2326.	6 "	— — de Guernesey . . . . .	n 40	3 "
<b>Rutabaga</b> , voir <i>Chou-Navet</i> , ci-devant.				
2327.	25 "	<b>Serradelle</b> . . . . .	n "	1 50
Précieux fourrage d'été, excellent à enfouir vert pour engrais et ne se plaisant que dans les terrains secs.				
2328.	15 "	<b>Spergule</b> commune . . . . .	n "	1 "
2329.	15 "	— géante . . . . .	n "	1 50
Espèce supérieure à la <i>Spergule commune</i> comme fourrage et engrais vert.				
2330.	12 "	<b>Trèfle</b> blanc . . . . .	n 40	3 50
Rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour améliorer les pâturages.				
2331.	20 "	— incarnat . . . . .	n "	2 75
Fourrage annuel très-précoce qu'on sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de <i>Trèfle ordinaire</i> , quand celui-ci à été détruit par la gelée.				
2332.	15 "	— violet, <i>Trèfle ordinaire</i> . . . . .	n "	3 "

N. B. Les prix des articles *Lupuline*, *Luzerne*, *Trèfles blanc*, *incarnat* et *violet* sont variables.

Pour de fortes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.



## GRAINES DE TABAC.

25 centimes le paquet de chaque sorte.

2333. d'Amersfort. — 2334. de Saint-Domingue. — 2335. de la Havane. — 2336. de l'Himalaya.  
— 2337. de la Jamaïque. — 2338. du Maryland. — 2339. de Virginie. — 2340. du Connec-  
ticut. — 2341. de Manille. — 2342. de la Plata.

## GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. Le chiffre placé à la suite du N° indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

			1 kilogr.	100 kilogr.
			Fr. C.	Fr. C.
2343.	10 kilogr.	<b>Agrostis traçante</b> ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) . . . . .	1 50	140 "
2344.	12 "	— <b>commune</b> ( <i>Agrostis vulgaris</i> ) . . . . .	1 50	140 "
		Deux espèces pour pâturages et pour fond de prés à faucher; elles réussissent dans les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.		
2345.	20 "	<b>Alpiste</b> ( <i>Phalaris canariensis</i> ) . . . . .	1 "	90 "
2346.	20 "	— <b>roseau</b> ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) . . . . .	4 "	" "
		Plante fourragère très-élevée, d'une grande production dans les terrains marécageux, méritant l'attention des agriculteurs.		
2347.	50 "	<b>Brôme des prés</b> ( <i>Bromus pratensis</i> ) . . . . .	1 25	115 "
		Excellent foin fournissant une bonne pâture et devenant fauchable, même dans les terres trop médiocres pour produire tout autre fourrage.		
2348.	40 "	— <b>mon</b> ( <i>Bromus mollis</i> ) . . . . .	1 "	90 "
		Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
2349.	25 "	<b>Canche élevée</b> ( <i>Aira cæspitosa</i> ) . . . . .	1 "	90 "
		Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
2350.	25 "	— <b>flexueuse</b> ou <b>des montagnes</b> ( <i>Aira flexuosa</i> ) . . . . .	1 "	90 "
		Espèce aimant les lieux secs et élevés, où elle forme de bons pâturages.		
2351.	25 "	<b>Crételle des prés</b> ( <i>Cynosurus cristatus</i> ) . . . . .	2 75	250 "
		La plus fine des graminées pour pelouses et bordures.		
2352.	40 "	<b>Dactyle pelotoné</b> ( <i>Dactylis glomerata</i> ) . . . . .	2 "	175 "
		Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille, peu difficile sur la nature du sol.		
2353.	50 "	<b>Fétuque élevée</b> ( <i>Festuca elatior</i> ) . . . . .	2 "	180 "
2354.	60 "	— <b>des prés</b> ( <i>Festuca pratensis</i> ) . . . . .	2 "	180 "
		Ces deux Fétuques forment la base naturelle des bonnes prairies; elles entrent dans nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.		
2355.	50 "	— <b>durette</b> ( <i>Festuca duriuscula</i> ) . . . . .	1 25	115 "
		Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terrains secs; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		

			1 kilogr.	100 kilogr.
			Fr. C.	Fr. C.
2356.	40 kilogr.	<b>Fétuque hétérophylle</b> ( <i>Festuca heterophylla</i> ) . . . . .	1 25	115 "
		Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'un beau vert; c'est aussi une excellente espèce pour pâturage.		
2357.	40 "	— <b>rouge traçante</b> ( <i>Festuca rubra</i> ) . . . . .	1 25	115 "
		Espèce extrêmement tenace, excellente pour pelouses de jardins, bordures et talus secs.		
2358.	30 "	— <b>ovine</b> ( <i>Festuca ovina</i> ). . . . .	1 25	115 "
		Excellente graminée pour pâturages et petites pelouses, dans les terres arides, sableuses et crayeuses.		
2359.	10 "	<b>Fléole des prés Timothy</b> ( <i>Phleum pratense</i> ). . . . .	1 50	125 "
		Cette graminée, d'un produit considérable, se rencontre naturellement dans toutes les bonnes prairies; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		
2360.	40 "	<b>Flouve odorante</b> ( <i>Anthoxanthum odoratum</i> ) . . . . .	2 "	175 "
		On trouve cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilogrammes pour %, mêlés au semis, donnent au foin et au regain un parfum très-agréable.		
2361.	100 "	<b>Fromental</b> ( <i>Avena elatior</i> ) ( <b>Rye Grass français</b> ) . . . . .	2 "	175 "
		La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes, dans les sols un peu frais.		
2362.	25 "	<b>Houque laineuse</b> ( <i>Holcus lanatus</i> ) . . . . .	1 "	90 "
		Bon fourrage pour tous les animaux, venant de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
2363.	10 "	<b>Millet ordinaire</b> ( <i>Panicum miliaceum</i> ). . . . .	1 25	" "
		Le Millet donne, en été, un fourrage assez abondant; sa graine est recherchée par la volaille.		
2364.	18 "	<b>Paturin commun</b> ( <i>Poa trivialis</i> ) . . . . .	2 "	180 "
		Herbe fourragère très-précoce, se développant naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.		
2365.	20 "	— <b>des bois</b> ( <i>Poa nemoralis</i> ). . . . .	2 "	180 "
		Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
2366.	20 "	— <b>des prés</b> ( <i>Poa pratensis</i> ) . . . . .	2 "	180 "
		Graminée très-recommandable pour les prés bas, précoce et mûrissant promptement.		
2367.	75 "	<b>Rye Grass d'Ecosse</b> ( <i>Lolium perenne</i> ) ( <b>Gazon anglais</b> ). Ivraie vivace, excellente pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse.		
		1 <sup>r</sup> choix, graine extra-purifiée. . . . .	1 15	100 "
		2 <sup>e</sup> — — très-bonne . . . . .	1 "	90 "
2368.	60 "	— — <b>superfin de Percy</b> ( <i>Lolium perenne tenue</i> ) . . . . .	1 25	115 "
		Ivraie très-fine, très-courte et spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.		
2369.	80 "	— — <b>d'Italie</b> ( <i>Lolium italicum</i> ). . . . .	1 25	115 "
		Plus élevée et plus verte que le <i>Rye Grass d'Ecosse</i> , cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; elle donne un fourrage très-abondant.		
		N. B. Ces trois <i>Ivraies</i> , la première et la deuxième surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser grainer.		
2370.	25 "	<b>Vulpin des prés</b> ( <i>Alopecurus pratensis</i> ). . . . .	2 25	200 "
		Graminée considérée, dans nos pays septentrionaux, comme l'une des plus précieuses pour les sols humides.		



L'Etablissement se charge de composer des mélanges de graminées de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues par la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer si le terrain est argilleux, calcaire ou siliceux; s'il est habituellement humide ou bien s'il est sec ou aride.

1 kilogramme.	. . . . .	fr.	1 25
25	» . . . . .	»	30 »
100	» . . . . .	»	115 »

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A-B-C-D, et 1 kilogr. par are du mélange E.

- A. Mélange pour prairie permanente à faucher.  
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

- C. Mélange pour pâturage.  
D. — — pelouse de jardin.  
E. — — — fine de jardinets, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordure de chemins, etc.; le kilogr. : 2 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

## GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen.*

		Fr. C.
2371.	<i>Abies alba</i> ( <i>Picea</i> ) ( <i>Sapinette blanche</i> ) . . . . .	le paquet . . . . . 50
2372.	— <i>amabilis</i> . . . . .	» . . . . . 2 »
2373.	— <i>Brunoniana</i> ( <i>A. dumosa</i> ) ( <i>Tsuga</i> ) . . . . .	» . . . . . 50
2374.	— <i>canadensis</i> ( <i>Tsuga</i> ) . . . . .	» . . . . . 50
2375.	— <i>cephalonica</i> ( <i>A. Apollinis</i> ) . . . . .	» . . . . . 75
2376.	— <i>concolor</i> . . . . .	» . . . . . 2 »
2377.	— <i>Douglasi</i> ( <i>Pseudotsuga</i> ) . . . . .	» . . . . . 50
2378.	— <i>Fraseri</i> . . . . .	» . . . . . 75
2379.	— <i>grandis</i> ( <i>A. lasiocarpa</i> ) . . . . .	» . . . . . 2 »
2380.	— <i>Hookeriana</i> ( <i>A. Pattoni</i> ) ( <i>Tsuga</i> ) . . . . .	» . . . . . 1 50
2381.	— <i>Kutrow</i> ( <i>A. Morinda</i> ) . . . . .	» . . . . . 1 »
2382.	— <i>Menziesi</i> ( <i>Picea</i> ) . . . . .	» . . . . . 1 75
2383.	— <i>nigra</i> ( <i>Picea</i> ) . . . . .	» . . . . . 75
2384.	— <i>nobilis</i> . . . . .	» . . . . . 2 »
2385.	— <i>Nordmanniana</i> . . . . .	» . . . . . 50
2386.	— <i>orientalis</i> ( <i>Picea</i> ) . . . . .	» . . . . . 30
2387.	— <i>Pinsapo</i> . . . . .	» . . . . . 60
2388.	— <i>rubra</i> ( <i>Picea</i> ) . . . . .	» . . . . . 75
2389.	— <i>sibirica</i> ( <i>A. Pichta</i> ) . . . . .	» . . . . . 50
2390.	<i>Acer campestre</i> ( <i>Erable champêtre</i> ) . . . . .	100 grammes . . . . . 50
2391.	— <i>Negundo</i> ( <i>Er. à feuille de Frêne</i> ) . . . . .	100 » . . . . . 60

2392.	<i>Acer Pseudo-Platanus</i> ( <i>Er. Sycomore</i> ) . . . . .	100 grammes . . . . .	n 50
2393.	— — — <i>purpurascens</i> . . . . .	100 " . . . . .	1 " n
2394.	<i>Arbutus Unedo</i> ( <i>Arbousier commun</i> ). . . . .	25 " . . . . .	n 75
2395.	<i>Azalea mollis</i> en superbe mélange . . . . .	le paquet . . . . .	1 50
2396.	<i>Azalées rustiques de Gand</i> en très-beau mélange . . . . .	" . . . . .	n 60
2397.		25 grammes . . . . .	6 " n
2398.	<i>Bignonia radicans</i> ( <i>Tecoma</i> ) . . . . .	5 " . . . . .	1 " n
2399.	— <i>Tweediana</i> , de serre chaude . . . . .	5 " . . . . .	1 25
2400.	<i>Biota orientalis aurea</i> ( <i>Thuia</i> ) . . . . .	le paquet . . . . .	1 " n
2401.	— — — <i>compacta</i> . . . . .	" . . . . .	n 75
2402.	— — — <i>falcata</i> . . . . .	" . . . . .	1 " n
2403.	— — — <i>filiformis</i> ( <i>pendula</i> ). . . . .	" . . . . .	1 " n
2404.	— — — <i>meldensis</i> . . . . .	" . . . . .	n 75
2405.	— — — <i>tatarica</i> . . . . .	" . . . . .	n 40
2406.	<i>Broussonetia papyrifera</i> ( <i>Mârier à papier</i> ) . . . . .	25 grammes . . . . .	1 50
2407.	<i>Buddleia curviflora</i> ( <i>B. de Sibérie</i> ) . . . . .	le paquet . . . . .	n 50
2408.	<i>Callitris quadrivalvis</i> ( <i>Thuia articulata</i> ) . . . . .	10 grammes . . . . .	1 25
2409.	<i>Calycanthus floridus</i> ( <i>Chimonanthe fleurie</i> ). . . . .	25 " . . . . .	2 50
2410.	— — — <i>occidentalis</i> ( <i>macrophyllus</i> ) . . . . .	25 " . . . . .	3 " n
2411.	— — — <i>præcox</i> ( <i>Chimonanthus fragrans</i> ) . . . . .	25 " . . . . .	2 50
2412.	<i>Catalpa Bungeana</i> . . . . .	10 " . . . . .	n 50
2413.	— — — <i>Kämpferi</i> . . . . .	10 " . . . . .	1 50
2414.	— — — <i>syringæfolia</i> ( <i>C. commun</i> ) . . . . .	50 " . . . . .	n 75
2415.	<i>Ceanothus americanus</i> . . . . .	le paquet . . . . .	n 50
2416.	<i>Cedrus atlantica</i> ( <i>Cèdre de l'Atlas</i> ) . . . . .	25 grammes . . . . .	1 50
2417.	— — — <i>argentea</i> . . . . .	25 " . . . . .	2 " n
2418.	— — — <i>libani</i> ( <i>C. du Liban</i> ) . . . . .	25 " . . . . .	1 50
2419.	<i>Cephalotaxus drupacea</i> ( <i>C. Fortunei fœmina</i> ) . . . . .	le paquet . . . . .	1 " n
2420.	— — — <i>Fortunei mascula</i> . . . . .	" . . . . .	n 75
2421.	<i>Cerasus avium</i> ( <i>Merisier</i> ) . . . . .	100 grammes . . . . .	n 40
2422.	— — — <i>Lauro-Cerasus</i> ( <i>Laurier Amandier</i> ). . . . .	100 " . . . . .	n 75
2423.	— — — <i>Mahaleb</i> ( <i>Bois de Sainte-Lucie</i> ). . . . .	100 " . . . . .	n 75
2424.	<i>Cercis Siliquastrum</i> ( <i>Gainier, Arbre de Judée</i> ). . . . .	100 " . . . . .	n 75
2425.	— — — <i>flore albo</i> ( <i>Arbre de Judée à fleurs blanches</i> ) . . . . .	100 " . . . . .	1 25
2426.	<i>Chamaecyparis Blumei</i> . . . . .	le paquet . . . . .	2 " n
2427.	— — — <i>Boursieri</i> ( <i>Cupressus Lawsoni</i> ). . . . .	" . . . . .	n 50
2428.	— — — <i>obtusa</i> ( <i>Retinospora</i> ). . . . .	" . . . . .	1 50
2429.	— — — <i>pisifera</i> ( — ). . . . .	" . . . . .	2 " n
2430.	— — — <i>plumosa</i> ( — ). . . . .	" . . . . .	1 25
2431.	— — — <i>sphæroidea</i> ( <i>thuioides</i> ) . . . . .	" . . . . .	n 40
2432.	— — — <i>glauca</i> ( <i>hevensis</i> ). . . . .	" . . . . .	n 60
2433.	<i>Clematis flammula</i> ( <i>Clématite odorante</i> ). . . . .	25 grammes . . . . .	n 50
2434.	<i>Cratægus Crus galli</i> ( <i>Epine Ergot de coq</i> ) . . . . .	100 " . . . . .	1 15
2435.	— — — <i>pyracantha</i> ( <i>Buisson ardent</i> ) . . . . .	100 " . . . . .	n 60
2436.	— — — <i>sanguinea</i> . . . . .	50 " . . . . .	2 " n
2437.	<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	10 " . . . . .	n 40
2438.	— — — <i>Lobbi</i> . . . . .	le paquet . . . . .	n 50
2439.	— — — <i>pungens</i> . . . . .	" . . . . .	1 50
2440.	— — — <i>viridis</i> . . . . .	" . . . . .	1 25
2441.	<i>Cunninghamia lanceolata</i> ( <i>Araucaria de la Chine</i> ) . . . . .	" . . . . .	n 25
2442.	<i>Cupressus Benthani</i> . . . . .	" . . . . .	n 50
2443.	— — — <i>Bregeoni</i> . . . . .	" . . . . .	n 40
2444.	— — — <i>Corneyana</i> . . . . .	" . . . . .	n 75
2445.	— — — <i>Coulteri</i> . . . . .	" . . . . .	n 60
2446.	— — — <i>expansa</i> . . . . .	" . . . . .	n 25
2447.	— — — <i>fastigiata</i> . . . . .	" . . . . .	n 30
2448.	— — — <i>Goweniana</i> . . . . .	" . . . . .	n 30
2449.	— — — <i>horizontalis</i> . . . . .	" . . . . .	n 25



		Fr. C.
2450.	<i>Cupressus Knightiana</i> ( <i>C. elegans</i> ) . . . . .	le paquet . . . . . " 60
2451.	— <i>Lindleyana</i> . . . . .	" . . . . . " 60
2452.	— <i>Iusitanica</i> ( <i>C. glauca pendula</i> ) . . . . .	" . . . . . " 75
2453.	— <i>Mac Nabiana</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2454.	— <i>macrocarpa</i> ( <i>C. Lambertiana</i> ) . . . . .	" . . . . . " 50
2455.	— <i>sinensis glauca</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2456.	— <i>Tourneforti</i> . . . . .	" . . . . . " 30
2457.	— <i>Whitleyana</i> ( <i>C. Roylei</i> ) . . . . .	" . . . . . " 40
2458.	<i>Cytisus alpinus</i> ( <i>Cytise odorant</i> ) . . . . .	25 grammes . . . . . 1 "
2459.	— <i>Laburnum</i> ( <i>C. Faux-Ebénier</i> ) . . . . .	" . . . . . " 75
2460.	<i>Daboecia polifolia</i> . . . . .	le paquet . . . . . " 50
2461.	— — <i>alba</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2462.	<i>Frenela australis</i> . . . . .	" . . . . . 1 "
2463.	— <i>Gunni</i> . . . . .	" . . . . . 1 75
2464.	<i>Gaultheria Shallon</i> . . . . .	" . . . . . " 40
2465.	<i>Ginkgo biloba</i> ( <i>Salisbieria adiantifolia</i> ) ( <i>Ginkgo du Japon</i> )	10 noir . . . . . " 75
2466.	<i>Hibiscus syriacus</i> ( <i>Kelmie des jardins</i> ) . . . . .	25 grammes . . . . . 1 50
2467.	<i>Ilex Aquifolium</i> ( <i>Houx commun</i> ) . . . . .	50 " . . . . . " 75
2468.	<i>Indigofera Dosua</i> ( <i>Indigotier Dosua</i> ) . . . . .	10 " . . . . . " 75
2469.	<i>Juniperus alpina</i> ( <i>Genévrier</i> ) . . . . .	le paquet . . . . . 1 "
2470.	— <i>chinensis femina</i> ( <i>cernua</i> ) . . . . .	" . . . . . " 30
2471.	— <i>cypa</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2472.	— <i>excelsa</i> . . . . .	" . . . . . " 40
2473.	— <i>japonica</i> . . . . .	" . . . . . " 40
2474.	— <i>macrocarpa</i> . . . . .	" . . . . . " 60
2475.	— <i>Oxycedrus rufescens</i> . . . . .	" . . . . . " 30
2476.	— <i>phœnicea</i> . . . . .	" . . . . . " 40
2477.	— <i>prostrata</i> ( <i>horizontalis, hudsonica</i> ) . . . . .	" . . . . . " 25
2478.	— <i>Sabina</i> . . . . .	" . . . . . " 30
2479.	— — <i>tamariscifolia</i> . . . . .	" . . . . . " 25
2480.	— <i>virginiana</i> ( <i>carolineana</i> ) . . . . .	" . . . . . " 30
2481.	— — <i>cupressiformis</i> ( <i>flagelliformis</i> ) . . . . .	" . . . . . " 40
2482.	<i>Kalmia latifolia</i> ( <i>Kalmia à larges feuilles</i> ) . . . . .	" . . . . . " 50
2483.	<i>Larix dahurica</i> ( <i>rossica, sibirica</i> ) ( <i>Mélèze</i> ) . . . . .	" . . . . . " 75
2484.	<i>Libocedrus chilensis viridis</i> . . . . .	" . . . . . 1 50
2485.	<i>Morus alba</i> ( <i>Mûrier blanc</i> ) . . . . .	50 grammes . . . . . 1 "
2486.	— <i>nigra</i> ( <i>M. noir</i> ) . . . . .	50 " . . . . . 1 25
2487.	<i>Paulownia imperialis</i> . . . . .	10 " . . . . . 1 "
2488.	<i>Pernettya speciosa</i> . . . . .	le paquet . . . . . " 50
2489.	<i>Pinus aristata</i> . . . . .	" . . . . . " 75
2490.	— <i>australis</i> ( <i>palustris</i> ) . . . . .	" . . . . . 1 "
2491.	— <i>Benthamiana</i> . . . . .	" . . . . . 1 "
2492.	— <i>canariensis</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2493.	— <i>Coulteri</i> ( <i>macrocarpa</i> ) . . . . .	" . . . . . 1 "
2494.	— <i>excelsa</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2495.	— <i>inops</i> . . . . .	" . . . . . " 40
2496.	— <i>insignis</i> . . . . .	" . . . . . 2 "
2497.	— — <i>macrocarpa</i> ( <i>radiata</i> ) . . . . .	" . . . . . 1 "
2498.	— <i>insularis</i> ( <i>timoriensis</i> ) . . . . .	" . . . . . 2 "
2499.	— <i>Lambertiana</i> . . . . .	" . . . . . 1 "
2500.	— <i>Laricio Pallasiana</i> ( <i>taurica</i> ) . . . . .	" . . . . . " 30
2501.	— <i>longifolia</i> . . . . .	" . . . . . 1 25
2502.	— <i>monticola</i> . . . . .	" . . . . . " 60
2503.	— <i>Mughus</i> . . . . .	" . . . . . " 30
2504.	— <i>Pinaster Hamiltoni</i> . . . . .	" . . . . . " 60
2505.	— <i>ponderosa</i> . . . . .	" . . . . . " 50
2506.	— <i>Pumilio</i> . . . . .	" . . . . . " 30

		Fr. C.
2507. <i>Pinus pyrenaica</i> . . . . .	le paquet . . . . .	" 40
2508. — <i>sabiniana</i> . . . . .	" . . . . .	1 "
2509. — <i>Schrenkiana</i> ( <i>Abies</i> ) . . . . .	" . . . . .	1 "
2510. — <i>tæda</i> . . . . .	" . . . . .	1 "
2511. — <i>Torreyana</i> . . . . .	" . . . . .	2 "
2512. — <i>tuberculata</i> . . . . .	" . . . . .	2 "
2513. <i>Ptelea trifoliata</i> ( <i>Orme de Samarie</i> ) . . . . .	25 grammes . . . . .	1 50
2514. <i>Pyrus communis</i> ( <i>Poirier</i> ) . . . . .	100 " . . . . .	1 25
2515. . . . .	le kilogramme . . . . .	15 "
2516. — <i>japonica</i> ( <i>Cydonia</i> ), variétés en mélange . . . . .	25 grammes . . . . .	2 "
2517. — <i>Malus</i> ( <i>Pommier</i> ) . . . . .	100 " . . . . .	" 75
2518. . . . .	le kilogramme . . . . .	6 "
2519. <i>Retinospora leptoclada</i> . . . . .	le paquet . . . . .	1 "
2520. — <i>squarrosa</i> . . . . .	" . . . . .	1 "
2521. <i>Rhododendron ponticum</i> , hyb. et var. rustiques en Belgique . . . . .	" . . . . .	" 30
2522. . . . .	25 grammes . . . . .	4 "
2523. <i>Sequoia sempervirens</i> . . . . .	le paquet . . . . .	" 75
2524. <i>Thuia gigantea</i> ( <i>Craigiana</i> ) ( <i>Libocedrus decurrens</i> ) . . . . .	" . . . . .	1 "
2525. — <i>Menziesi</i> ( <i>Lobbi, californica</i> ) . . . . .	" . . . . .	1 "
2526. — <i>plicata</i> ( <i>Warreana</i> ) . . . . .	" . . . . .	" 50
2527. <i>Thuiopsis Standishi</i> . . . . .	" . . . . .	" 50
2528. <i>Torreya Myristica</i> . . . . .	" . . . . .	" 75
2529. <i>Weigelia</i> ( <i>Diervilla</i> ), belles variétés en mélange . . . . .	" . . . . .	" 50
2530. <i>Wellingtonia gigantea</i> ( <i>Sequoia</i> ) . . . . .	" . . . . .	1 50

## POMMES DE TERRE (*POTATOES*).

	1 kilogr.	10 kilogr.
	Fr. C.	Fr. C.
12. <b>Compton's Surprise.</b> Variété tardive; tubercule gros, peau violette à reflet brunâtre, rugueuse, chair jaune, compacte. . . . .	1 "	9 "
14. <b>Precious Seedling.</b> Variété hâtive; tubercule rond, peu allongé, peau jaune, chair jaune beurre, très-farineuse . . . . .	" 60	5 "
15. <b>Early Fermont.</b> Variété hâtive et très-productive; tubercule long, gros, peau rouge pâle, très-lisse, chair d'un jaune clair. . . . .	" 50	4 "
	100 kilogr. : 35 francs.	
17. <b>Fine Seedling.</b> Variété tardive; tubercule rond, légèrement allongé, très-gros, peau jaune, rugueuse, chair jaune, très-farineuse . . . . .	" 50	4 "
26. <b>Early Rose</b> ( <i>Rose hâtive d'Amérique</i> ). Variété hâtive; tubercule long, gros, aplati, peau blanche rosâtre, lisse, chair excellente . . . . .	" 40	3 50
	100 kilogr. : 30 francs.	
40. <b>Black Mercer.</b> Variété tardive; tubercule long, moyen, peau violette, très-rugueuse, chair jaune, compacte . . . . .	" 50	4 "
49. <b>Willard.</b> Variété tardive; tubercule long, gros, peau rouge maculée de jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf . . . . .	" 40	3 50
51. <b>Garnet Chili.</b> Variété tardive; tubercule rond, gros, peau rouge, rugueuse, chair jaune beurre, farineuse . . . . .	" 60	5 "
78. <b>Blanchard.</b> Variété précoce, très-fertile, de première qualité pour le potager; tubercule rond, peau violacée, chair jaune . . . . .	" 50	4 "
84. <b>Segonzac de la Saint-Jean.</b> Variété demi-hâtive, connue aussi sous le nom de <i>Malinoise</i> ; tubercule rond, gros, peau jaune, très-lisse, chair jaune clair . . . . .	" 40	3 50
	100 kilogr. : 30 francs.	



1 kilogr. 100 kilogr.

Fr. C. Fr. C.

85. Shaw. Variété hâtive et très-productive; tubercule rond, gros, peau jaune, rugueuse, chair jaune . . . . .	n 50	4 "
87. Marjolin hâtive. Variété très-hâtive, peu fertile, convenable pour primeur et pour culture forcée; tubercule moyen, long, peau jaune terne, lisse, chair jaune; on doit éviter de casser les germes en la plantant. . . . .	1 "	9 "
89. Marjolin de deuxième saison. Variété assez fertile; tubercule long, peau jaune clair, très-lisse, chair jaune clair . . . . .	n 75	7 "
94. de Zélande. Variété tardive; tubercule gros, rond, peau rosâtre, un peu rugueuse, chair jaune clair . . . . .	n 50	4 "
119. Red-skinned Flour Ball. Variété tardive; tubercule très-gros, rond, irrégulier, peau rouge violacée, assez lisse, chair blanche . . . . .	n 50	4 "
147. Snowflake. Variété hâtive; tubercule rond, légèrement allongé, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse. . . . .	n 60	5 "
149. Hoboken. Variété très-recherchée pour son excellente qualité, sa grande précocité et sa forte production; tubercule rond, moyen, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse . . . . .	n 50	4 "
100 kilogr. : 35 francs.		
154. King of the Flukes. Variété demi-hâtive et très-productive; tubercule rond, un peu allongé, peau lisse, jaune, chair fine, assez ferme, jaune . . . . .	n 75	6 "
155. Marjolin Têtard. Variété très-hâtive et très-productive; tubercule rond, un peu allongé, peau jaune, lisse, chair jaune beurre, d'excellente qualité. . . . .	1 "	9 "
156. Eurêka. Variété demi-hâtive et très-productive; tubercule long, aplati, moyen, peau jaune, chair jaune d'or, farineuse . . . . .	1 "	9 "
159. Alpha. Variété très-productive; tubercule rond, légèrement allongé, peau jaune, lisse, chair blanche, farineuse. . . . .	n 75	7 "
160. Ruban rouge ( <i>New Hundredfold Fluke</i> ). Variété très-productive; tubercule gros, peau jaune cerclée d'une bande rouge vif, lisse, chair jaune clair, peu farineuse . . . . .	n 50	4 "
162. Ruby. Variété tardive et très-productive; tubercule gros, un peu allongé, peau rouge violacée, légèrement rugueuse, chair jaune beurre, farineuse . . . . .	n 75	6 "
173. Magnum Bonum. Variété hâtive et très-productive; tubercule long, peau jaune, chair jaune, très-farineuse. . . . .	n 75	7 "
175. Chardon. Variété populaire en Angleterre et en Ecosse, excellente pour grande culture; tubercule gros, arrondi, un peu irrégulier, chair jaune, très-farineuse. . . . .	1 "	9 "

## POMMES DE TERRE.

La collection complète (25 variétés), un kilogramme de chaque : 15 francs.

# GESNÉRIACÉES <sup>(1)</sup>

Garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Les rhizomes ou tubercules de Gesnériacées sont disponibles, à l'état sec, de novembre à mars; ils sont expédiés, autant que possible, par la poste, chaque sorte dans une capsule en papier et le tout dans une petite boîte en bois.

Il est tout à fait inutile de nous demander, pendant la saison de la pousse, des Gesnériacées que nous offrons maintenant à l'état sec, pendant la saison du repos. Une fois que les rhizomes ou tubercules sont plantés et en végétation, ils ne se vendent plus aux prix ci-après fixés, mais comme plantes cultivées en pots.

De juillet à octobre, nos serres froides sont remplies d'une multitude de Gesnériacées fleuries; les Achimenes, les Dircæa, les Eucodonia, les Gesneria, les Gloxinia, les Nægelia, les Plectopoma, les Rosanowia, les Tydæa, etc., etc., y entremêlent leurs multiples et superbes coloris, où toutes les nuances de l'arc-en-ciel sont représentées. Ajoutons que les Begonias tubéreux y opèrent aussi leur splendide floraison.

Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes auxquelles cette serre sert d'abri durant la saison froide? Et qu'est-ce qu'une serre froide que l'on tient fermée pendant l'été, sinon une véritable serre chaude qui serait si belle, parée de Gesnériacées?

Celles-ci se reposent, sans verdure, à l'état sec pendant l'hiver; leurs tubercules ou leurs rhizomes, que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses remplies de n'importe quelle terre bien sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on les empote et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue est certes bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide.

N. B. Dans les commandes, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.

## Achimenes.

### PREMIÈRE SÉRIE.

					Fr. C.
1	sorte au choix de l'amateur, 3 rhizomes	.	.	.	50
12	— — — 3 —	de	chaque	.	5 "
25	— — — 3 —	—	—	.	8 "
50	— — — 3 —	—	—	.	15 "
1	— — — 6 —	—	—	.	75 "
12	— — — 6 —	—	—	.	7 50
12	— à mon choix 3 —	—	—	.	4 "
25	— — — 3 —	—	—	.	7 "
50	— — — 3 —	—	—	.	12 "
75	— — — 3 —	—	—	.	16 "
12	— — — 6 —	—	—	.	5 "
25	— — — 6 —	—	—	.	9 "
12	— — — 12 —	—	—	.	7 "
25	— — — 12 —	—	—	.	12 "
12	— — — 25 —	—	—	.	10 "
Variétés en beau mélange				le cent.	3 "
				le mille	25 "

(1) C'est à M. CH. RAES, l'intelligent chef de la section des GESNÉRIACÉES, etc., dans notre Établissement, et à son habileté consommée dans les hybridations, que nous sommes redevable de toutes ces magnifiques variétés d'Eucodonia, Gesneria, Gloxinia, Nægelia, Plectopoma, Rosanowia, Tydæa, Begonias tubéreux, Amaryllis, etc., que nous offrons ci-après.



**Achimenes. — PREMIÈRE SÉRIE.**

2. *coccinea Dazzle.*  
Variété très-naine, fleur d'un vermillon vif.
5. *picta.*  
Fleur vermillon.
6. *pulchella.*  
Fleur bleue refletée de violet, gorge blanc crème pointillé.
7. *purpurea multiflora.*  
Fleur d'un pourpre foncé vif, centre jaune d'or foncé.
8. *pygmaea.*  
Variété très-naine, d'un port très-compacte; fleur rouge clair.
10. *venusta.*  
Fleur d'un carmin violacé vif, gorge jaune d'or.
11. *violacea semi-plena.*  
Variété formant des touffes basses; fleur violette, demi-double.
13. *longiflora.*  
Fleur d'un bleu vif, centre clair.
14. — *macrantha (latifolia).*  
Fleur très-grande, très-plate, d'un bleu superbe.
15. — *rosea (Klei).*  
Fleur d'un rose violacé.
16. — *Moore perfection.*  
Fleur de très-belle forme, lilas satiné.
17. — *Hendersoni.*  
Fleur à très-long tube, à limbe rose cuivré.
18. — *alba (Jaureguia)* (FLORE, V, 536).  
Fleur blanche liserée de carmin.
19. — *Margaritæ.*  
Fleur d'un blanc pur, très-belle.
20. — — *W. Muller.*  
Fleur d'un blanc pur, orifice strié de lilas.
21. — — *maxima.*  
Fleur blanche, très-grande.
22. — *Dr Hopf.*  
Fleur blanche teintée de lilas, orifice rouge feu réticulé de lilas vif.
23. — *Ed. Boissier.*  
Fleur blanche refletée de lilas, réticulée de pensée claire.
24. — *Amb. Verschaffelt.*  
Fleur blanche réticulée de pensée claire, orifice rayonné de jaune d'or.
25. *grandiflora.*  
Fleur d'un rose lilacé, centre blanc pur.
26. — *Carl Wolfarth.*  
Très-grande fleur d'un violet vif.
27. — *Caspar Schinz.*  
Fleur d'un rose lilacé clair, orifice blanc pur.
29. — *François Cardinaux.*  
Grande fleur d'un violet rosé.
30. — *Louis Van Houtte.*  
Fleur moyenne, violette refletée de carmin; variété tardive.
31. *patens* (FLORE, III, 1847, 245).  
Fleur moyenne, d'un violet carminé vif.
32. — *major.*  
Grande fleur d'un violet foncé carminé, orifice teinté de blanc.
33. *Sir Treherne Thomas.*  
Grande fleur d'un amarante rosé.
34. *Skinneri.*  
Fleur d'un orange vif.
35. *pedunculata.*  
Fleur rose vif, long pédoncule.
36. *heterophylla.*  
Fleur d'un vermillon feu vif.
37. *œnochroa.*  
Fleur rouge lie de vin.
38. *Georgeana (Veilch).*  
Fleur d'un écarlate foncé, gorge jaune d'or pointillé de rouge foncé.
39. *miniata.*  
Fleur d'un rouge minium.
40. *tubiflora.*  
Fleur rouge pourpre.
642. *Leopard (Williams).*  
Grande fleur rouge, centre jaune.
644. *micans (Williams).*  
Fleur d'un rouge magenta vif, centre jaune tigré.
645. *purpurea elegans (Williams).*  
Fleur moyenne, d'un magnifique rouge magenta foncé.
649. *grandiflora flore pleno.*  
Fleur pleine, d'un violet pourpré clair.
771. *Advance (Parsons).*  
Fleur rose magenta, dentelée, de très-belle forme.
772. *Argus (Parsons).*  
Fleur d'un rouge orangé, centre rayé de carmin.
773. *Arcturus (Parsons).*
774. *grandis (Parsons).*  
Fleur d'un pourpre violacé foncé, centre orange pointillé de carmin.
775. *Pink Perfection (Parsons).*  
Grande et belle fleur lilas satiné.
777. *Adèle Delahante.*  
Fleur rose tendre.
779. *Mad. Rendatler.*  
Fleur d'un lilas violacé veiné de violet carminé.
780. *Magnet.*  
Fleur carmin, centre orange.
781. *Mauve Perfection (Williams).*  
Fleur pourpre.
782. *Cassiopée.*
783. *Andromède.*
784. *Parsonsi (Parsons).*  
Fleur d'un rouge cuivre pointillé de jaune.
786. *reticulata.*  
Fleur moyenne, d'un beau bleu, centre jaune citron pointillé.
789. *Jaureguia maxima.*  
Très-grande fleur blanche légèrement nuancée de lilas.
1027. *longiflora Mauve Queen.*
1140. *Admiration (Williams).*  
Grande fleur d'un rouge magenta violacé, gorge blanche.
1150. *Masterpiece (Williams).*  
Grande fleur d'un rose violacé, centre blanc.
1176. *Nisida (Rossiaud).*  
Fleur lilas mauve, centre jaune pointillé.
1562. *Baumannii (Rossiaud).*  
Fleur d'un violet carminé.
1563. *longiflora Madem. Marthe (Vallerand).*  
Fleur d'un bleu violacé, centre orange pointillé.
1573. — *picta.*  
Grande fleur d'un rose foncé violacé.
1575. *Camille Brozzoni.*  
Fleur lilas, gorge blanche pointillée.

1577. *carminata*.

Fleur carmin cuivré.

1578. *Chelsoni*.

Fleur d'un bleu violacé.

1580. *Dentonia*.

Fleur grande, d'un bleu cendré.

1581. *Docteur Buenzod*.

Fleur d'un violet carminé, gorge jaune tigrée de cramoisi.

1583. *Empress Elizabeth*.

Fleur mauve tendre, gorge pointillée de cramoisi.

1584. *Escheriana*.

Fleur d'un violet carminé, centre jaune pointillé.

1585. *floribunda*.

Fleur d'un violet carminé; variété très-florifère.

1586. *Frau Schiller*.

Fleur d'un lilas violacé veiné de violet clair.

1588. *Georgeana splendens*.

Grande fleur écarlate foncé, centre jaune d'or sablé de cramoisi.

1589. — *fulgens*.

Fleur pourpre, centre carminé refleté de rouge feu.

1590. — *gigantea*.

Fleur pourpre.

1591. *Hofgärtner Mastrand*.

Fleur pourpre refletée de vermillon, gorge jaune tigrée de cramoisi.

1592. — *Neuner*.

Fleur amarante, gorge jaune citron pointillé.

1595. *ignescens*.

Fleur d'un vermillon vif.

1593. *Liebmanni*.

Fleur rose lilacé.

1599. *Madame Georges*.

Fleur lilas violacé.

1601. *Master Ingram*.

Fleur rouge cuivre, centre jaune pointillé.

1603. *M. de Rougemont*.

Fleur amarante veinée de pourpre carminé vif.

1604. *M. Miellez*.

Fleur blanche, gorge striée de lilas.

1605. *Parsonsi*.

Fleur rouge cuivre, centre jaune.

1606. *patens variabilis*.

Fleur pourpre foncé.

1607. *purpurea multiflora*.

Fleur pourpre foncé, centre jaune.

1608. *perlata*.

Fleur d'un violet tendre recouvert d'un réseau plus foncé.

1609. *reticulata rosea*.

Fleur d'un bleu violacé réticulé de rose.

1612. *lurida*.

Fleur écarlate clair.

1614. *treviriana coccinea*.

Petite fleur écarlate vif.

1615. — *rosea*.

Fleur d'un rose carminé foncé.

1616. — *splendens*.

Fleur très-grande, d'un vermillon vif.

1617. *vestalina*.

Fleur pourpre, centre cuivré.

1618. *vivicans*.

Fleurs nombreuses, d'un carmin violacé.

**Achimenes. — DEUXIÈME SÉRIE.**

1 sorte au choix de l'amateur,	3 rhizomes.	75
12 — — — —	3 — de chaque.	7 50
1 — — — —	6 — — —	1 25
12 — — — —	6 — — —	12 "
12 — à mon choix	3 — — —	6 "
12 — — — —	6 — — —	10 "

1400. *Milton*.

Fleur à tube rouge, limbe rose.

1403. *Firefly (Veitch)*.

Fleur d'un carmin vif, centre orange saumoné.

1405. *Lady Littleton (Veitch)*.

Fleur frangée, d'un rouge magenta ombré de cramoisi velouté, centre orange clair.

1406. *Loveliness (Veitch)*.

Fleur d'un rouge magenta ombré de cramoisi sur le bord du limbe, centre jaune d'or pointillé de marron.

1407. *Unique (Veitch)*.

Fleur frangée, d'un rose carminé, centre orange pâle légèrement pointillé de carmin.

1559. *Ami Van Houtte (Vallerand)*.

Fleur d'un bleu violacé, centre jaune pointillé de pourpre.

1560. *Arenbergi (Vallerand)*.

Fleur d'un violet pourpré foncé.

1565. *Celestial*.

Fleur très-longue, blanche teintée de bleu violacé.

1566. *Diamond (Veitch)*.

Fleur blanche, refletée de pourpre bleuâtre vers le centre.

1570. *Roberti*.

Fleur d'un bleu lilacé, centre pointillé.

1571. *rosea elegans*.

Fleur d'un rose vif, gorge jaune citron pointillé de ponceau.

1572. — *magnifica*.

Fleur d'un rouge violacé, centre jaune citron pointillé.

1574. *Baumannii caerulea*.

Fleur d'un bleu violacé, centre blanc pointillé de pourpre.

1579. *cyanea*.

Fleur d'un bleu violacé veiné de mauve, centre jaune citron pointillé.

1593. *Hofgärtner Wendschuch*.

Fleur d'un violet pourpré foncé.

1613. *Semilosse*.

Fleur d'un pourpre foncé.

650. *Achimenes bleu (L. Van Houtte)*.(FLORE XVII, 77), le rhizome . . . 75  
Simule un très-beau *Mandirola* bleuâtre, de forme parfaite.



**Dicyrta.**

Chaque espèce par 6 rhizomes : 50 centimes.

736. *candida*. Fleur blanche.| 737. *Warszewiczii*. Fleur grisâtre refletée de bleu pâle.**Dolichodeira.**

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs.

97. *tubiflora*. Longue fleur blanche suavement odorante.**Eucodonia.**

Fr. C.

1. *Ehrenbergi*. Fleur bleu de ciel . . . . . " 50
653. *nægelioides* (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVI, 1). Fleur d'excellente forme, tube violet virant au rouge, limbe cramoisi velouté qui se change, dès l'orifice de la gorge, en un jaune citron vif pointillé d'amarante cramoisi . . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
654. — *diamantina* (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, pourpre violacée. . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
714. — *lilacinella* (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 70). Type de perfection pour la forme et les dessins ; fleur lilas, gorge blanche ponctuée de jaune citron et de lilas . . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
732. — *nana multiflora* (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 117). Variété naine ; nombreuses fleurs amarante et jaune d'or pointillés de vermillon ; floraison pendant trois mois. . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
1146. — *Van Houttei* (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, érigée, d'un rose carminé satiné, macule blanche mouchetée d'incarnat ; de premier ordre . . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
1640. — *Diane* (*L. Van Houtte*). Très-jolie fleur bleue lilacée, gorge légèrement jaunâtre . . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50
1641. — *Armide* (*L. Van Houtte*). Fleur d'un très-tendre incarnat légèrement lilacé, gorge jaunâtre . . . . . 1 "  
*les six* . . . . . 5 "
1642. — *Amphitrite* (*L. Van Houtte*). Grande et belle fleur rose lilacée, gorge blanche parcourue par trois bandes oranges . . . . . " 50  
*les six* . . . . . 2 50

**Gesneria.**

89. *discolor* . . . . . 3 "  
Magnifiques fleurs d'un rouge vif.
90. *Donkelaari* (FLORE, IX, 119). . . . . 5 "  
Le plus riche de floraison et de coloris de tous les *Gesneria*. Tige et pétioles rouges noirâtres ; fleurs grandes, d'un carmin vif, gorge jaunâtre.
91. *Leopoldi* (FLORE, VII, 167) . . . . . 1 "  
Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillonnées.
1290. — *lutescens* . . . . . 3 "  
Fleurs jaunâtres, très-belles.
1355. — *albo-carminæa* (*L. Van Houtte*). . . . . 2 "  
Fleurs blanches, rubanées de carmin très-foncé sur chaque division du limbe.
1438. — *roseo-lilacina* (*L. Van Houtte*). . . . . 2 "  
Variété trapue, très-florifère ; fleurs d'un rose lilacé.
1445. — *gigantea* (*L. Van Houtte*) . . . . . 5 "  
Nouvelle variété très-belle, à fleurs énormes, d'un rouge vif, gorge incarnate, lignée de carmin dans le fond.





1278. \*Francesco Escudero (*L. Van Houtte*).  
 1282. Zingari ( *n* ).  
 1283. Th. Nietner ( *n* ).  
 1285. Jules Pirlot ( *n* ).  
 1294. Haydée ( *n* ).  
 1322. Geneviève Baroche (*Rossiaud*).  
 1325. \*Lina Boutard (*Boutard*).  
 1330. Triomphe ( *n* ).  
 1331. Norma (*L. Van Houtte*).  
 1332. \*Cardinal de Richelieu ( *n* ).  
 1335. \*Ami Thibaut ( *n* ).  
 1336. \*Giralda ( *n* ).  
 1337. \*Cybèle ( *n* ).  
 1338. \*Amand Colpaert ( *n* ).  
 1340. \*Original ( *n* ).  
 1342. \*Marie Stuart ( *n* ).  
 1344. Madame de Staël ( *n* ).  
 1345. \*Madame Deshoulières ( *n* ).  
 1347. Alphonse Karr ( *n* ).  
 1348. B. S. Williams ( *n* ).  
 1349. Artevelde ( *n* ).  
 1354. \*Albo-marginata myriostigma ( *n* ).  
 1357. \*Aigueperse ( *n* ).  
 1359. \*Sao Joao Del Rey ( *n* ).  
 1360. \*Paracatu ( *n* ).  
 1368. \*William Bull ( *n* ).  
 1376. \*Mad. Jules Hye ( *n* ).
1413. Madame Alfred De Man (*L. Van Houtte*).  
 1415. \*Galatée ( *n* ).  
 1416. \*Psyché ( *n* ).  
 1417. La favorite ( *n* ).  
 1430. Calypso ( *n* ).  
 1432. Gédéon ( *n* ).  
 1435. \*Notaire Moens ( *n* ).  
 1450. \*Auguste Barbier ( *n* ).  
 1452. \*Sémiramis ( *n* ).  
 1457. \*Gérard de Nerval ( *n* ).  
 1471. \*Apollon ( *n* ).  
 1474. Augusta ( *n* ).  
 1478. \*Octave Feuillet ( *n* ).  
 1479. Lord Gray ( *n* ).  
 1482. \*Walter Scott ( *n* ).  
 1500. La rosière (*Duval*).  
 1504. Vésuve ( *n* ).  
 1505. Patrie ( *n* ).  
 1507. \*Duchesse d'Elkingen ( *n* ).  
 1511. Phèdre ( *n* ).  
 1512. \*William Robinson ( *n* ).  
 1514. Piccolino ( *n* ).  
 1517. Flore ( *n* ),  
 1518. Rubis ( *n* ).  
 1519. \*Boule de neige ( *n* ).  
 1520. Mont-Blanc ( *n* ).

## Gloxinia. — DEUXIÈME SÉRIE.

1	variété au choix de l'amateur.	fr.	1-50
12	— — — — —	n	15 n
12	— à mon choix . . . .	n	12 n

1434. \*Ch. Baudelaire (*L. Van Houtte*). Fleur d'un carmin foncé velouté, gorge amarante; le plus foncé en couleur de tous les Gloxinias.  
 1460. \*Jos. Souly (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau carmin bordé de blanc pur, fond de la gorge pointillé de carmin foncé.  
 1461. \*Jean Reboul (*L. Van Houtte*). Fleur d'un mauve lilacé, entrée de la gorge pourpre velouté se terminant dans le fond en un pointillé carmin lilacé.  
 1481. \*H. de la Morvonnais (*L. Van Houtte*). Fleur très-distinguée, blanche avec une ceinture pensée bleuâtre vif à l'entrée de la gorge, dont le fond est blanc verdâtre.  
 1483. \*Henri Murger (*L. Van Houtte*). Fleur d'un pourpre velouté bordé de blanc.  
 1533. Marquise de Chenevères (*Vallerand*). Fleur d'un violet clair strié et réticulé de violet foncé, marginé de blanc pur.  
 1535. Président Thomas (*Vallerand*). Fleur d'un rouge cerise vif velouté, bordé d'amarante carminé, gorge amarante bleuâtre.  
 1628. \*Auguste Vacquerie (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, lavande bordé de bleu, gorge lignée et pointillée de carmin foncé.  
 1633. \*Alphonse Esquiros (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau rouge flammé de blanc rosé.  
 1649. \*Olympe (*L. Van Houtte*). Jolie fleur à lobes ondulés, d'un rose clair pointillé et ligné de carmin foncé.  
 1652. \*Hermance (*L. Van Houtte*). Charmante fleur d'un violet évêque velouté réticulé, allant en s'éclaircissant vers le bord de la corolle, fond de la gorge ligné de rose violacé.  
 1661. \*H. Taine (*L. Van Houtte*). Fleur grande, bien faite, violet évêque velouté, diminuant insensiblement en s'approchant du bord de la corolle.  
 1664. \*Anaïs (*L. Van Houtte*). Très-belle et grande fleur d'un rose tendre pointillé et ligné de carmin vif.

1673. \***Jeanne** (*L. Van Houtte*). Fleur fimbriée, d'un blanc pur, chaque lobe orné d'une macule qui se fond dans le blanc du limbe et de la gorge.
1678. \***Véronique** (*L. Van Houtte*). Variété de tout premier ordre; fleur très-grande, bien faite, bien étalée, violet évêque velouté se fondant en un violet bleuâtre vers le bord de la corolle.
1679. \***Pauline** (*L. Van Houtte*). Jolie fleur violette, gorge blanchâtre réticulée de violet carminé.
1681. **Mélanie** (*L. Van Houtte*). Charmante fleur d'un bleu violacé marginé de bleuâtre sur les lobes, réticulé de carmin dans la gorge.
1688. \***Isoline** (*L. Van Houtte*). Fleur bordée de carmin lilacé, lobes auréolés de carmin velouté, gorge pointillée, lignée et réticulée de carmin foncé.
1690. \***Henriette** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur d'un pourpre violacé velouté, allant en s'éclaircissant vers le bord de la corolle, gorge pointillée et lignée de violet pourpre.
1693. \***Marceline** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur d'un violet vif velouté, gorge blanche lignée et réticulée de violet.

## Gloxinia. — TROISIÈME SÉRIE.

### NOUVEAUTÉS DE 1880.

Une variété au choix de l'amateur. 3 francs.

Les 12 variétés. . . . . 30 »

1630. \***Stephenson Clarke** (*L. Van Houtte*). Très-jolie fleur bien faite, lavande bleuâtre sur le bord du limbe, plus foncé vers l'entrée de la gorge, qui est blanche lignée d'amarante foncé.
1631. \***Gladstone** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur bien faite, blanche pointillée et lignée de bleu violacé.
1669. **Lord Granville** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; très-grande et magnifique fleur légèrement fimbriée, d'un rouge carminé vif.
1675. \***John Lyall** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un carmin vif, plus pâle sur le bord de la corolle, gorge blanchâtre réticulée de carmin foncé.
1682. \***Lord Beaconsfield** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; grande fleur ondulée sur le bord de la corolle, d'un superbe amarante violacé velouté.
1687. \***Lady Howard de Walden** (*L. Van Houtte*). Très-belle et très-grande fleur blanche sur le bord de la corolle, auréolée de violet évêque velouté à l'entrée de la gorge.
1689. \***Général Roberts** (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; magnifique et très-grande fleur du blanc le plus pur, les cinq lobes auréolés de carmin très-tendre.
1775. \***Mr Bright** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande et très-belle, d'un bleu pensée velouté bordé de blanc laiteux.
1786. \***Miss E. Dillon** (*L. Van Houtte*). Charmante fleur blanche pointillée de violet sur le bord des lobes, d'un carmin lilacé à l'entrée de la gorge.
1806. \***Sir Bartle Frere** (*L. Van Houtte*). Belle variété d'un pourpre carminé, légèrement odorante.
1810. **David Milne Home** (*L. Van Houtte*). Très-jolie fleur d'un blanc rosé tout couvert de lignes et de points d'un rose vif.
1834. **Lord Derby** (*L. Van Houtte*). Grande et superbe fleur d'un blanc de neige sur le bord de la corolle, d'un carmin vif velouté à l'entrée et jusqu'au fond de la gorge.



**Gloxinia crassifolia.** — QUATRIÈME SÉRIE.

Nouvelle race perfectionnée, aussi florifère que celle à fleurs *inclinaées* et *érigées*, d'un port robuste, d'un feuillage plus large et plus épais, à fleurs symétriques, très-grandes et des coloris les plus variés.

## NOUVEAUTÉS DE 1880.

Une variété au choix de l'amateur . . . 4 francs.

Les 8 variétés . . . . . 25 "

1643. \***Madem. Agar** (*L. Van Houtte*). Très-belle grande fleur d'un blanc pur, entrée de la gorge d'un carmin violacé qui s'étend en points de même couleur jusqu'au fond de la corolle.
1648. \***Madem. Valentine de Nocker** (*L. Van Houtte*). Variété de tout premier ordre; grande fleur d'un blanc laiteux, entrée de la gorge d'un riche violet évêque se fondant dans le blanc du limbe, fond de la corolle blanc verdâtre.
1650. \***Madem. Gabrielle de Nocker** (*L. Van Houtte*). Grande belle fleur d'un violet tendre sur le limbe, entrée de la gorge d'un violet évêque velouté se terminant en un fin pointillé rouge violacé jusqu'au fond de la corolle.
1658. \***Roland de Lattre** (*L. Van Houtte*). Belle fleur blanche recouverte, sur les lobes, d'amarante lilacé qui va en s'affaiblissant vers le bord de la corolle.
1660. \***Grétry** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un blanc pur, entrée de la gorge d'un carmin lilacé.
1667. \***Fétis** (*L. Van Houtte*). Grande belle fleur d'un violet évêque, légèrement bleuâtre sur les bords du limbe.
1801. \***Gossec** (*L. Van Houtte*). Grande fleur très-bien faite, lilas bordé de blanc lilacé.
1807. \***Grisar** (*L. Van Houtte*). Superbe fleur d'un écarlate velouté vif, bordé de rose tendre.

## GLOXINIA EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Beaux tubercules de force à fleurir, provenant de fécondations opérées sur les meilleures variétés de notre riche collection.

Variétés à fleurs inclinées et érigées . . .				le cent. . .	fr. 25 "
—	—	—	—	les cinquante. .	" 14 "
—	—	—	—	les vingt-cinq. .	" 8 "
—	—	—	—	les douze . .	" 5 "
—	—	érigées exclusivement . .		le cent. . .	" 30 "
—	—	—	—	les cinquante. .	" 16 "
—	—	—	—	les vingt-cinq. .	" 10 "
—	—	—	—	les douze . .	" 5 50
—	crassifolia à fleurs inclinées et érigées			le cent. . .	" 40 "
—	—	—	—	les cinquante. .	" 22 "
—	—	—	—	les vingt-cinq. .	" 12 "
—	—	—	—	les douze . .	" 7 "

**Kollikeria.**

3 rhizomes : 50 centimes. — 12 rhizomes : fr. 1-50.

837. **argyrostigma** (FLORE, II, avril, pl. VII).

Plante très-naine, à joli feuillage saupoudré de points blancs et à fleurs blanches en épi.

**Nægelia.** — PREMIÈRE SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . . . .	fr.	n	75
12 — — — — —	"	n	7-50
12 — à mon choix . . . . .	"	n	6 "
25 — — — — —	"	n	10 "
Variétés de semis en beau mélange, <i>les douze</i> . . . . .	"	n	4 "
<i>les vingt-cinq</i> . . . . .	"	n	7 "

71. *amabilis* (FLORE, XII, 21). Grande et magnifique fleur d'un blanc de neige, ornée d'une large tache jaune citron sur la lèvre inférieure.
72. *zebrina splendens*. Fleur rouge, tube rouge en dessus et jaune d'or en dessous.
73. *bicolor* (L. Van Houtte). Fleur d'un jaune foncé, tube rouge corail.
75. *cymosa* (L. Van Houtte). Fleur d'un blanc rosé.
76. *Leichtlini* (L. Van Houtte). Fleur d'un jaune pur, rose foncé au sommet.
78. *rosea punctatissima* (L. Van Houtte). Fleur d'un rose très-foncé.
79. *Sapho* (L. Van Houtte). Fleur blanche légèrement teintée de rose, gorge jaune canari.
81. *cinnabarina rosea* (L. Van Houtte). Fleur incarnate marbrée de blanc, gorge jaune citron constellé de jaune d'or, tube vermillon très-clair, comme transparent.
601. *Cerise d'or* (L. Van Houtte). Fleur jaune d'or pointillé de carmin, tube rouge cerise.
602. *lutea punctatissima* (L. Van Houtte). Fleur jaune, points vermillonnés symétriquement rangés dans toute la gorge.
609. *Mad. L. Van Houtte* (L. Van Houtte). Fleur blanche striolée et saupoudrée de carmin, tube rose très-vif; variété de premier ordre.
611. *Ch. Raes* (L. Van Houtte). Fleur d'un carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carminés.
612. *Mad. A. Lacomblé* (L. Van Houtte). Fleur d'un rose vif se détachant sur un fond blanc que ceint un feston rose.
637. *Cliftoni* (L. Van Houtte). Très-grande fleur mouchetée de cramoisi, tube mi-jaune d'or, mi-vermillon.
660. *Sceptre cerise* (L. Van Houtte) (FLORE, XVI, 57). Fleur d'un rouge cerise vermillonné très-vif, tout pointillé de jaune.
661. *Sceptre corail* (L. Van Houtte). Brillante fleur d'un rouge corail clair, orifice zébré de jaune canari.
725. *Sceptre royal* (L. Van Houtte). Magnifique fleur d'un rouge corail, gorge jaune citron saupoudré de points écarlates.
729. *Rose d'amour* (L. Van Houtte). Fleur rose marbrée et maculée de blanc de neige, gorge blanche rayonnée de jaune citron.
730. *citrina coronata* (L. Van Houtte). Fleur jaune citron, chaque lobe orné d'une petite couronne de points vermillons, tube rouge corail.
791. *refulgens* (Linden). Fleur violette rayée de marron, gorge blanche couverte de larges taches chamois.
804. *Jewel* (W. Bull). Grande fleur d'un jaune canari.
833. *Dauw* (L. Van Houtte). Fleur blanche saupoudrée de rose vif, gorge jaune d'or constellé de points vermillons.
834. *Donderstraal* (L. Van Houtte). Fleur carmin foncé, gorge jaune d'or ligné de points roses.
870. *fulgida concolor*. Magnifique fleur d'un vermillon vif.
874. *Léopard vermillon* (L. Van Houtte). Grande fleur du vermillon le plus vif, gorge d'un blanc crème pointillé de vermillon.
877. *Reine Marie-Henriette* (L. Van Houtte). Fleur d'un blanc crème pointillé d'orange.
885. *Juliette* (L. Van Houtte). Très-grande fleur incarnate teintée d'orange, encadrée de jaune paille et marbrée de jaune d'ocre vif; superbe variété.
889. *Droom* (L. Van Houtte). Fleur incarnate ornée de dessins d'un jaune de chrome.
890. *Morgenlicht* (L. Van Houtte). Fleur très-bien faite, d'un jaune d'or.
891. *Nachtegaal* (L. Van Houtte). Grande belle fleur incarnate, encadrée dans un pointillé incarnat sur fond blanc.



892. **Zonnendaal** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rose très-tendre pointillé de brun cannelle.  
 1021. **Gay-Lussac** (*L. Van Houtte*). Fleur vermillon clair, gorge blanche pointillée de vermillon.



1025. **Sceptre brillant** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rouge corail nuancé de lilas glacé, gorge jaune citron pointillé d'écarlate.  
 1052. **Jovial** (*L. Van Houtte*). Fleur orange, tube blanc de neige moucheté et bordé de vermillon.  
 1054. **Ruban cochenille** (*L. Van Houtte*). Fleur blanche zonée de jaune d'or et reticulée de cochenille, tube rouge bordé de cochenille.

1055. **Guillaume Tell** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un orange vermillonné foncé, gorge blanche pointillée d'orange.  
 1058. **Tricolore orange** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rouge orangé clair bordé de rouge orangé foncé, gorge blanche mouchetée de jaune d'or.

### **Nægelia.** — DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . 1 franc.  
 12 — à mon choix . . . . 10 "

871. **fulgida bicolor** (FLORE, XVII, 77). Fleur d'un vermillon vif au-dessus, d'un blanc marbré de vermillon pâle au-dessous.  
 1060. **Mikita** (*L. Van Houtte*). Fleur blanche largement bordée et mouchetée de vermillon foncé orangé.  
 1062. **Suavitas** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un incarnat tendre, gorge blanche pointillée d'incarnat.  
 1063. **Mastouche** (*L. Van Houtte*). Fleur incarnate bordée de capucine, gorge blanche mouchetée d'incarnat.  
 1148. **fulgida Van Houttei** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon vif, gorge blanche pointillée de vermillon.  
 1172. **Grand Mogol** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon intense, encadré sur fond jaune citron.  
 1423. **Itambé** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur du vermillon le plus vif, encadrant une macule jaune d'or, gros points vermillonnés; variété de premier ordre.  
 1463. **Marie** (*L. Van Houtte*). Fleur orange rougeâtre, entrée de la gorge incarnate sur fond jaune citron.  
 1464. **Léonie** (*L. Van Houtte*). Fleur jaune citron; variété de premier ordre.  
 1465. **Emma** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un carmin tendre, plus pâle sur les lobes inférieurs.  
 1466. **Alice** (*L. Van Houtte*). Fleur incarnate, légèrement nuagée de carmin lilacé sur le tube et le bord du limbe.  
 1467. **Bertha** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un carmin lilacé tendre, entrée de la gorge incarnate et orange, pointillée de carmin.  
 1468. **Gabrielle** (*L. Van Houtte*). Fleur carmin cramoisi bordé d'un léger filet blanc, entrée de la gorge jaune pointillée de carmin; variété de premier ordre.  
 1487. **Hélène** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un cramoisi vif, gorge blanche pointillée de cramoisi.  
 1488. **Valentino** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un cramoisi carminé, gorge blanche pointillée de carmin.  
 1489. **Adèle** (*L. Van Houtte*). Fleur blanche réticulée de carmin, tube carmin foncé.  
 1490. **Madeleine** (*L. Van Houtte*). Fleur cramoisie, gorge blanchâtre pointillée de carmin, tube cramoisi vif.  
 1550. **Mad. Lavallée** (*Vallerand*). Fleur rose, dessus du tube reflété de saumon, orifice de la gorge marbré de blanc.  
 1551. **Mad. Carrière** (*Vallerand*). Fleur d'un rouge corail clair glacé de carmin à l'extérieur, jaune strié et ponctué à l'intérieur.  
 1552. **Daphné** (*Vallerand*). Fleur d'un rose vif, centre blanc pur.

### **Nægelia.** — TROISIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . fr. 1-50  
 12 — à mon choix . . . . " 15 "

1694. **Cassandre** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon vif, entrée de la gorge blanche pointée de vermillon.  
 1695. **Polyxène** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon foncé; feuillage veiné de pourpre noirâtre velouté.  
 1696. **Cornélie** (*L. Van Houtte*). Fleur très-bien faite, bien étalée, d'un blanc pur, gorge jaune, tube rose clair; beau feuillage brunâtre velouté.  
 1697. **Hermione** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un jaune orangé pointillé de carmin, tube cocciné.  
 1698. **Pénélope** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un vermillon foncé, gorge blanche tachetée de vermillon.



1699. *Hécube* (L. Van Houtte). Fleur d'un blanc carné pointillé de rose, fond de la gorge pointillé de carmin, tube rose.
1700. *Briséis* (L. Van Houtte). Fleur jaunâtre pointillée de carmin, tube carmin clair; feuillage velouté veiné de noirâtre.
1702. *Léda* (L. Van Houtte). Fleur d'un vermillon carminé, gorge blanche pointillée de vermillon.
1703. *Lucrèce* (L. Van Houtte). Fleur jaune maculée et pointillée de carmin, tube rose carminé.
1704. *Virginie* (L. Van Houtte). Fleur d'un rouge cocciné, gorge jaunâtre tachetée de rouge.
1705. *Bérénice* (L. Van Houtte). Fleur d'un vermillon vif, gorge blanche tachetée de vermillon.
1706. *Aurore* (L. Van Houtte). Fleur d'un rouge saumon, gorge jaune pointillée de saumon.
1707. *Hermine* (L. Van Houtte). Fleur d'une blanc très-pur, gorge jaune canari.
1708. *Evelyne* (L. Van Houtte). Fleur d'un jaune nankin saumoné, gorge jaune nankin clair.
1709. *Artémise* (L. Van Houtte). Fleur d'un jaune saumoné, gorge jaune d'or; feuillage vert tendre, nervuré de pourpre velouté.
1710. *Sémiramis* (L. Van Houtte). Fleur d'un rouge minium vif sur le dessus du limbe, d'un blanc légèrement rougeâtre en dessous, gorge blanche maculée de rouge minium.
1729. *David* (Vallerand). Fleur d'un rose vif, gorge d'un blanc crème pointillé d'incarnat, tube rose carné.

## *Nægelia*. — QUATRIÈME SÉRIE.

### NOUVEAUTÉS DE 1880.

Une variété au choix de l'amateur. 3 francs.  
Les 12 variétés . . . . . 30 »

1712. *Scaramouche* (L. Van Houtte). Fleur rouge minium clair au-dessus, blanchâtre au-dessous, gorge blanche marquée de rouge vif; feuillage d'un vert gai, nervuré de pourpre velouté.
1713. *Arlequin* (L. Van Houtte). Fleur rougeâtre, gorge jaune d'or maculé de rouge sang, tube mi-rouge saumoné, mi-blanc; grand feuillage d'un vert gai velouté.
1714. *Gilles* (L. Van Houtte). Fleur jaunâtre pointillée de carmin foncé, tube carmin vif.
1789. *Crispin* (L. Van Houtte). Fleur rouge laque, gorge jaune pointillée de rouge; feuillage veiné de rouge brunâtre velouté.
1790. *Colombine* (L. Van Houtte). Fleur unicolore, d'un suave jaune citron; grand feuillage veiné de brun velouté.
1796. *Scapin* (L. Van Houtte). Fleur charmante, d'un rose lilacé, gorge blanchâtre marbrée de vermillon, tube vermillon vif.
1797. *Pasquin* (L. Van Houtte). Fleur d'un vermillon clair, gorge blanche striée de vermillon.
1811. *Pierrot* (L. Van Houtte). Fleur jaune pâle moucheté de carmin, gorge jaune d'or, tube carmin; beau feuillage veiné et maculé de pourpre.
1813. *Jocrisse* (L. Van Houtte). Grande fleur d'un jaune vif, reflété de rose sur le tube.
1814. *Polichinelle* (L. Van Houtte). Fleur blanche pointillée de cramoisi, tube cramoisi vif.
1815. *Brioché* (L. Van Houtte). Fleur jaunâtre pointillée d'incarnat, tube incarnat; feuillage veiné et maculé de brun pourpre velouté.
1818. *Jeannot* (L. Van Houtte). Fleur jaune teintée de rose; beau feuillage pourpre velouté.

## *Plectopoma*. — PREMIÈRE SÉRIE.

43. *gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318). Grande et belle fleur blanche, ornée d'une macule jaune d'or se profilant jusqu'au fond de la gorge, qui est saupoudrée de petits points pourpres. . . . . pièce . . . fr. » 50
835. *Gibsoni*. Belle fleur d'un bleu foncé . . . . . les six rhizomes » 1 »  
les douze » » 1 50
836. *Rollissoni*. Belle fleur d'un bleu pâle . . . . . les six » » 1 »  
les douze » » 1 50





**Stenogastra.**

98. **concinna** (FLORE, XV, 65). *Un tubercule* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs.  
Petite plante de serre chaude, à floraison de longue durée ; fleur très-coquette,  
blanche et lilas à gorge pointillée.

**Tydaea. — PREMIÈRE SÉRIE.**

1 variété au choix de l'amateur . . . . .	fr.	n	75
12 — — — — —	n	7	50
12 — à mon choix . . . . .	n	6	n
Variétés de semis en beau mélange, <i>les douze</i> . . . . .	n	4	n
<i>les vingt-cinq</i> . . . . .	n	7	n

64. **kewensis**. Petite fleur d'un pourpre foncé, tube carminé.  
66. **gigantea** (L. Van Houtte) (FLORE, X, pl. 975). Grande fleur vermillon et jaune d'or.  
615. **Melpomène** (L. Van Houtte). Grande fleur carmin carrelé de cramoisi feu.  
616. **Thalie** (L. Van Houtte). Grande fleur bien faite, jaune citron à nombreuses et larges  
mouchetures vermillonnées, tube vermillon.  
621. **Etna** (L. Van Houtte). Fleur d'un écarlate feu velouté très-foncé, ligné de noirâtre.  
622. **Tricolore** (L. Van Houtte). Fleur d'un blanc pur pointillé d'amarante vif, tube corail.  
958. **alba nigra** (L. Van Houtte). Fleur rouge feu, gorge blanche rayée de noir.  
962. **alba kermesina** (L. Van Houtte). Fleur blanche nuagée de rose vif, zébrée de cramoisi.  
970. **Agar** (L. Van Houtte). Fleur blanche nuagée de carmin et pointillée de jaune chamois.  
978. **Capucine mordorée** (L. Van Houtte). Fleur d'un vermillon vif tacheté de marron noirâtre.  
983. **Wonder** (L. Van Houtte). Fleur d'un vermillon vif couvert de zébrures noires comme jais.  
1050. **Cratère** (L. Van Houtte). Très-grande fleur de forme parfaite, d'un cramoisi feu foncé  
barré de noir jais.  
1302. **Chamalières** (L. Van Houtte). Fleur superbe, d'un jaune d'or réticulé de rouge minium ;  
variété de premier ordre.  
1303. **Iguasi** (L. Van Houtte). Grande fleur d'un carmin clair ponctué de pourpre foncé.  
1304. **Itaculum** (L. Van Houtte). Très-grande fleur de forme modèle, d'un rouge satiné, tube  
rose carminé.  
1351. **Belzebuth** (L. Van Houtte) (FLORE, XXI, 31). Fleur cramoisie couverte de taches noires  
comme la peau d'un léopard ; variété de premier ordre.  
1372. **Sapé** (L. Van Houtte). Fleur parfaite, d'un vermillon feu pointillé de cramoisi, à collerette  
jaune d'or à l'orifice de la gorge qui est jaune et parcourue de lignes parallèles cramoisies,  
entremêlées de points de même couleur ; variété de tout premier ordre.  
1377. **Apollon** (L. Van Houtte). Fleur violette pointillée de brun.  
1539. **Léon Duval** (Vallerand). Fleur d'un lilas violacé ponctué de carmin pourpré, tube carmin vif  
glacé de violet.  
1541. **Périclès** (Vallerand). Fleur jaune d'or avec une bande écarlate, rayée et ponctuée de cra-  
moisi noirâtre, tube vermillon.  
1544. **Surabondant** (Vallerand). Fleur blanche rayée et ponctuée de pourpre velouté, tube rouge  
cerise carminé.

**Tydaea. — DEUXIÈME SÉRIE.**

1 variété au choix de l'amateur. 1 franc.
12 — à mon choix . . . . . 10 "

1024. **Robert-le-Diable** (L. Van Houtte) (FLORE, XVIII, 131). Grande fleur d'un vermillon très-  
foncé, réticulé de noir jais ; variété de premier ordre.  
1379. **Cérès** (L. Van Houtte). Fleur mi-blanche, mi-vermillon, pointillée de cramoisi, tube corail.  
1380. **Diane** (L. Van Houtte). Fleur d'un vert jaunâtre pointé de rouge cerise, tube rouge corail.  
1381. **Hercule** (L. Van Houtte). Fleur d'un violet foncé pointillé de brun vif, tube rouge.  
1383. **Junon** (L. Van Houtte). Fleur d'un pourpre cocciné couvert d'une chaîne de points bruns  
rougeâtres, tube pourpre.

1386. **Jupiter** (*L. Van Houtte*). Fleur jaune paille pointé de cramoi, tube corail.  
 1390. **Thémistocle** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un blanc crème pointé de rouge cerise, tube corail.  
 1391. **Minerve** (*L. Van Houtte*). Fleur violette pointée de cramoi, tube pourpre.  
 1392. **Léonidas** (*L. Van Houtte*). Fleur mi-jaune paille orné de points enchaînés rouge cerise, mi-rouge terne pointillé de vermillon, tube rouge corail vif.  
 1396. **Platon** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un pourpre violacé pointé de brun rougeâtre, tube violet.  
 1397. **Cimon** (*L. Van Houtte*). Fleur verdâtre pointillée de rouge violacé, tube rouge lilacé.  
 1492. **Epaminondas** (*L. Van Houtte*). Fleur d'un carmin clair réticulé de carmin très-foncé, tube rouge cocciné.  
 1493. **Lycargue** (*L. Van Houtte*). Fleur amarante violacée couverte d'un réseau plus foncé.  
 1494. **Xénophon** (*L. Van Houtte*). Belle et grande fleur de premier mérite, d'un rouge saumon réticulé de rouge noirâtre, gorge orange lignée et pointillée de rouge foncé, tube cochenille orangé.  
 1495. **Pélopidas** (*L. Van Houtte*). Grande et belle fleur pointillée de carmin foncé, tube rouge cocciné.  
 1497. **Alexandre** (*L. Van Houtte*). Grande fleur pointillée de carmin noirâtre, tube rouge cocciné.

## Tydaea. — TROISIÈME SÉRIE.

### NOUVEAUTÉ DE 1880.

1491. **Proserpine**. Charmante variété à grande fleur couverte d'un réseau carminé foncé, tube rouge cocciné. — 3 francs.

## CALADIUM.

D'OCTOBRE en AVRIL, les CALADIUM sont disponibles en tubercules A L'ÉTAT SEC et s'expédient en petit volume PAR LA POSTE; pendant les autres mois, ils ne peuvent être fournis qu'en végétation, en pots, et à des prix supérieurs.

### PREMIÈRE SÉRIE.

1	variété au choix de l'amateur	2 francs.
12	— à mon choix	18 "
25	— —	30 "

2. argyrites (FLORE, XIII, 101).
3. argyropilum (FLORE, XIII, 103).
4. Baraquinii (FLORE, XIII, 163).
6. bicolor.
7. bicolor splendens.
8. Brongniartii (FLORE, XIII, 105).
9. Chantini (FLORE, XIII, 111).
11. cupreum (*Schæller*).
12. discolor.
15. Gaerti.
16. hastatum (*Schæller*).
17. hæmatostigma.
18. Houletii.
19. marmoratum tripedestum (*Chantin*).
21. Neumannii (FLORE, XIII, 113).
26. pictum.
27. picturatum.
29. poecile.
30. Schœlleri.

31. Verschaffeltii (*Chantin*).
34. Schmitzi.
35. Wightii.
40. Enkei (*A. Verschaffelt*).
46. amabile (*A. Verschaffelt*).
48. Lemaireanum (*A. Verschaffelt*).
49. regale (*A. Verschaffelt*).
50. rubro-venosum (*A. Verschaffelt*).
51. splendidum (*A. Verschaffelt*).
85. Schillerianum (*Schæller*).
86. mirabile (*A. Verschaffelt*).
93. Cannarti (*Linden*).
97. macrophyllum (*A. Verschaffelt*).
98. Hrubyanum (*L. Van Houtte*).
99. Lindleyanum (*L. Van Houtte*).
100. Skopetzianum (*L. Van Houtte*).
101. Mooreanum (*L. Van Houtte*).
102. Endlicherianum (*L. Van Houtte*).
103. Schottianum (*L. Van Houtte*).



104. *Petschkau* (*L. Van Houtte*).
105. *bohemicum* (*L. Van Houtte*).
106. *Hookerianum* (*L. Van Houtte*).
107. *Eckhautei* (*L. Van Houtte*).
108. *Reichenbachianum* (*L. Van Houtte*).
109. *Fenzlianum* (*L. Van Houtte*).
110. *Duc de Nassau* (Bleu).
111. *Chantini fulgens* (Bleu).
112. *Duc de Morny* (Bleu).
113. *Lamartine* (Bleu).
114. *Mad. Andrieu* (Bleu).
115. *Mad. Houillet* (Bleu).
116. *Thibauti* (Bleu).
117. *cinereum* (*Linden*).
125. *Herbyanum*.
138. *Barral* (Bleu).
139. *Ch. Verdier* (Bleu).
140. *Ed. Moreau* (Bleu).
141. *Isidore Leroy* (Bleu).
142. *Keteleer* (Bleu).
143. *Raulini* (Bleu).
144. *Rossini* (Bleu).
145. *Siebold* (Bleu).
146. *Blancquaerti* (*L. Van Houtte*).
153. *Leopoldi* (*A. Verschaffelt*).
154. *Alphand* (Bleu).
155. *Auguste Rivière* (Bleu).
156. *Bellini* (Bleu).
157. *Dr Lindley* (Bleu).
158. *Duc de Ratibor* (Bleu).
159. *Duchartre* (Bleu).
160. *Mad. Duteil* (Bleu).
161. *Marquise de Cazaux* (Bleu).
162. *Maw Kolb* (Bleu).
163. *Maxime Duval* (Bleu).
164. *Mercadante* (Bleu).
165. *Mozart* (Bleu).

166. *Meyerbeer* (Bleu).
167. *Triomphe de l'exposition de 1867* (Bleu).
168. *Ad. Adam* (Bleu).
169. *Alfred Bleu* (Bleu).
171. *Auber* (Bleu).
172. *Beethoven* (Bleu).
173. *Boieldieu* (Bleu).
174. *De Candolle* (Bleu).
175. *Devinck* (Bleu).
176. *Dr Boisdual* (Bleu).
177. *Edouard André* (Bleu).
178. *E. G. Henderson* (Bleu).
179. *Halévy* (Bleu).
180. *Impératrice Eugénie* (Bleu).
181. *Louis Poirier* (Bleu).
182. *Lucy* (Bleu).
183. *Mars* (Bleu).
184. *Reine Victoria* (Bleu).
185. *Jenningsi* (*Veitch*).
187. *Chelsoni* (*Veitch*).
281. *Adolphe Andrieu* (Bleu).
282. *bicolor fulgens* (Bleu).
283. *Duc de Cleveland* (Bleu).
284. *Ed. Rodrigues* (Bleu).
285. *giganteum* (Bleu).
286. *Napoléon III* (Bleu).
287. *Onslow* (Bleu).
288. *Paillet* (Bleu).
289. *Philippe Hébert* (Bleu).
325. *Jules Putzeys* (Bleu).
327. *Barillet* (Bleu).
328. *Barillet extra* (Bleu).
329. *Herold* (Bleu).
330. *Mistress Dombrain* (Bleu).
331. *mirabile* (Bleu).
332. *Murillo* (Bleu).
333. *Quadricolor* (Bleu).

## Caladium. — DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . 4 francs.

12 — à mon choix . . . . 40 "

25 — — — — — 75 "

315. *Princess Royal* (*Veitch*).
316. *Princess of Wales* (*Veitch*).
318. *Prince of Wales* (*Veitch*).
321. *Prince Albert Edouard* (Bleu).
334. *Ricci* (Bleu).
335. *splendidum* (Bleu).
336. *Velleda* (Bleu).
339. *Laingi* (Bleu).
340. *Leplay* (Bleu).
341. *Lepeschkinei* (Bleu).
342. *Donizetti* (Bleu).
345. *Diane* (Bleu).
346. *Flore* (Bleu).
350. *Rouillard* (Bleu).
352. *Prince of Teck* (*Veitch*).
354. *sanguinolentum*.
370. *Marchandi* (*L. Van Houtte*).

373. *Jean Bogaerts* (*L. Van Houtte*).
376. *rubrum pictum novum*.
398. *Alfred Mame* (Bleu).
399. *Cérès* (Bleu).
400. *Emile Verdier* (Bleu).
402. *Mad. Alfred Mame* (Bleu).
403. *Mad. de la Devansaye* (Bleu).
404. *Mad. Hunebelle* (Bleu).
405. *tricolor* (Bleu).
412. *Thelemanni*.
420. *Albert-Victor* (Bleu).
425. *Proserpine* (Bleu).
426. *Vicomtesse de la Roque Ordan* (Bleu).
429. *Mad. Heine* (Bleu).
430. *Arsinoé* (Bleu).
431. *Souvenir de Mad. Ed. André* (Bleu).
433. *Junon* (Bleu).

**Caladium. — TROISIÈME SÉRIE.**

6 variétés à mon choix. 50 francs.

12 — — 100 "

358. <i>Adnescens</i> ? ( <i>J. Weiss</i> ) . . . 10 francs.	449. <i>Calypso</i> (Bleu) . . . 15 francs.
371. <i>Souvenir de L. Van Houtte</i> (L. V.H.) . . . 15 "	450. <i>Agrippine Dimitri</i> (Bleu) . . 20 "
372. <i>Jacob Weiss</i> (L. Van Houtte) . 10 "	451. <i>Auguste Lemoine</i> (Bleu) . . 15 "
401. <i>Felicien David</i> (Bleu) . . . 10 "	452. <i>Perle du Brésil</i> (Bleu). . . 20 "
421. <i>Rameau</i> (Bleu) . . . 15 "	454. <i>Mistress Laing</i> (Bleu) . . . 15 "
427. <i>Madame Laforge</i> (Bleu) . . . 10 "	466. <i>Clio</i> (Bleu) . . . 20 "
428. <i>Lulli</i> (Bleu) . . . 10 "	457. <i>Virgile</i> (Bleu) . . . 20 "
432. <i>Philippe Schuidt</i> (Bleu) . . . 10 "	468. <i>M. Panchard</i> (Bleu). . . 20 "
434. <i>Mad. Alfred Bleu</i> (Bleu) . . . 10 "	469. <i>Annibal</i> (Bleu) . . . 15 "
435. <i>Aristide</i> (Bleu) . . . 15 "	470. <i>Jupiter</i> (Bleu) . . . 15 "
436. <i>Uranus</i> (Bleu) . . . 10 "	471. <i>L'Albane</i> (Bleu) . . . 20 "
437. <i>Pyrrhus</i> (Bleu) . . . 15 "	472. <i>Comtesse de Berthier</i> (Bleu) . 20 "
438. <i>Euterpe</i> (Bleu) . . . 15 "	477. <i>hybridum</i> ( <i>Williams</i> ) . . . 15 "
439. <i>Louise Duplessis</i> (Bleu) . . . 10 "	478. <i>Léopold II</i> (L. Van Houtte) . 15 "
448. <i>Paul Véronèse</i> (Bleu) . . . 10 "	479. <i>Orgiesi</i> ( <i>L. Van Houtte</i> ) . . 10 "
	480. <i>Rodecki</i> ( <i>L. Van Houtte</i> ) . . 15 "

**AMARYLLIS** (FLORE, XVI, 7 à 13).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y occupe, avec persévérance, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Aussi, ses hybrides ont-ils obtenu de nombreuses médailles d'or aux expositions de Gand, Bruxelles, Liège, Lille, Anvers, etc.

ASSORTIMENT A. 6 belles variétés. 15 francs.	ASSORTIMENT G. 12 belles variétés. 50 francs.
— B. 6 — 25 "	— H. 12 — 60 "
— C. 6 — 40 "	— I. 12 — 75 "
— D. 6 — 50 "	— J. 12 — 100 "
— E. 12 — 30 "	— K. 12 — 125 "
— F. 12 — 40 "	— L. 12 — 200 "

**Gloriosa.**

1866. *Planti* (*Methonica*) (FLORE, IX, 21). Liliacée grimpante de serre chaude, de bizarre structure ; charmantes fleurs d'un rouge aurore à base blanche, divisions enroulées.

*Pièce* : 50 centimes. — *les douze* : 5 francs. — *les 25* : 8 francs. — *le cent* : 25 francs.

**BÉGONIAS TUBÉREUX.**

	Fr. C.		Fr. C.
151. <i>boliviensis</i> (FLORE, XVII, 21) . . . " 50		328. <i>Frœbeli</i> . . . . .	1 "
221. <i>cinnabarina rosea</i> ( <i>Lemoine</i> ) . . . 1 50		Grand bouquet de fleurs d'un écarlate vif.	
155. <i>diversifolia</i> (FLORE, XVIII, 7) . . . " 25		383. <i>Memoria Van Houttei</i> ( <i>Frœbel</i> ) . . 1 "	
156. <i>Evansiana</i> ( <i>discolor</i> ) . . . . . " 50		Tiges florales droites, se couvrant de fleurs d'un amarante velouté vif.	
<i>les six</i> . . . . . 2 "		339. <i>octopetala rosea</i> . . . . . 3 "	
Très-belle fleur d'un carmin clair, très-grand feuillage nervuré de rouge.		231. <i>Pearcei superba</i> . . . . . 1 "	
		174. <i>Wiltoniana</i> . . . . . " 50	



## BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

*Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Lille, Tournai, etc.*

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été, ont vu fleurir en pleine terre les admirables variétés que nous avons obtenues de semis ; ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre. Leurs coloris sont très-variés : on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoisi, le greuat, le naccarat, le vermillon, le pourpre, l'amarante, et toutes les nuances intermédiaires.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau ; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de 0, à la manière des Glâueuls, etc.

## PREMIÈRE SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur. fr. 1-50  
12 — à mon choix . . . „ 12 „

199. Charles Raes (*L. Van Houtte*). Vermillon foncé.
216. Topaze (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif.
222. intermedia (*Veitch*). Très-grande fleur rouge orangé.
223. Léon Plisson (*L. Van Houtte*). Orange.
229. A. Krieger (*L. Van Houtte*). Grande fleur rouge striée.
233. Friedrich Siesmeyer (*L. Van Houtte*). Vermillon feu.
235. Massange de Louvrex (*L. Van Houtte*). Rouge orangé.
238. Vesuvius (*Veitch*). Rose orangé.
244. Mad. Meyer (*L. Van Houtte*). Rose saumoné.
246. Baronne Léon Leguay (*L. Van Houtte*). Rose vif.
299. Corneille (*Lemoine*). Blanc crème nuancé de jaune aurore.
300. Etna (*Lemoine*). Grande fleur écarlate feu.
338. Mont-Blanc (*Fræbel*). Belle fleur blanche.
343. Solfatara (*Fræbel*). Jaune vif.

## DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . 3 francs.  
12 — à mon choix. . . . 24 „

239. Mad. Oscar Lamarche (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un rouge orangé.
243. Paul Masurel (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un beau rose orangé.
262. Baronne Hruby (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un rose pourpré foncé, très-bien faite, de tout premier ordre.
264. James Backhouse (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un rouge corail ; a obtenu le 1<sup>er</sup> prix à l'exposition de Bruxelles.
269. Pearcei vitellina (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien arrondie, d'un orange foncé.
271. Léopold II (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un écarlate vif, pétales latéraux allongés.
280. Mad. Anna Zimmermann (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rose foncé.
352. Hermine (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 45). Très-jolie fleur blanche, bien faite.
355. Comte de Flandre (*L. Van Houtte*). Magnifique grande fleur de la plus belle des formes, pétales larges, bien étalés, bien arrondis, d'un orange saumoné, revers des pétales saumon carminé ; variété de tout premier ordre.
365. Mad. Descat (*L. Van Houtte*). Fleur très-belle, bien faite, pétales larges, blancs, légèrement lavés de rose sur les pétales verticaux.
367. Dr Göppert (*L. Van Houtte*). Fleur très-belle, grande, bien faite, pétales bien arrondis, d'un rose vif, plus clair au centre ; feuilles énormes.
413. Princesse Mestschersky (*L. Van Houtte*) Variété de premier ordre ; fleur très-grande, plate, bien faite, pétales arrondis, d'un carmin clair vif.

445. *Souvenir de Louis Van Houtte* (*Blancquaert et Vermeire*). Très-grande fleur vermillon, pétales arrondis.  
 508. *Souvenir de William Saunders* (*L. Van Houtte*). Fleur blanche teintée d'incarnat, bordée de rose très-pâle.

## TROISIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1880.

Une variété au choix de l'amateur. 5 francs.

Les 8 variétés . . . . . 35 "

360. *Bossuet* (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rose carminé.  
 369. *Massillon* (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur, grande et bien faite, pétales arrondis, d'un rouge saumon très-vif.  
 409. *Fléchier* (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; grande fleur bien faite, pétales arrondis, d'un blanc carné très-tendre.  
 414. *Fénélon* (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; grande fleur plate, bien faite, pétales bien arrondis, d'un carmin très-vif.  
 504. *Pascal* (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un rouge laque carminé.  
 511. *Corneille* (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un écarlate très-vif.  
 513. *Racine* (*L. Van Houtte*). Enorme fleur d'un vermillon vif.  
 597. *Boileau* (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un cramoisi vif.

## QUATRIÈME SÉRIE. — Variétés à fleurs doubles.

281. *Comtesse de Flandre* (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rouge saumoné; variété de premier ordre . . . . . 8 francs.  
 282. *Charles Rogier* (*L. Van Houtte*). Belle fleur moyenne, d'un rouge orangé . . . . . 8 "  
 308. *balsaminæflora* (*Lemoine*). Fleur orange, pétales verticaux larges, pétales latéraux plus courts . . . . . 3 "  
 309. *Gloire de Nancy* (*Lemoine*). Variété splendide, d'un vermillon vif, aigrette d'étamines transformées en plus de 60 pétales . . . . . 8 "  
 310. *Lemoinei* (*Lemoine*). Grande fleur orange vermillonnée . . . . . 7 "  
 314. *Salmonea plena* (*Lemoine*). Grande fleur d'un rose saumoné clair . . . . . 4 "  
 329. *Rachel* (*L. Van Houtte*). Fleur d'un jaune citron vif . . . . . 8 "  
 376. *anemonæflora plena* (*Lemoine*). Fleur corail rose . . . . . 7 "  
 377. *Argus* (*Lemoine*). Fleur d'un vermillon clair . . . . . 5 "  
 411. *Madem. Jeanne Pecquereau* (*L. Van Houtte*). Grande fleur très-bien faite, d'un jaune soufre, centre jaune plus foncé . . . . . 8 "  
 424. *Madem. Henriette Bontez* (*L. Van Houtte*). Fleur écarlate . . . . . 8 "  
 429. *Madem. Valentine de Nocker* (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rose vif, saumoné au centre . . . . . 8 "  
 449. *Comtesse Horace de Choiseul* (*Lemoine*). Fleur pleine comme celle d'un *Camellia*, blanche en s'ouvrant, et passant à une teinte rose claire, presque saumonée . . . . . 10 "  
 453. *pæoniæflora* (*Lemoine*). Enorme fleur très-pleine, de forme Pivoine, rose de Chine saumoné; longs pédoncules fléchissant sous le poids des fleurs . . . . . 8 "  
 465. *Louis Bouchet* (*Bouchet*). Fleur très-pleine, d'un rouge orange vif . . . . . 8 "  
 466. *Marie Bouchet* (*Bouchet*). Fleur énorme, très-pleine, d'un rouge cocciné foncé . . . . . 7 "  
 622. *Miracle* (*Lemoine*). Fleur d'un beau rouge solferino . . . . . 8 "

## CINQUIÈME SÉRIE. — Nouveautés à fleurs doubles, de 1880.

Une variété au choix de l'amateur. 12 francs.

Les 8 variétés . . . . . 80 "

571. *Le Dante* (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur bien faite, conique, très-double, d'un vermillon vif.  
 577. *Le Tasse* (*L. Van Houtte*). Fleur d'un beau carmin clair.  
 583. *Arioste* (*L. Van Houtte*). Fleur d'un rose carminé.



615. *Boccace* (*L. Van Houtte*). Fleur blanche légèrement teintée d'incarnat.  
 616. *Cervantes* (*L. Van Houtte*). Fleur bien double, d'un cramoisi vif.  
 649. *Calderon* (*L. Van Houtte*). Fleur bien double, ressemblant à une Rose-trémière, d'un rose foncé.  
 658. *Lopez de Vega* (*L. Van Houtte*). Variété bizarre, très-distinguée; pétales extérieurs blancs, légèrement carnés sur les bords, pétales du centre portant à leurs extrémités des papilles oranges; fleurs agglomérées, cinq par cinq, en racème de forme pentagonale.  
 682. *Camoens* (*L. Van Houtte*). Jolie fleur d'un écarlate foncé.

BÉGONIAS TUBÉREUX ayant déjà fleuri, en superbe mélange.

*Les douze* : 5 francs. — *Les vingt-cinq* : 8 francs. — *Les cinquante* : 14 francs. — *Le cent* : 25 francs.

## BEGONIA DISCOLOR REX.

*Pièce* : fr. 1-50.

- |  |   |
|--|---|
| 539. <i>Madame Svahn</i> ( <i>Svahn</i> ). | 544. <i>W. E. Gumbleton</i> ( <i>Svahn</i> ).       |
| 540. <i>Souvenir du Dr Weddell</i> (n).    | 545. <i>Comtesse Gab. de Clermont-Tonnerre</i> (n). |
| 541. <i>Lucienne Bruant</i> (n).           | 546. <i>Marguerite Bruant</i> (n).                  |
| 542. <i>Edouard André</i> (n).             | 627. <i>Palais Rameau</i> ( <i>L. De Smet</i> ).    |
| 543. <i>A. Carrière</i> (n).               |   |

Cette nouvelle race de Bégonias, issue d'un heureux croisement entre le *B. discolor* et les variétés à beau feuillage du *Begonia Rex*, que l'on cultive en serre tempérée, a fait sensation dans le monde horticole. Elle participe des qualités essentielles des deux parents : elle a la vigueur, le port élégant et la floraison du *B. discolor*, avec le beau feuillage panaché des variétés du *B. Rex*. Mis en pleine terre, l'été, ou cultivés en pots, de préférence à mi-ombre, ces nouveaux Bégonias y prennent un accroissement rapide; en massifs, dans les jardins, ou en pots, en serre, ils feront partout merveille.

BÉGONIAS HERBACÉS à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc.

12 belles variétés à notre choix. 10 francs.

25 — — — — — 20 "

## DAHLIAS D'ÉLITE.

Nous avons éliminé de notre collection toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre; celles que nous offrons ici sont livrables en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pour les noms et descriptions, voir notre Catalogue n° 187, pages 133 à 137.

### PREMIÈRE SÉRIE.

12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs. — 50 variétés : 35 francs.

### DEUXIÈME SÉRIE.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs. — 50 variétés : 35 francs.

### DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

*Pièce* : 75 centimes. — 12 plantes : 8 francs. — 25 plantes : 15 francs.

1557. *Colibri*. Fleur écarlate, avec un petit bouton vert au centre. (*Boutures en mai*).  
 1722. *alba nana*. Fleur d'un blanc pur, de forme parfaite.  
 1725. *Solfatara*. Fleur d'un jaune vif.

Les trois variétés ci-dessus sont très-propres à former des corbeilles; leur taille n'atteignant que 50 centimètres de hauteur, ils n'ont pas besoin de tuteur. Leur floraison est abondante; leurs coloris, nets et tranchés, produisent un superbe effet.

## DAHLIA VERT (FLORE, XIX, III).

1595. vert (*Sieckmann*). — *Pièce* : 1 franc. — *Les douze* : 10 francs.

Fleurs pleines, entièrement vertes.

(SUPPLÉMENT à la page 47, article **POIS**.)

## NOUVEAU POIS RIDÉ.

*Merveille d'Amérique (Bliss).*

Cette variété est la plus précoce, la plus naine, la plus productive et la meilleure pour forcer.

Les plantes s'élèvent à une hauteur de 18 centimètres seulement et produisent, malgré leur taille lilliputienne, des cosses en nombre presque incroyable. Une seule plante porte 10 à 12 et parfois même 15 cosses, renfermant 6 à 9 gros et beaux grains. Cette nouveauté possède non-seulement toutes les bonnes qualités bien connues des variétés *Champion* et *Little Gem*, mais elle est supérieure en qualité à la première et surpasse de beaucoup en rapport la seconde; elle est, en outre, la plus hâtive de toutes les variétés à grains ridés. Son feuillage vert foncé lui prête une jolie apparence.

En raison de tous ces avantages, elle mérite d'être partout répandue; pour les jardins potagers de peu d'étendue, ce sera le Pois par excellence.

Cette nouveauté a été primée à plusieurs reprises.

PRIX, par paquet de 100 grammes : 3 francs.

## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.


Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune

garçon de quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.





## TABLE ALPHABÉTIQUE.

## GRAINES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	55	Aphelandra . . . . .	30	Beet, voir Betterave . . . . .	40
Abronia . . . . .	20	Aquatiques . . . . .	38	Begonia . . . . .	30
Abutilon . . . . .	29	Aquilegia . . . . .	25	Belle-de-jour (Convol-	
Acacia . . . . .	29	Arabis . . . . .	25	vulus) . . . . .	4
Acanthus . . . . .	25	Aralia . . . . .	30	— grimpante (Ipomœa) . . . . .	4
Acer . . . . .	55	Arbousier, voir Arbutus . . . . .	56	Belle-de-nuit . . . . .	4
Achillea . . . . .	25	Arbre de Judée, voir Cercis . . . . .	56	Bellis . . . . .	26
Aconitum . . . . .	25	Arbres et Arbustes . . . . .	55	Benincasa . . . . .	6
Acroclinium . . . . .	20	Arbutus . . . . .	56	Bertolonia . . . . .	30
Adiantum . . . . .	35	Areca . . . . .	36	Beta, voir Poirée . . . . .	14
Adonis . . . . .	30	Arenaria . . . . .	26	Betonica . . . . .	26
Æchmea . . . . .	29	Arenga . . . . .	36	Bette, voir Poirée . . . . .	14
Agapanthus . . . . .	39	Argemone . . . . .	20	Betterave . . . . .	40 et 51
Agave . . . . .	29	Aristolochia . . . . .	30	Bignonia . . . . .	53
Ageratum . . . . .	20	Armeria . . . . .	26	Billbergia . . . . .	30
Agrostemma . . . . .	20	Arroche . . . . .	40	Biota . . . . .	56
Agrostis . . . . .	19 et 53	Artichaut . . . . .	40	Blätterkohl . . . . .	6
Ail . . . . .	50	Arum . . . . .	39	Blechnum . . . . .	35
Aira . . . . .	19 et 53	Arundinaria . . . . .	19 et 30	Bluet, voir Centaurea . . . . .	21
Alisma . . . . .	38	Arundo . . . . .	19	Blumenrohr, voir Balisier . . . . .	4
Allium . . . . .	39	Asclepias . . . . .	26	Bobartia . . . . .	39
Alkekenge . . . . .	30	Asparagus . . . . .	40	Bocconia . . . . .	26
Alocasia . . . . .	29	Asperge . . . . .	40	Bois de Sainte-Lucie, voir	
Aloe . . . . .	29	Asperula . . . . .	20	Cerasus Mahaleb . . . . .	56
Alonsoa . . . . .	20	Asphodelus . . . . .	26	Bonapartea . . . . .	30
Alopecurus . . . . .	54	Aspidium . . . . .	35	Bonnet d'électeur, voir	
Alpiste . . . . .	53	Asplenium . . . . .	35	Courge Patisson . . . . .	44
Alstroemeria . . . . .	39	Assortiments d'annuelles . . . . .	25	— turc, voir Courge	
Althœa, voir Rose-tremière . . . . .	17	— de Fougères . . . . .	36	Giraumon . . . . .	44
Alyssum . . . . .	20 et 25	— de plantes bulbeuses . . . . .	40	Borassus . . . . .	36
Amarantoïdes . . . . .	2	— de plantes de serres . . . . .	34	Bordures (Annuelles pour) . . . . .	25
Amarantus . . . . .	20	— de vivaces . . . . .	28	— (Vivaces pour) . . . . .	23
Amaryllis . . . . .	30	Astern, voir Reine-Mar-		Borecole, voir Chou frisé . . . . .	6
Ammobium . . . . .	20	guerite . . . . .	15	Botryanthus . . . . .	39
Anchusa . . . . .	20	Athyrium . . . . .	35	Bouquet parfait, voir Dian-	
Ancolie, voir Aquilegia . . . . .	25	Aubépine, voir Cratægus . . . . .	56	thus barbatus . . . . .	21
Andropogon . . . . .	19	Aubergine . . . . .	50	Brachycome . . . . .	30
Anemia . . . . .	35	Aubrieta . . . . .	26	Brassica, voir Chou d'orne-	
Anemone . . . . .	25 et 39	Auricule, voir Primula . . . . .	27	ment . . . . .	6
Aneth . . . . .	50	Avena, voir Fromental . . . . .	54	Bravoa . . . . .	39
Angélique . . . . .	50	Azalea rustique de Gand . . . . .	56	Briza . . . . .	19
Angelonia . . . . .	30	— indica . . . . .	30	Brocoli, voir Chou Brocoli . . . . .	43
Angiopteris . . . . .	35	— mollis . . . . .	56	Brodiaea . . . . .	39
Anigosanthus . . . . .	30	Babiana . . . . .	39	Brome . . . . .	19 et 53
Anis . . . . .	50	Bachelor's Button . . . . .	2	Bromus . . . . .	19 et 53
Annuelles . . . . .	2 et 20	Balisier . . . . .	4	Broussonetia . . . . .	56
— collections . . . . .	25	Ballota . . . . .	26	Bryonopsis . . . . .	30
— à feuilles ornementales . . . . .	25	Balsamine . . . . .	3	Buddleia . . . . .	56
— à fleurs odorantes . . . . .	25	Bambusa . . . . .	19 et 30	Buisson ardent, voir Cra-	
— grimpantes . . . . .	25	Bananier, voir Musa . . . . .	33	tægus . . . . .	56
— Immortelles . . . . .	25	Baptisia . . . . .	26	Bulbeuses . . . . .	39
— pour bordures . . . . .	25	Barbacia . . . . .	30	Bulbocodium . . . . .	39
— pour groupes . . . . .	25	Barbe de Capucin, voir Chi-		Bulbous plants . . . . .	39
Anona . . . . .	30	corée sauvage . . . . .	42	Cabbage, voir Chou pommé . . . . .	42
Anthericum . . . . .	25	Barbeau, voir Centaurea . . . . .	21	— Lettuce, voir Laitue . . . . .	45
Anthoxanthum . . . . .	54	Bartonia . . . . .	20	Caladium . . . . .	30
Anthurium . . . . .	30	Basilic . . . . .	50	Calandrinia . . . . .	20
Antigonon . . . . .	30	Beans, voir Fève de marais . . . . .	44	Calceolaire . . . . .	30
Antirrhinum, voir Mufliers . . . . .	10	Beaucarnea . . . . .	30	Calendula . . . . .	20

	Pages.		Pages.		Pages.
Calliprora . . . . .	39	Cinénaire . . . . .	21 et 31	Cytisus . . . . .	31 et 57
Callirrhoe . . . . .	21	Cineraria . . . . .	21 et 31	Daboeia . . . . .	57
Callistephus, voir <i>Reins-</i>		Citronnelle . . . . .	50	Dactylis . . . . .	53
<i>Marguerite</i> . . . . .	15	Clarkia . . . . .	21	Dahlia . . . . .	39
Callitris . . . . .	56	Claytone . . . . .	43	<i>Dandelion</i> , voir <i>Pissenlit</i> .	47
Calochortus . . . . .	39	Clematis . . . . .	56	Dasyllirion . . . . .	31
Calycanthus . . . . .	56	Cleome . . . . .	21	Datura . . . . .	21 et 31
Camassia . . . . .	39	Clianthus . . . . .	31	Daubentonia . . . . .	31
Campanula . . . . .	5, 21 et 26	Clitoria . . . . .	31	Delphinium . . . . .	13, 21 et 26
<i>Campanule Carillon</i> . . . .	5	Cobæa . . . . .	21	Dianthus . . . . .	21 et 27
Camptosema . . . . .	31	Coccinea . . . . .	6	Dictamnus . . . . .	26
Campyloneuron . . . . .	35	<i>Cockscomb</i> , voir <i>Crête de Coq</i>	7	Didymocarpus . . . . .	31
<i>Canche</i> . . . . .	53	Cocos . . . . .	36	Didiscus . . . . .	21
Canna, voir <i>Balister</i> . . . .	4	Cœlestina . . . . .	21	Diervilla, voir <i>Weigelia</i> .	58
<i>Cantaloup</i> , voir <i>Melon</i> . . .	45	Coix . . . . .	19	Digitalis . . . . .	26
Capsicum, voir <i>Piment</i> . . .	14	Colchicum . . . . .	39	Dipladenia . . . . .	31
<i>Capucine</i> . . . . .	5	Coleus . . . . .	31	Diplazium . . . . .	35
<i>Capucinerkresse</i> , voir <i>Capu-</i>		Colletia . . . . .	31	Dirœa, voir <i>Gesneria</i> . . .	32
<i>cine</i> . . . . .	5	Collinsia . . . . .	21	Disemma . . . . .	31
Cardon . . . . .	40	Colocasia . . . . .	31	Dracæna . . . . .	31
Carduus . . . . .	21	Commelyna . . . . .	39	Drococephalum . . . . .	26
Carica . . . . .	31	<i>Concombre</i> . . . . .	43	Dyckia . . . . .	32
<i>Carnation</i> , voir <i>Œillet</i> . . .	27	<i>Concombre Serpent</i> , voir		Eccremocarpus . . . . .	26
<i>Carotte</i> . . . . .	41 et 51	<i>Cucumis</i> . . . . .	6	<i>Echalotte</i> . . . . .	44
Caryota . . . . .	36	— <i>minor</i> . . . . .	21	Echeveria . . . . .	32
Cassia . . . . .	31	<i>Condiments (Plantes pour)</i> .	50	Echinacea . . . . .	26
<i>Castor Oil Plant</i> , voir		Convolvulus tricolor, voir		Echites, voir <i>Mandevillea</i> .	33
<i>Palma-Christi</i> . . . . .	11	<i>Belle-de-jour</i> . . . . .	4	Echium . . . . .	21 et 26
Catalpa . . . . .	56	— <i>miror</i> . . . . .	21	<i>Egg Plant</i> , voir <i>Aubergine</i> .	50
Catananche . . . . .	26	Copernicia . . . . .	37	Elæis . . . . .	37
<i>Cauliflower</i> , voir <i>Chou-Fleur</i>	43	<i>Coquelourde</i> , voir <i>Agros-</i>		<i>Endive</i> , voir <i>Chicorée</i> . . .	41
Ceanothus . . . . .	56	<i>temma</i> . . . . .	20	Epacris . . . . .	32
Cedrus . . . . .	56	<i>Coqueret</i> , voir <i>Physalis</i> . .	23	<i>Epinard</i> . . . . .	44
<i>Cèleri</i> . . . . .	41	<i>Corbeille d'argent</i> , voir		— <i>de la Nouvelle-Zélande</i> ,	
Celosia, voir <i>Crête-de-Coq</i> .	7	<i>Alyssum maritimum</i> . . .	20	voir <i>Tétragone</i> . . . . .	50
Centaurea . . . . .	21 et 26	Coreopsis . . . . .	21 et 26	<i>Epine</i> , voir <i>Cratægus</i> . . .	56
Cephalaria . . . . .	26	<i>Cornaret</i> , voir <i>Martynia</i> . .	23	<i>Érable</i> , voir <i>Acer</i> . . . . .	55
Cephalotaxus . . . . .	56	<i>Corn Salad</i> , voir <i>Mâche</i> . .	45	Eremostachys . . . . .	26
Cerastium . . . . .	26	<i>Cornichon</i> , voir <i>Concombre</i> .	43	Erigeron . . . . .	26
Cerasus . . . . .	56	Corydalis . . . . .	26	Erinus, voir <i>Nycterinia</i> . .	23
Cercis . . . . .	56	Corypha . . . . .	37	Erodium . . . . .	22
<i>Cerfeuil</i> . . . . .	41 et 50	<i>Cos Lettuce</i> , voir <i>Laitue</i> . .	45	Eryngium . . . . .	26
<i>Cerise en chemise</i> , voir <i>Phy-</i>		Cosmidium . . . . .	21	Erythrina . . . . .	32
<i>salis</i> . . . . .	23	<i>Courge comestible</i> . . . . .	44	Erythronium . . . . .	39
Chamecyparis . . . . .	56	— <i>d'ornement</i> . . . . .	6	Eschscholtzia . . . . .	22
Chamædorea . . . . .	26	Crambe, voir <i>Chou-marin</i> . .	43	<i>Estragon</i> . . . . .	50
Chamepeuce . . . . .	26	Cratægus . . . . .	56	Eucalyptus . . . . .	32
Chamærops . . . . .	36	Cresson . . . . .	50	Eulalia . . . . .	19
<i>Champignon (Blanc de)</i> . . .	41	<i>Crête-de-Coq</i> . . . . .	7	Eupatorium . . . . .	32
Chardon, voir <i>Carduus</i> . . .	21	<i>Crételle</i> . . . . .	53	Euphorbia . . . . .	22
Cheiranthus . . . . .	7 et 21	Crocus . . . . .	39	Euterpe . . . . .	37
Chelidonium . . . . .	26	<i>Croix de Jérusalem</i> , voir		<i>Everlasting Flower</i> . . . .	10
Chelone . . . . .	26	<i>Lychnis</i> . . . . .	27	Fagelia . . . . .	32
Chenille . . . . .	50	Croton . . . . .	31	<i>Faux-Ébénier</i> , voir <i>Cytisus</i>	
<i>Chervil</i> , voir <i>Cerfeuil</i> . . .	41	Cryptomeria . . . . .	56	<i>Laburnum</i> . . . . .	57
<i>Chicorée</i> . . . . .	41 et 51	Cucumis . . . . .	6 et 26	<i>Federmohn</i> , voir <i>Pavot</i> . .	11
<i>Chimonanthe</i> , voir <i>Caly-</i>		Cucurbita . . . . .	6 et 26	<i>Fennel</i> , voir <i>Fenouil</i> . . .	50
<i>canthus</i> . . . . .	56	<i>Culinary Seeds</i> . . . . .	40	<i>Fenouil</i> . . . . .	50
<i>China Aster</i> , voir <i>Reine-</i>		Cunninghamia . . . . .	56	Ferdinanda . . . . .	32
<i>Marguerite</i> . . . . .	15	Cuphea . . . . .	21 et 31	Festuca . . . . .	53
Chloris . . . . .	19	Cupressus . . . . .	56	<i>Fétuque</i> . . . . .	53
Chloropsis . . . . .	19	Cyathea . . . . .	35	<i>Fève de marais</i> . . . . .	44
Chorizema . . . . .	31	Cyclamen . . . . .	39	Ficus . . . . .	32
<i>Chou comestible</i> . . . . .	42 et 51	Cyclanthera . . . . .	6	<i>Flemish Carnation</i> , voir	
— <i>d'ornement</i> . . . . .	6	Cynoglossum, voir <i>Ompha-</i>		<i>Œillet Flamand</i> . . . . .	27
Chrysanthemum . . . . .	21 et 31	<i>lodes</i> . . . . .	23	<i>Fiéole</i> . . . . .	54
Cibotium . . . . .	35	Cynosurus, voir <i>Crételle</i> . .	53	<i>Fleur de la passion</i> , voir	
<i>Ciboule</i> . . . . .	43	Cyperus . . . . .	38	<i>Passiflora</i> . . . . .	33
<i>Ciboulette</i> . . . . .	50	Cyprés, voir <i>Cupressus</i> . .	56	<i>Flouwe</i> . . . . .	54
		Cystopteris . . . . .	35		



	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Forcing Peas</i> , voir <i>Pois</i> . . .	47	<i>Hedysarum</i> . . . . .	32	<i>Kohlrabi</i> , voir <i>Chou-Rave</i> . .	43
<i>Forget-me-not</i> , voir <i>Myosotis</i> . . . . .	11 et 23	<i>Helenium</i> . . . . .	27	<i>Kugel-Amarant</i> . . . . .	2
<i>Fortunea</i> . . . . .	32	<i>Helianthus</i> . . . . .	22 et 27	<i>Lagurus</i> . . . . .	20
<i>Fougères</i> . . . . .	35	<i>Helichrysum</i> , voir <i>Immortelles</i> . . . . .	10	<i>Laitue</i> . . . . .	45
— <i>collections</i> . . . . .	36	<i>Heliotrope</i> . . . . .	9	<i>Lamarckia</i> . . . . .	20
<i>Fourragères (Plantes)</i> . . . . .	51	<i>Helleborus</i> . . . . .	27	<i>Lantana</i> . . . . .	33
— ( <i>Graminées</i> ) . . . . .	53	<i>Helonias</i> . . . . .	27	<i>Larix</i> . . . . .	57
<i>Francoa</i> . . . . .	26	<i>Hemerocallis</i> . . . . .	27	<i>Larkspur</i> , voir <i>Pied-d'alouette</i> . . . . .	13, 21 et 26
<i>Fraxinelle</i> , voir <i>Dictamnus</i> . . . . .	26	<i>Hemionitis</i> . . . . .	35	<i>Lastrea</i> . . . . .	35
<i>Frenela</i> . . . . .	57	<i>Heracleum</i> . . . . .	27	<i>Latania</i> . . . . .	37
<i>Fritillaria</i> . . . . .	39	<i>Herbe des Pampas</i> , voir <i>Gynerium</i> . . . . .	19	<i>Lathyrus</i> . . . . .	14, 22 et 27
<i>Fromental</i> . . . . .	54	<i>Herbes d'ornement</i> . . . . .	19	<i>Laurier-Amandier</i> , voir <i>Cerasus Lauro-Cerasus</i> . . . . .	56
<i>Fuchsia</i> . . . . .	32	— <i>fourragères</i> . . . . .	53	— <i>rose</i> , voir <i>Nerium</i> . . . . .	33
<i>Funkia</i> . . . . .	26	— <i>pour pelouses</i> . . . . .	55	<i>Lavande</i> . . . . .	50
<i>Gaillardia</i> . . . . .	22 et 23	<i>Herisson</i> . . . . .	50	<i>Leaf Beet</i> , voir <i>Poirée</i> . . . . .	47
<i>Gainier</i> , voir <i>Cercis Siliquastrum</i> . . . . .	56	<i>Hesperis</i> . . . . .	27	<i>Leek</i> , voir <i>Porreau</i> . . . . .	49
<i>Galtonia</i> , voir <i>Hyacinthus</i> . . . . .	39	<i>Hexacentris</i> . . . . .	32	<i>Légumes</i> . . . . .	40
<i>Gaultheria</i> . . . . .	57	<i>Hibiscus</i> . . . . .	27, 32 et 57	<i>Leptochloa</i> . . . . .	20
<i>Gazon anglais</i> , v. <i>Rye Grass</i> . . . . .	54	<i>Hieracium</i> . . . . .	27	<i>Leptosiphon</i> . . . . .	22
<i>Gazon d'Olympe</i> , voir <i>Armeria</i> . . . . .	26	<i>Himantophyllum</i> . . . . .	32	<i>Levhoyen</i> , voir <i>Giroflée</i> . . . . .	7
<i>Gehölzsamen</i> . . . . .	55	<i>Hippeastrum</i> , voir <i>Amaryllis</i> . . . . .	30	<i>Libocedrus</i> . . . . .	57
<i>Geissorrhiza</i> . . . . .	39	<i>Holcus</i> . . . . .	54	<i>Libonia</i> . . . . .	33
<i>Gemüsesamen</i> . . . . .	40	<i>Hollyhocks</i> , voir <i>Rose-tremière</i> . . . . .	17	<i>Lilium</i> . . . . .	39
<i>Genévrier</i> , voir <i>Juniperus</i> . . . . .	57	<i>Hordeum</i> . . . . .	20	<i>Limaçon</i> . . . . .	50
<i>Genista</i> . . . . .	32	<i>Houque</i> . . . . .	54	<i>Linaria</i> . . . . .	22
<i>Gentiana</i> . . . . .	26	<i>Howe</i> , voir <i>Ilex</i> . . . . .	57	<i>Linum</i> . . . . .	22 et 27
<i>Geonoma</i> . . . . .	37	<i>Hovea</i> . . . . .	32	<i>Lis</i> , voir <i>Lilium</i> . . . . .	39
<i>Geranium</i> . . . . .	26 et 33	<i>Humea</i> . . . . .	22	<i>Liseron</i> , voir <i>Belle-de-jour</i> . . . . .	4
<i>Gesneria</i> . . . . .	32	<i>Hyacinthus</i> . . . . .	39	<i>Litobrochia</i> . . . . .	35
<i>Geum</i> . . . . .	23	<i>Hydrolea</i> . . . . .	38	<i>Livèche</i> . . . . .	50
<i>Gewächshauspflanzen</i> . . . . .	29	<i>Hymenodium</i> . . . . .	35	<i>Livistona</i> , voir <i>Corypha</i> . . . . .	37
<i>Gilia</i> , voir <i>Leptosiphon</i> . . . . .	22	<i>Hyophorbe</i> . . . . .	37	<i>Loasa</i> . . . . .	22
<i>Ginkgo</i> . . . . .	57	<i>Hysope</i> . . . . .	50	<i>Lobelia</i> . . . . .	22
<i>Giramon</i> , voir <i>Courge</i> . . . . .	44	<i>Iberis</i> . . . . .	22 et 27	<i>Lolium</i> . . . . .	54
<i>Giroflée</i> . . . . .	7	<i>Ice Plant</i> , voir <i>Mesembryanthemum</i> . . . . .	23	<i>Lomaria</i> . . . . .	35
<i>Glaciale</i> , voir <i>Mesembryanthemum</i> . . . . .	23	<i>Ilex</i> . . . . .	57	<i>Lomatia</i> . . . . .	33
<i>Gladiolus</i> . . . . .	39	<i>Immortelles</i> . . . . .	10	<i>Long Radish</i> , voir <i>Rave</i> . . . . .	50
<i>Gloxinia</i> . . . . .	32	— voir <i>Acroclinium</i> , <i>Rodanthe</i> , <i>Xeranthemum</i> . . . . .	20, 24 et 25	<i>Lophospermum</i> . . . . .	38
<i>Gnaphalium</i> . . . . .	22	<i>Impatiens</i> , voir <i>Balsamine</i> . . . . .	3	<i>Lotier</i> . . . . .	52
<i>Godetia</i> . . . . .	22	<i>Indian Shot</i> , voir <i>Balisier</i> . . . . .	4	<i>Löwenmaul</i> , voir <i>Mufler</i> . . . . .	10
<i>Goldlack</i> , voir <i>Giroflée</i> . . . . .	9	<i>Indigofera</i> . . . . .	32 et 57	<i>Luffa</i> . . . . .	6
<i>Ravenelle</i> . . . . .	9	<i>Indigotier</i> , voir <i>Indigofera</i> . . . . .	32 et 57	<i>Lupin</i> . . . . .	22 et 27
<i>Gomphrena</i> , voir <i>Amarantoides</i> . . . . .	2 et 22	<i>Inga</i> . . . . .	32	<i>Lupinus</i> . . . . .	22 et 27
<i>Goniophebiun</i> . . . . .	35	<i>Ionopodium</i> . . . . .	22	<i>Lupuline</i> . . . . .	52
<i>Gourds</i> , voir <i>Courge</i> . . . . .	6 et 44	<i>Ipomoea</i> . . . . .	22 et 32	<i>Luzerne</i> . . . . .	52
<i>Goyavier</i> , voir <i>Psidium</i> . . . . .	34	<i>Ipomopsis</i> . . . . .	22	<i>Lychnis</i> . . . . .	27
<i>Graminées ornementales</i> . . . . .	19	<i>Iris</i> . . . . .	39	<i>Lysimachia</i> . . . . .	27
— <i>fourragères</i> . . . . .	53	<i>Isotoma</i> . . . . .	22	<i>Macadamia</i> . . . . .	33
— <i>pour pelouse</i> . . . . .	55	<i>Ivaie</i> , voir <i>Rye Grass</i> . . . . .	54	<i>Mâche</i> . . . . .	45
<i>Greenhouse and Stove Plants</i> . . . . .	29	<i>Ixia</i> . . . . .	39	<i>Maïs</i> . . . . .	20 et 52
<i>Grevillea</i> . . . . .	32	<i>Jacaranda</i> . . . . .	33	<i>Malope</i> . . . . .	23
<i>Gueule de lion</i> , voir <i>Mufler</i> . . . . .	10	<i>Jacoea</i> , voir <i>Senegon</i> . . . . .	18	<i>Mandevillea</i> . . . . .	33
<i>Gunnera</i> . . . . .	26	<i>Jubaea</i> . . . . .	37	<i>Marguerite</i> , voir <i>Reine-Marguerite</i> . . . . .	15
<i>Gymnogramma</i> . . . . .	35	<i>Julienne de Mahon</i> , voir <i>Cheiranthus maritimus</i> . . . . .	21	<i>Marjolaine</i> . . . . .	50
<i>Gymnothrix</i> . . . . .	19	<i>Juniperus</i> . . . . .	57	<i>Martynia</i> . . . . .	23
<i>Gynerium</i> . . . . .	19	<i>Kale</i> , voir <i>Chou non pommé</i> . . . . .	43	<i>Marvel of Peru</i> , voir <i>Belle-de-nuit</i> . . . . .	4
<i>Gypsophila</i> . . . . .	22 et 26	<i>Kalmia</i> . . . . .	57	<i>Mastouche</i> , voir <i>Capucine</i> . . . . .	5
<i>Hahnenkämme</i> , voir <i>Crête-de-Cog</i> . . . . .	7	<i>Kennedya</i> . . . . .	33	<i>Matricaria</i> . . . . .	23
<i>Hakea</i> . . . . .	32	<i>Ketmie</i> , voir <i>Hibiscus</i> . . . . .	57	<i>Maurandia</i> . . . . .	33
<i>Hardenbergia</i> . . . . .	32	<i>Kidney Beans</i> , voir <i>Haricot</i> . . . . .	44	<i>Méleze</i> , voir <i>Larix</i> . . . . .	57
<i>Haricot</i> . . . . .	44			<i>Melisse</i> , voir <i>Citronnelle</i> . . . . .	50
— <i>d'Espagne</i> , voir <i>Phaseolus</i> . . . . .	23			<i>Melon</i> . . . . .	45



	Pages.		Pages.		Pages.
Methonica . . . . .	39	Parsnip, voir Panais . . .	46	Portulaca . . . . .	14
Michauxia . . . . .	27	Passe-rose, voir Rose-		Potagères . . . . .	40
Microlepis . . . . .	35	trémière . . . . .	17	Potatoes . . . . .	58
Millet . . . . .	54	Passiflora . . . . .	33	Potentilla . . . . .	27
Mimosa . . . . .	33	Pastèque, voir Melon d'eau.	46	Potiron, voir Courge	44
Mimulus . . . . .	23	Paturin . . . . .	54	Pourpier comestible . .	49
Minette dorée, voir Lupuline	52	Paulownia . . . . .	57	— d'ornement . . . .	14
Mirabilis Jalapa, voir Belle-		Pavetta . . . . .	33	Primevère . . . . .	27 et 33
de-nuit . . . . .	4	Pavot . . . . .	11, 23 et 27	Primula . . . . .	27 et 33
Miroir de Vénus, voir Cam-		Peas, voir Pois . . . . .	47	Pritchardia . . . . .	38
panule Carillon . . . . .	5	Pelargonium . . . . .	33	Prunella . . . . .	28
Momordica . . . . .	6	Pennisetum . . . . .	20	Psidium . . . . .	34
Moræa . . . . .	39	Pensee . . . . .	12	Ptelea . . . . .	58
Morelle, voir Solanum . . .	24	Pentstemon . . . . .	27	Pteris . . . . .	35
Morina . . . . .	27	Pepper . . . . .	14	Pumpkin, voir Courge .	43
Morus . . . . .	57	Perennials, voir Vivaces .	25	Purslain, voir Pourpier.	14 et 49
Moutarde . . . . .	51	Perilla . . . . .	23	Puschkinia . . . . .	40
Muflier . . . . .	10	Pernettya . . . . .	57	Puya . . . . .	34
Murier, voir Morus . . . .	57	Persicaire, voir Polygonum	23	Pyrethrum . . . . .	23 et 28
— à papier, voir Brous-		Persil . . . . .	46	Pyrus . . . . .	58
sonetia . . . . .	56	Perovche, voir Vinca . . .	34	Quamoclit, voir Ipomœa	22
Musa . . . . .	33	Petunia . . . . .	23	Quarantaine, voir Giroflée.	7
Myosotis . . . . .	11 et 23	Phalaris . . . . .	38 et 53	Queue de Renard, voir Ama-	
Nægelia . . . . .	33	Pharbitis, voir Belle-de-		rantus . . . . .	20
Narcissus . . . . .	40	jour . . . . .	4	Radis . . . . .	49
Nasturtium, voir Capucine .	5	Phaseolus . . . . .	23 et 33	Raifort . . . . .	51
Navet . . . . .	46 et 52	Phleum, voir Fléole . . .	54	Ranunculus . . . . .	40
Nelumbium . . . . .	38	Phlox . . . . .	12, 23 et 27	Rave . . . . .	50
Nemastylis . . . . .	40	Phœnicophorium . . . . .	37	— (Chou) . . . . .	43
Nemophila . . . . .	23	Phoenix . . . . .	37	Ravenala . . . . .	34
Ne m'oubliez pas, voir		Phormium . . . . .	33	Ravenelle, voir Giroflée.	9
Myosotis . . . . .	11 et 23	Physalis . . . . .	23	Reine-Marguerite . . .	15
Nephrolepis . . . . .	35	Phyteuma . . . . .	27	Reseda . . . . .	24
Nerium . . . . .	33	Pied-d'alouette (Delphi-		Retinospora . . . . .	58
Nicotiana . . . . .	23	nium) . . . . .	13, 21 et 26	Rhaponticum . . . . .	28
Nothochlæna . . . . .	35	Pimelea . . . . .	33	Rheum . . . . .	28
Nycterina . . . . .	23	Piment . . . . .	14 et 51	Rhodanthe . . . . .	24
Nymphæa . . . . .	38	Pimpernelle . . . . .	51	Rhododendron . . . .	34 et 58
Œillet, voir Dianthus 21 et	21	Pin, voir Pinus . . . . .	57	Rhubarbe . . . . .	28 et 50
— de Chine (n) . . . . .	21	Pink, voir Œillet de fan-		Ricinus, voir Palma-Christi	11
— d'Inde, voir Tagetes . .	24	taisie . . . . .	27	Rittersporn, voir Pied-	
— de poète, voir Dianthus		Pinus . . . . .	57	d'alouette . . . . .	13, 21 et 26
barbatus . . . . .	21	Pissenlit . . . . .	47	Romaine, voir Laitue romaine	45
Œnothéra . . . . .	27	Plante à musc, voir Mim-		Romarin . . . . .	51
Oignon . . . . .	46	lus moschatus . . . . .	23	Rose-trémière . . . . .	17
Omphalodes . . . . .	23	— aux œufs, voir So-		Runners, voir Haricot .	44
Orach, voir Arrcche . . . .	40	lanum Melongena . . .	24	Rutabaga, voir Chou-Navet	52
Oreodoxa . . . . .	37	Plantes de serres . . . .	29	Rye Grass . . . . .	54
Orge, voir Hordeum . . . .	20	Poa . . . . .	20 et 54	Sabal . . . . .	38
Origan . . . . .	51	Podocarpus . . . . .	33	Sage, voir Salvia 24, 28, 34 et	51
Ornamental Grasses . . . .	19	Podophyllum . . . . .	27	Salade de Ué, voir Mâche .	45
— Gourds . . . . .	6	Poinciana . . . . .	33	Salisbury, voir Ginkgo .	57
Ornithogalum . . . . .	40	Poinsettia . . . . .	33	Salpiglossis . . . . .	17
Orobis . . . . .	27	Poirée à cardes . . . . .	14 et 47	Salsifs, voir Scorsonère .	50
Oseille . . . . .	46	Poirier, voir Pyrus com-		Salvia . . . . .	24, 28, 34 et 51
Osmunda . . . . .	35	munis . . . . .	58	Sanvitalia . . . . .	24
Oxalis . . . . .	23	Pois de senteur . . . . .	14	Sapinette, voir Abies alba .	55
Fröniemohn, voir Pavot . .	11	— à écosser . . . . .	47 et 80	Saponaria . . . . .	24
Palma-Christi . . . . .	11	— mangc-tout . . . . .	47	Sarriette . . . . .	51
Palmiers . . . . .	36	Polemonium . . . . .	27	Sauge, voir Salvia 24, 28, 34 et	51
Panais . . . . .	46 et 52	Polygala . . . . .	33	Sauromatum, voir Arum .	39
Panax . . . . .	33	Polygonum . . . . .	23	Savory, voir Sarriette . .	51
Pandanus . . . . .	33	Polypodium . . . . .	35	Saxifraga . . . . .	28
Panicum . . . . .	20, 33 et 54	Polystichum . . . . .	35	Scabieuse . . . . .	17
Pansies, voir Pensée . . . .	12	Pomme de terre . . . . .	58	Scabiosa . . . . .	17
Papaver . . . . .	11, 23 et 27	Pommier, voir Pyrus Malus	58	Scarole, voir Chicorée . .	42
Papyrus . . . . .	38	Pontederia . . . . .	38	Schizanthus . . . . .	24
Paquerette, voir Bellis . . .	26	Poppies, voir Pavot . . .	11	Schizopetalum . . . . .	24
Parsley, voir Persil . . . .	46	Porreau . . . . .	49	Scilla . . . . .	40



	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Scelopendrium</i> . . . . .	35	<i>Stocks, voir Giroflée</i> . . . . .	7	<i>Vegetable Marrow, voir</i>	
<i>Scorsonère</i> . . . . .	50	<i>Stove Plants</i> . . . . .	29	<i>Courge à la moelle</i> . . . . .	44
<i>Scutellaria</i> . . . . .	28	<i>Strelitzia</i> . . . . .	31	<i>Veratrum</i> . . . . .	28
<i>Seaforthia</i> . . . . .	33	<i>Strobilumen</i> . . . . .	10	<i>Verbena</i> . . . . .	13 et 24
<i>Sea-Kale, voir Chou-marin</i>	43	<i>Sugar Peas, voir Pois</i> . . . . .	47	<i>Vergissmeinicht, voir</i>	
<i>Sedum</i> . . . . .	28	<i>Summerblumen</i> . . . . .	20	<i>Myosotis</i> . . . . .	11 et 23
<i>Sempervivum</i> . . . . .	28	<i>Swainsonia</i> . . . . .	34	<i>Veronica</i> . . . . .	28 et 34
<i>Senecio</i> . . . . .	18 et 21	<i>Sweet-Peas, voir Pois de</i>		<i>Vers</i> . . . . .	51
<i>Seneçon</i> . . . . .	18 et 24	<i>senteur</i> . . . . .	14	<i>Verveine</i> . . . . .	18 et 24
<i>Sensitive, voir Mimosa</i>	33	<i>Sycomore, voir Acer</i> . . . . .	56	<i>Victoria</i> . . . . .	38
<i>Sequoia</i> . . . . .	58	<i>Tabac</i> . . . . .	53	<i>Vinca</i> . . . . .	34
<i>Serradelle</i> . . . . .	52	<i>Tacsonia</i> . . . . .	34	<i>Viola</i> . . . . .	12 et 23
<i>Serres (Graines de plan-</i>		<i>Tagetes</i> . . . . .	24	<i>Viscaria</i> . . . . .	25
<i>tes de)</i> . . . . .	29	<i>Tamarindus</i> . . . . .	34	<i>Vivaces</i> . . . . .	25
<i>(— —) collections</i> . . . . .	34	<i>Tecoma, voir Bignonia</i>	53	<i>— pour bordures</i> . . . . .	28
<i>(— —) grimpantes</i> . . . . .	34	<i>Téragone</i> . . . . .	50	<i>— pour grands groupes</i> . . . . .	28
<i>Silberbeete, voir Poirée à</i>		<i>Thalia</i> . . . . .	53	<i>Walpin</i> . . . . .	54
<i>cardes</i> . . . . .	14	<i>Thlaspi, voir Iberis</i> . . . . .	22	<i>Waarmoes, voir Poirée</i> . . . . .	47
<i>Silene</i> . . . . .	24 et 28	<i>Thrinax</i> . . . . .	38	<i>Wallflower, voir Giroflée</i>	
<i>Silphium</i> . . . . .	28	<i>Thuia</i> . . . . .	58	<i>Ravenelle</i> . . . . .	9
<i>Silver Beet, voir Poirée à</i>		<i>Thuiopsis</i> . . . . .	58	<i>Water Cress, voir Cresson</i>	50
<i>cardes</i> . . . . .	14	<i>Thuobergia</i> . . . . .	18 et 34	<i>Weigelia</i> . . . . .	58
<i>Sisyrinchium</i> . . . . .	23	<i>Thym</i> . . . . .	51	<i>Wellingtonia</i> . . . . .	58
<i>Snaptdragon, voir Muflier</i>	10	<i>Tigridia</i> . . . . .	40	<i>Welsh Onion, voir Ciboule</i>	43
<i>Solanum</i> . . . . .	24 et 34	<i>Todea</i> . . . . .	35	<i>Whitlavia</i> . . . . .	25
<i>Soleil, voir Helianthus</i>	22	<i>Tomate</i> . . . . .	50	<i>Wigandia</i> . . . . .	31
<i>ommerblumen, voir An-</i>		<i>Torenia</i> . . . . .	24	<i>Wintermoos, voir Rose-</i>	
<i>nuelles</i> . . . . .	2 et 20	<i>Torreya</i> . . . . .	58	<i>trémère</i> . . . . .	17
<i>Sorrel, voir Oseille</i> . . . . .	43	<i>Tournefortia</i> . . . . .	24	<i>Wohlriechende Wicken, voir</i>	
<i>Souci, voir Calendula</i> . . . . .	20	<i>Tree Carnation, voir</i>		<i>Pois de senteur</i> . . . . .	14
<i>Spanischer Pfeffer, voir</i>		<i>Éillet remontant</i> . . . . .	27	<i>Woodsia</i> . . . . .	35
<i>Piment</i> . . . . .	14	<i>Trees and Shrubs</i> . . . . .	55	<i>Wunderbaum, voir Palma-</i>	
<i>Sparaxis</i> . . . . .	40	<i>Trèfle</i> . . . . .	52	<i>Christi</i> . . . . .	11
<i>Sparmannia</i> . . . . .	31	<i>Trichonema</i> . . . . .	40	<i>Wunderblumen, voir Belle-</i>	
<i>Spergule</i> . . . . .	52	<i>Trichosanthes</i> . . . . .	6	<i>de-nuit</i> . . . . .	4
<i>Sphenogyne</i> . . . . .	24	<i>Trichtervinden, voir Belle-</i>		<i>Xeranthemum</i> . . . . .	25
<i>Spinach, voir Épinard</i> . . . . .	44	<i>de-jour</i> . . . . .	4	<i>Yucca</i> . . . . .	34
<i>Sprout, voir Chou de</i>		<i>Triteleia</i> . . . . .	40	<i>Zea</i> . . . . .	20
<i>Bruxelles</i> . . . . .	42	<i>Tritoma</i> . . . . .	28	<i>Ziergräser, voir Graminées</i>	
<i>Stachys</i> . . . . .	28	<i>Tritonia</i> . . . . .	40	<i>ornementales</i> . . . . .	19
<i>Statice</i> . . . . .	23 et 34	<i>Trollius</i> . . . . .	28	<i>Zierkurbisse, voir Courges</i>	
<i>Stauden, voir Vivaces</i> . . . . .	25	<i>Tropæolum</i> . . . . .	5 et 24	<i>d'ornement</i> . . . . .	6
<i>Stevia</i> . . . . .	28	<i>Turnip, voir Navel</i> . . . . .	46	<i>Zinnia</i> . . . . .	19 et 25
<i>Stiefmütterchen, voir Pensée</i>	12	<i>Uiola</i> . . . . .	20	<i>Zwiebel-und Knollenge-</i>	
<i>Stipa</i> . . . . .	20	<i>Uropetalum</i> . . . . .	40	<i>wächsen</i> . . . . .	39

## GESNÉRIACÉES.

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Achimenes</i> . . . . .	60	<i>Gloxinia</i> . . . . .	64	<i>Tydeæa</i> . . . . .	73
<i>Biglandularia, voir Rosa-</i>		<i>Kollikeria</i> . . . . .	67	—	
<i>novia</i> . . . . .	72	<i>Ligeria, voir Gloxinia</i>	64	<b>AMARYLLIS</b> . . . . .	76
<i>Dicyrta</i> . . . . .	63	<i>Nægelia</i> . . . . .	68	<b>BEGONIA</b> . . . . .	76
<i>Dircæa, voir Gesneria</i> . . . . .	64	<i>Plectopoma</i> . . . . .	71	<b>CALADIUM</b> . . . . .	74
<i>Dolichodeira</i> . . . . .	63	<i>Rosanowia</i> . . . . .	72	<b>DAHLIA</b> . . . . .	79
<i>Eucodonia</i> . . . . .	63	<i>Scheeria</i> . . . . .	72	<b>GLORIOSA</b> . . . . .	76
<i>Gesneria</i> . . . . .	63	<i>Stenogastria</i> . . . . .	73		



# FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX, contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau ou leur équivalent, expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 francs. —

Hollande : 18 florins. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.

Angleterre : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).

Etats-Unis : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et vignettes, et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs chacun (*port non compris*).

L'Etablissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume.

Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le deuxième fascicule du XXIII<sup>e</sup> volume paraîtra prochainement.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DE SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.



Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,

GAND (Belgique).

Correspondant de la FLORE pour la France : M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.

En vente à l'Etablissement de L. VAN HOUTTE :

## DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

Publié par feu **André LEROY**, pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes; il comprend :

1<sup>o</sup> Les **Poires**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 615 et 776 pages.

2<sup>o</sup> Les **Pommes**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 444 et 436 pages.

3<sup>o</sup> Les **Fruits à noyau**, 1<sup>re</sup> partie: Abricots et Cerises, 1 vol. grand in-8<sup>o</sup>, de 400 pages.

4<sup>o</sup> — — 2<sup>me</sup> partie: Pêches, 1 volume grand in-8<sup>o</sup>, de 350 pages.

PRIX : 30 francs LES 6 VOLUMES grand in-8<sup>o</sup>, de 3,000 pages, port non compris.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)**